






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3199/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3199/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3199/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3199/A


3199
A

A. Z. S

~~Lat 31969~~ H.O.S.

~~Anty~~

31969



³¹⁹⁶⁹
HIPPOCRATIS
APHORISMI

ET

PROGNOSTICA,
IOANNE BUTINO INTER-
prete & commentatore.

Adiectus est nouus INDEX

In quo

APHORISMI PER LOCOS
communes dispositi, & in certas classes
distributi ex tempore oculis
repræsentantur.

*Opus, ut discantibus medicinam, atq; docentibus
utile, sic eam facientibus necessarium.*



AVRELIOPOLI,

Apud Petrum & Iacobum Chouër.

M. DC. XXV.

15





TYPOGRAPHVS

Lectori Philiatro S.



DECREVERAM hac Aphorismorum Hippocratis compendiosa editione, non quidem invertere aphorismorum ordinem & receptam ab antiquis Medicinae proceribus seriem atque collocationem: sed ponere tibi ante oculos (Lector humaniss.) ordinem ac methodum quam ex recentiorib. nonnulli Bustamantus, Fogerolæus, Butinus, Popardus, Fontanus, alij in opere tã diuino excogitare conati sunt. Cum autem meum consilium cum amicis

T Y P O G R A P H V S

communicassem tum in re medica ver-
satissimis, tum utilitatis publicæ amā-
tissimis, ab eo instituto cæperunt me
dehortari. Nec enim fas & æquum cen-
sebant, cum Butino & Fontano inter-
turbare eum aphorismorum ordinem
qui à veteribus receptus, probatus, lau-
datus, posteris etiam traductus fuit.
Tanti autem non ducebant artificio-
sam, sed tenebrosam Bûstamenti &
Fogerolæi methodum, ut denuo obtru-
di medicinae studiosis deberet; quod in
ea concipienda, intelligenda, addiscen-
da, retinenda, plus temporis & mole-
stiarum deoradum erat, quàm in toto
opere Græcè & Latine memoriæ man-
dando. Addebant superioribus annis à
celeberrima facultate Parisiensi, penes
quam pura & illibata Hippocratis do-
ctrina remansit, graviter animadversum
P. Le

LECTORI.

fuisse in quēdam Chirurgum; qui eius-
 cemodi lanienam in Hippoc. aph. exer-
 cuisset. Probabant quidem eorum insti-
 tutum, qui ut memoriam Medicorum
 subleuarent, ad certas classes aphorif-
 mos reuocabant, & ad earum reducebant
 materiam de qua singuli intelligeban-
 tur. Sic laudabili non minus quā uti-
 li consilio Michael Saonarola in Pra-
 ctica maiori post historiam particu-
 larium aegritudinum in calce cuiuslibet
 capitis, Aphorismos omnes ad singulos
 morbos pertinentes adscribere solitus
 fuit, ad memoriae subsidium & adiu-
 mentum eorum qui in consultationi-
 bus medicis auctoritate aliqua Hippo-
 cratis suam roborare sententiam liben-
 ter exoptat. Nec reprehendendi veni-
 rent Butinus & Fontanus si duntaxat
 priscam Aphorismorum seriem non

TYPOGRAPHVS

immutassent, sed contenti fuissent indicare summa rerum capita ad quæ illi reuocari possunt & debent. In quo utendum fuit synopsi aut breui tabella; non integra per omnes sectiones, & delineatione & confusione.

His amicorum rationibus velut à profundo somno excitatus Instituti prioris cæpi pænitere, & nouam inire rationem qua Medicorum studiis prodessem. Relicta itaque omni methodo neglectoque ordine & nexu, quem inter aphorismos plurimi inutiliter excogitauerunt: synopsis seu indicem ex Butino, Popardo, Fontano, Saonaro-la, Ioannitio, Rostixio, occlerio collectum & Amici cuiusdam nostri industria studioque locupletatum huic editioni nostræ adpingendum censuimus: tum ut eorum studio consulatur, qui aliquo apho-

LECTORI.

aphorismo in rem presentem indigent,
tum ut ijs quorum memoria fluidior est
prouideatur, tum denique ut singuli apho-
rismi in certum ordinem digesti, & ad
suos fontes reuocati, dum res exigit,
facili negotio in usum aduocentur.

Ne vero Medicinæ candidatis obscu-
ra paulo Hypocratis dictio haberetur:
Interpretationem Ioa. Butini tersam
& elegantem, eiusque commentarios
breues sed dilucidos adiungendos cura-
uimus: & propter rerum affinitatem
eiusdem Hippocratis prognostica Inter-
prete & illustratore eodem Butino: hoc
sit tibi tam gratum opus quàm utile fo-
re cognouero; propediem meliora à me
expectabis. Vale, datum Aureliopoli
die 17. mensis Aug. ann. 1624.



ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΟΡΚΟΣ.



ΜΝΥΜΙ Α'πώλωνα ἱη-
τέον· καὶ Ασκληπιόν· καὶ Ὑ-
γείαν καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς
πάντας καὶ πάσας, ἴσορας
παιεύμεθα, ὅτι τελέα ποιήσῃ καὶ δύ-
ναμιν καὶ κείσιν ἐμὲν, ὅρκον τόνδε καὶ
ξύγγραφον πῶς δεῖ ἡγήσασθαι μὲν τὸν δι-
δάξαντά με πῶς τέχνῳ ταύτῃ, ἵστα
γνέτησιν ἐμοῖσιν, καὶ βίῃ κοινώσασθαι· καὶ
χρεῶν χρηρίζοντι μετὰ δοσιν ποιήσασθαι, καὶ
γνῶμεν τὸ ὅξ ἐαυτέας, ἀδελφοῖς ἴσον ὅτι
κείνῃν ἀρρεσι. καὶ διδάξῃν πῶς τέχνῳ
ταύτῃ, ὡς χρηρίζωσι μανθάνειν, αὐτοῖς
μιαθεῖν καὶ ξύγγραφῃς. ὦρα Γελίης τε καὶ

ΙΠΠΟΚΡ. ΟΡΚΟΣ.

ἀκροήσῃ, καὶ τῆς λοιπῆς ἀπάσης μα-
 θήσῃ, μετάδοσιν ποιήσας υἱοῖσι τε
 ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τῷ ἐμῷ διδάξαντος. καὶ
 μαθηταῖσι συγγεγραμμένοις τε, καὶ ὁρ-
 κισμένοις νόμῳ ἰππικῷ. ἄλλο ἢ ἐδενί.
 διατήμασί τε χρήσμαι, ἐπ' ὠφελείῃ
 χαμνόντων καὶ δυνάμιν καὶ κείσιν ἐμῷ.
 ὅπῃ δηλήσῃ ἢ καὶ ἀδικίῃ εἴρξῃ. ἐδώσω
 δὲ ἐδὲ φάρμακον ἐδενί αἰτηθεὶς, θα-
 νάσιμον. ἐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβεβίβω
 τοιῷδε. ὁμοίως ἢ ἐδὲ γυναῖκί πεσόν
 φθορεὶον δώσω. ἀγῶς δὲ καὶ ὁσίως δια-
 τηρήσω βίον τὸν ἐμόν. καὶ τέχνῳ πῶ
 ἐμῷ. ἐτεμέω δὲ ἐδὲ μὲν λιδοῦντας.
 ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτησιν ἀνδράσι πρή-
 ξῃ τῆςδε εἰς οἰκίας ἢ ὁκόσας αὐτῷ εἶω,
 ἐστελεύσομαι ἐπ' ὠφελείῃ χαμνόντων,
 ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἐκουσίης καὶ
 φθορείης τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων
 ἔργων, ὅπῃ τε γυναῖκεϊων σωμαμάτων καὶ

ΙΠΠΟΚΡ. ΟΡΚΟΣ.

ἀνδρῶν, ἐλευθέρων τὲ καὶ δούλων. αἱ δὲ
 αὐτὸ ἐνθεραπεύειν ἢ ἰδῶ, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ
 αὐτοῦ θεραπεύειν καὶ βίον ἀνθρώπων, αἱ
 μὴ χρή ποτε ἐκκαλέεσθαι ἔξω, σιγήσο-
 μαι, ἀρρήτα ἢ γέμματα εἶναι τὰ τοιαῦτα.
 Ορκὸν μὲν οὖν μοι τὸν δεῖτελέα ποι-
 εῖν, καὶ μὴ ξυγχέοντι, εἴη ἐπαύρασι, καὶ
 βίῃ καὶ τέχνῃ, δοξαζομένην ὡς πᾶσιν
 ἀνθρώποις, εἰς τὸν αἰεὶ χρόνον
 ὡσαυταῖνοντι δὲ καὶ ἐπιπο-
 ρουῶντι, τὰναντία
 τῶνδε.

HIPO-



HIPPOCRATIS

Coī Iusiurandum.

APOLLINEM medicum, & Æsculapium, Hygeámque ac Panaceam iuro, deósque omnes, itémque deas testes facio, me hoc iusiurandum, & hanc contestationem conscriptam, pro viribus & iudicio meo integrè seruaturum esse. Præceptorem sanè, qui me hanc edocuit artem, loco parentum habiturum, vitam communicaturum, eáque quibus opus habuerit impertiturum: Eos item, qui ex eo nati sunt, pro fratribus masculis iudicaturum, artémq; hanc si discere voluerint, absque mercede & pacto edocturum: Præceptionum ac auditio-num, reliquæque totius disciplinæ participes facturum tum meos, tum præceptoris mei filios, imo & discipulos qui



ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ.



ΗΤΡΙΚΗ', τεχνέων μὲν
πατέων ὅσιν ὀπιφανεσάτη.
ὁ γὰρ ἅμα δὴ τῆς τε χρεω-
μύων αὐτῇ, καὶ τῆς εἰκῇ τοῖς
τοῖςδε κεινόντων, πολὺ τι πατέων ἤδη
τῆς τεχνίων ἀπολείπει. ἢ ὅτι τῶνδε ἀμφο-
τέρων, τὰ μάλιστα μοι δοκέει ἔχειν αἰτίαν
τοῖςδε. πρῶτον γὰρ ἰντελικῆς μουῆς
ἐν τῇσι πόλεσιν ἔστιν ὥρεσθαι, πλὴν ἀ-
δοξίης. αὐτὴ ὅτι ἐπιτερόσκει τοῖς ὅξιν
τένης συγκαταμύοις. ὁμοιότατοι γάρ εἰσιν οἱ
τοιοῖδε, τοῖσι παρειαγομύοις περὶ
ποισιν ἐν τῇσι τραγωδίῃσιν. ὥς γὰρ ἐκεί-
νοι χῆμα μὲν καὶ σολύω, καὶ περὶ σωπὸν
ὑποκρίτῃ ἔχουσιν, ἐκείσιν ὅτι ὑποκρίται,
ἐπεὶ καὶ οἱ ἰντελικῆς μὲν, πολλοί. ἔργω

ΙΠΠΟΚ. ΝΟΜΟΣ.

ἢ, πάλιν βαιοί. χρὴ ὅς τις μέλλῃ ἰατρικῆς
 ξυνέειν ἀξικέως ἀρμόζεσθαι, τῷ δέ μιν
 ὀπίβολον γνέσθαι φύσιθ διδασκαλίας.
 τρέψα εὐφυέθ παιδομαθίας· φιλοπο-
 νίας· χρόνα. περὶ τὸν μὲν ἐν πάντων δεῖ
 φύσιθ· φύσιθ γὰρ ἀντιπραΐσεως, κα-
 νεὰ πάντα. φύσιθ ἢ εἰς τὸ ἀείσον ὁδη-
 γέσεως, διδασκαλίη τέχνης γίνεθ. ἡ μὲν
 φρονήσιθ δεῖ περὶ ποιήσασθαι, παιδομα-
 θία γνόμενον ἐν τρέψῳ, ὁκοῖος εὐφυῆς
 περὶ μάθησιν ἔσαι. ἐπὶ δὲ φιλοπονίῳ
 περὶ ἐνέγκασθαι ἐς χρόνον παλιῶν, ὅπως
 ἡ μάθησις ἐμφυσιωθεῖσα, δεξιῶς τε καὶ
 εὐαλδέως τοῖς καρποῖς ὀξενέγκηθ. ὁκοῖη
 γὰρ τῷ ἐν τῇ γῇ φυομενῶν θεωρεῖν, τοιήδε
 καὶ τῇ ἰατρικῆς ἡ μάθησις. ἡ μὲν γὰρ φύσις
 ἡμέων, ὁκοῖον ἡ χώρα· τὰ δὲ δόγματα τῶν
 διδασκόντων, ὁκοῖον τὰ ἀνέμματα. ἡ ἢ
 παιδομαθία, τὸ κατ' αἴμα αὐτὰ πεσεῖν
 εἰς τὰ ἀρετὰν. ὃ ἢ ἔσθ' ὅπως ἐν αἵματι μάθησις,

ΙΠΠΟΚ. ΝΟΜΟΣ.

ὁκοῖον ἐκ τ' ἀειέχοντος ἡέρος ἔοφ' ἄλυσ
 μένῃ τοῖσι φυομελύνουσιν. ἡ δ' φιλοπονίη, ἐρ-
 γασίη. ὅ δ' ἡ χερόνθη, ταῦτα ἐπιχύσῃ πάν-
 τα, ὡς τραφῆναι τελέως. ταῦτα ὦν χρή
 ἐς τ' ἰντεκλῶ τέχνῃ ἐνέτραμύες, καὶ
 ἄρ' ἐκέως αὐτέης γνώσιν λαβόντας, ἔτιως
 ἀνὰ τὰς πόλεις φοιτεῦντας μὴ λόγῳ
 μένον, ἀλλὰ καὶ ἔργῳ ἰντερεῖς νομίζεσθαι. ἡ
 δὲ ἀπειρεῖη, κακὸς θησαυρὸς, καὶ κακὸν
 κειμήλιον τοῖσιν ἔχουσιν αὐτέλῃ, καὶ ὄναρ
 καὶ ὕπαρ. εὐθυμίας τὲ καὶ εὐφροσύνης ἀ-
 μοιρος, δ' φλίας τὲ καὶ θεοσύτητος τιθῶν.
 δ' φλίη μὲν γὰρ ἀδυναμίῃ σημαίνει· θρα-
 σῶτης δ' ἀτεχνίῃ. δύο γὰρ ὁπισθήμη τὲ καὶ
 δόξα. ὦν τὸ μὲν, ὁπίσθῃ ποιεῖ· τὸ δὲ,
 ἀγνοεῖν. ἡ μὲν οὖν ὁπισθήμη ποιεῖ τὸ
 ὁπίσθῃ, ἡ δὲ δόξα τὸ ἀγνοεῖν. τὰ δ' ἰε-
 ρὰ ἑόντα ὀρήματα, ἱεροῖσιν ἀνδρό-
 ποις δείκνυσι. βεβήλοισι δὲ, ὃ θέμις
 ὄρνῃ ἢ τελεσθῶσιν. ὀρχίσι δ' ὁπισθήμης.

HIPPO-



HIPPOCRATIS

LEX.

MEDICINA omnium artium clarissima est: verum propter ignorantiam eorum, qui eam exercent, & ob eos, qui de medicis iudicant, omnibus iam artibus longè postponitur. At verò eius erroris causa hæc videtur: Soli medicinæ nulla pœna in ciuitatibus statuta est, præter quàm ignominia. Verum hæc nihil mouet eos, qui ex illa veluti sunt compositi ac facti. Simillimi enim huiusmodi medici sunt personis, quæ in Tragædiis inducuntur. Quemadmodum enim illi figuram quidem, habitum, ac personam eorum, quos referunt, ha-

HIPPOCR. LEX.

bent, illi ipsi autem verè non sunt: sic
 & medici, fama quidem multi, opere
 autem valde pauci. Quisquis enim
 medicinæ scientiam sibi verè compa-
 rare volet, iis præditum & adiutum e-
 niti oportet, Natura, Doctrina, Loco
 studiis apto, Institutione à puero, In-
 dustria, & Tempore. Primum quidem
 igitur omnium Natura opus est. Na-
 tura enim repugnante, irrita omnia
 fiunt. Si verò Natura ad optima tan-
 quam viæ dux sit, artis doctrina obti-
 netur: quam sanè cum prudentia ad-
 quirere oportet: ita ut à puero Insti-
 tutio accedat. Atque id in loco à Na-
 tura ad disciplinam apto. Amplius au-
 tem & Industriam adhibere oportet:
 eamque ad multum omnino tempus,
 quo disciplina ipsa, veluti insita & in-
 generata, prosperè & copiosè fructus
 suos producat. Qualis enim eorum,
 quæ terra gignuntur, consideratio est:
 eius-

HIPPOCR. LEX.

eiusmodi etiam disciplinæ medicinæ
cognitio est. Natura enim nostra ve-
lut æger est: dogmata præceptorum,
velut semina sunt. Institutioni à pue-
ro cum eo conuenit, quòd oportuno
tempore semina in terram cadunt.
Locus autem, in quo ars docetur, est
velut circumfusus aër, qui nutrimen-
tum præbet satis ipsis. Industria au-
tem cultura est. Tempus postremùm
hæc omnia corroborat, vt omnia per-
fectè enutrientur. His igitur ad artem
medicam allatis, & vera ipsius cogni-
tione comparata, tandem in varias vr-
bes commeandum, & non sermone
tantùm, verùm etiam opere, medicos
haberi conuenit. Imperitia sanè ma-
lus Thesaurus est, malâque supellex.
Et somnianti, & ei, qui rem apertè ci-
tra somnium dispicit. Alacritatis, fi-
ducia, ac lætæ securitatis expers: timi-
ditatisque & audaciæ nutrix. Timidi-

HIPPOCR. LEX.

tas equidem in exercendis operibus
inscitiam: Audacia verò ignorantiam
artis declarat. Duo enim sunt, scien-
tia, & opinio, quarum altera quidem
scientes efficit, altera ignaros. Cæte-
rùm res sacræ sacris hominibus
explicantur: profanis id fas
non est, priusquàm
scientiæ myste-
riis initi-
entur.

HIP.





HIPPOCRATIS
GENVS ET VITA,
EX SORANO.

HIPPOCRATES genere
quidem Cous fuit, Hera-
clide & Phænaretes filius,
ab Hercule & Æsculapio
ortum ducens, ab vno quidem vige-
simus, ab altero vero decimus nonus.
Eius autem generis seriem comme-
morant Eratosthenes & Pherecydes,
& Apollodorus, & Arius Tarsensis.
Heraclidæ vero parentis sui discipu-
lus extitit, deinde Herodici, & ex
quorundam opinione etiam Gorgiæ
Leontini oratoris, & Democriti phi-
losophi Abderitani. Peloponnesiacis

HIPPOCRATIS

temporibus viguit, natus vt tradit
Istomachus in primo de Hippocratis
secta, primo octogesima Olympiadis
anno, vt vero Soranus Coos litera-
rum monimenta in Co perscrutatus
addit, regnante Abriada, mensis A-
griani sexto & vigesimo die, quo e-
tiam in hunc vsque diem Coos Hip-
pocrati parentare ait. Arte autem Me-
dica & vulgaribus disciplinis excul-
tus, vita functis parentibus patria ex-
cessit, quod tabularium in Cnido in-
cendisset, vt eum quidem contume-
liosè criminatur Andreas, in suo de
Artis Medicæ origine lib. o. Alij verò
ideo proposito fecisse dicunt, vt quæ
in pluribus locis conficiebantur spe-
ctaret, & in ea varietate se magis exer-
ceret. Vt vero Soranus Coos narrat,
per somnum admonitus vt Thessa-
liam incoheret. Per totam autem Græ-
ciam Medicinam faciens admiratio-
ni fuit,

GENVS ET VITA.

ni fuit, adeo vt ad Perdicam Macedonum Regem, qui tabe laborare existimabatur, publice vocatus cum Euryphonte, qui eum ætate excedebat peruenerit, & animi morbum esse indicarit. Cum enim post Alexandri patris mortem, Philam eius pellicem amore deperiret, ad eamque re delata, postquam ex eius conspectu illum prorsus immutari animaduertit, propulsato quidem morbo, Regem sanitati restituit. Ab Abderitanis etiam vocatus est, vt eo se conferret, & Democritum quidem insania laborantem curaret, totam vero vibem peste liberaret. Quinetiam cum in Illyrios, Pæonas & Barbarorum regionem pestis ingrueret, earum gentium regibus rogantibus vti sese ad illos conferret, à legatis edoctus quinam illic venti vt plurimum perflarent, illos re infecta dimisit. Cum vero recta coniectu-

HIPPOCRATIS

ra indicasset morbum in Atticam per-
uenturum, id quod futurum erat præ-
uidens, tum urbium, tum discipulo-
rum curam suscepit, in tantumq; Græ-
cos dilexit, ut cum eius nominis glo-
ria ad Persas fama peruenisset, eaque
de causa Artaxerxes per Histanidem
Hellesponti præfectum cum magnis
muneribus ab eo peteret, uti ad sese
veniret, id ob grauitatem, pecuniæ
cōtemptum, & propinquorum amo-
rem recusarit, velut per epistolam ad
eum scriptam ostenditur. Patriam e-
tiam à bello quod ei inferre parabant
Athenienses liberauit, Theſſalis in au-
xilium vocatis, ideoque splendidos
honores apud Coos consecutus est.
Quinetiam à Theſſalis, Arginis & A-
theniensibus honorifice acceptus est,
qui eum ab Hercule secundum pu-
blice factis Eleusinijs initiarunt, ciui-
tate donarunt, victumq; ei publicum
in Pry-

GENVS ET VITA.

in Prytaneo eiusque posteris dede-
runt. Candide & liberaliter studiosos
artem docuit, debito addito iureiu-
rando. Obiit apud Larissæos, quo tem-
pore Democritus mortuus esse fertur,
vt quidam tradunt, ætatis anno nona-
gesimo, vt alij vero, octuagesimo
quinto, alij centesimo quarto, qui-
dam etiam centesimo nono. Inter
Gyrtonem & Larissam sepultus est.
Et in huncvsque diem monumentum
ostenditur, in quo multo tempore e-
xamen fuit quod mel conficiebat,
quo nutrices infantes superficiariis o-
ris vlceribus (aphtas dicunt) laboran-
tes apud tumulum illinebant & faci-
le liberabant. In multis autem eius i-
maginibus capite velato pingitur,
cum pileo vt quidam dicunt, velut V-
lysses, quod est nobilitatis insigne, alij
vero, cum pallio, & ex his alij quidem
id fieri propter decorum volunt,

HIPPOCRATIS

quod caluus esset, alij vero propter
capitis imbecillitatem, alij autem ex-
pressa sane significatione, quod prin-
cipis animæ sedem probe munitā esse
oporteat, alij peregrinationis amo-
rem indicare istud dicunt, alij scripto-
rum obscuritatem, alij vero, vt de-
monstretur etiam sanitatis tempore
quæ nocent vitari oportere. Quidam
vero, quod ne manuum administra-
tio impediretur, comprehensam cir-
cumfluentem vestimenti laciniam in
caput reiiciebat. De ipsius autem scri-
ptis magna est dissensio; cum alij alia
sentiant. Vnde cum variæ causæ iudi-
cio tenebras offundant, de his non est
facile, certum quid statuere. Primum
quidem agnominatio. Secundum di-
cendi stilum seruare posse. Tertium
quod vnus & idem quandoque robu-
stius, alias remissius per ætatem scri-
bat, aliasque præter hæc causas recen-
sere

GENVS ET VITA.

fere liceat. Pecunias neglexit, morum
grauitate excelluit, Græcos maxime
dilexit, quare etiam gentiles suos om-
ni studio coluit, adeo vt totas ciuita-
tes (quemadmodum dictum est) pe-
stilentia liberauerit. Ex quo & præ-
claros honores, non apud Coos tan-
tum, sed & Argiuos & Athenienses a-
deptus est. Mortuos duos reliquit fi-
lios, Thessalum & Draconem, at
discipulorum magnum nu-
merum. Carissimos
autem suos filios
reliquisse di-
citur.

ERRATA.

R Estitutus hac editione, Aphorismorum Hippocratis ordo, prius à Butino turbatus, ansam præbuit infrascriptis mendis & omissionibus, in hunc modum à benigno lectore corrigendis:

Pag. 59. lin. 20. *precedentis aphorismi: tege,*
Aphorismi 34 huius sect.

Pag. 67. *pretermissi sunt quatuor ultimi aphorismi secundæ sectionis, scil. 51. 52. 53. 54.*

L I.

Τὸ καὶ πολὺ καὶ ἐξαπίνης κενουῖν, ἢ πληροῦν, ἢ θερμαίνειν, ἢ ψύχειν, ἢ ἄλλως ὁκωσουῖν τὸ σῶμα κινεῖν, σφαλερόν. καὶ γὰρ πᾶν τὸ πολὺ τῇ φύσει πολέμιον, τὸ δὲ κατ' ὀλίγον, ἀσφαλές, καὶ ἄλλως ἢ ὃ καὶ τις ἐξ ἐτέρου ἐφ' ἑτέρῳ μεταβάλλει.

Plurimum atque repentè euacuare vel replere, vel calfacere, vel refrigerare, siue quouis alio modo corpus mouere periculosum.

sum : Quoniam omne nimium est naturæ inimicum: Sed quod paulatim fit, tutum est, cum alias, tum cum ab altero ad alterum fit transitus.

Meminit horum quatuor, euacuare, replere, calfacere & refrigerare: quia sanitas consistit in iusta quantitate & qualitate triplicis substantiæ, solida, humida, spiritusosa. Vacuatio quidem & repletio sunt quantitatis, calfactio verò & refrigeratio qualitatibus. In horum ergo mediocritate quia consistunt facultates corporis nostrum dispensantes, fit ut omne nimium tam in excessu quàm in defectu quod commoderationem illam destruit, non secus auerfetur natura quàm subitas omnes ad insueta mutationes.

L I I.

Πάντα κατὰ λόγον ποιεόντι, καὶ μὴ γενόμεναι τῷ κατὰ λόγον, μὴ μεταβαίνειν ἐφ' ἑτέρον, μέλλοντος & δόξαντος ἐξ ἀρχῆς.

Omnia secundum rationem facienti si non succedat secundum rationem, non est ad aliud transeundum, dum manet quod à principio visum est.

Non est mediocris prudentia, non discedere ab iis quæ recta visa sunt, & si nondum manifesta

appareat utilitas ex ijs ita factis consequi. Quom-
admodum enim gutta subiectam petram percu-
tiente, vix longo tempore sensibilis passio depre-
henditur in lapide, sic accidit etiam in crudis, &
qua difficulter concoqui possunt dispositionibus:
in quibus cum recta ratio id quod conducit se-
cundum omnes indicationes, prout earum una-
quaque suadet, inuenerit, non discedit ab illo
quod primum faciendum esse putauit, etiam si
nihil ex illius usu sit effectum: modò non aliud
interueniat symptoma, quod à priore institutio
recedere nos cogat. Rationaliter enim his uti-
mur remedijs, quae ipsa suggerunt indicationes.

L I I I.

Οἱ ὅσοι τὰς χειλίδας ὑγρὰς ἔχουσι νέοι μὲν ὄν-
τες, βέλπον ἀπαλλάσσει τὴν τὰς ξηρὰς ἔχόντων.
ἔς τὸ γῆρας χεῖρον ἀπαλλάσσει. ξηραίνονται
γὰρ αἱ ἐπὶ τὸ πολὺ τοῖσιν ἀπὸ γηρόσεως.

Quicunque aluos humidus obtinent, hi
quandiu iuvenes sunt melius degunt quàm
quibus sicca est. In senectute verò deterius
degunt, siccantur enim alui magna ex parte
iis qui senescunt.

Hic Aphorismus conuenit cum vicesimo huius
sectionis, ubi etiam innuit aluum humidum, quae
facile excernit, meliorem esse: sicut eam quae non
nisi egre, deteriore.

L I V.

Μεγάλη ἡ σωματικὴ συνέστασις μὴδ', ἐλαφύριον,
καὶ δοκῶν αἰδέσθαι. ἐκζητῶσιν δὲ δύχεσθαι καὶ χεῖρα
τῇ ἐλασότητι.

Magnitudo corporis iuventutis quidem ne-
que indecens, neque illiberalis, senectutis ve-
rò inutilis & deterior paruitate.

*Proceritas corporis ut sit in iuventute pulchra,
tamen in senectute est inutilis. ut quæ gibbosita-
tis occasionem præbeat: nam isto veluti onere pressæ
senes, incurvantur ac gibbi fiunt.*

Pag. 177. & 178. duo aphorismi 30 & 31. in-
verso ordine positi.

Pag. 226. lin. 13. 49. lege 50.

Pag. 234. lin. 16. superiore aphorismo: lege,
Aphorismo 43. huius sectionis.

Pag. 266. lin. 4. cum precedente: lege, cum
37. sectionis 6.

Pag. 275. lin. 11. undecimo aphorismo huius
materia: lege, nono aphorismo primæ sectionis.

Pag. 276. omissus est aphorismus 71. septimæ
sectionis.

L X X I.

Καὶ οἷσι τὰ ὑποχωρήματα, καὶ εἰσῆς τῶν καὶ
μὴ κινήσεως οἶονεὶ ὑφίσταται ξύσματα καὶ καὶ ὀλί-
γα καὶ ὀλίγη ἡ νόσος γίνεται. καὶ δὲ πολλὰ παλαιὰ

ταύτοις συμφέρει ὑποκαθῆραι τὴν κεφαλὴν. ἢ ὅ
μὴ κατὰ τὴν ποιήσαντος διδῶς τὰ σοφήματα, ὅσα
αὐτῷ πλείω διδῶς, μάλλον βλάψῃς.

Et quibus deiectiones si stare permiseris
& non moueris, veluti strigmenta subsi-
stunt, & si pauca sint, paucus est morbus: Si
multa, multus: iis confert alui purgatio.
Quod si aluo non purgata dederis sorbitio-
nes, quantò plures dederis, tantò magis no-
cebis.

*Hic tam nominum quàm verborum usus im-
proprius ostendit fuisse interiectum præsentem A-
phorismum, atque in ordinem supposititiarum
meritò redigendum esse.*

SYNOPSIS



SYNOPSIS
APHORISMORVM
HIPPOCRATIS
per materias dige-
storum.

*Prior numerus est sectionum, alter
Aphorismorum.*

APHORISMI
Ad morbos in vniuersum
attinentes.



periculosi

Item

ORBI fiunt magis vno, quàm
alio tempore

3.19

Morbi consentanei, naturæ, æta-
ti, habitui, tempori, minus

2.34

7.85

A

SYNOPSIS

Morbi infantium recens natorum	3.24
hi quando soluuntur	3.28
Morbi infantium grandiorum	3.25
Morbi puberum	3.27
Morbi adolescentum	3.29
Morbi virorum	3.30
Morbi senum	3.31
Morbi verni	3.20
Item	6.55
Morbi aestiui	3.21
Morbi autumnales	3.22
Item	6.55
Morbi hyemales	3.23
Morbi constantes & boni quando fiunt	3.8
inconstantes & mali quando	3.8
Recidivarum cause	2.12
Circa initia morborum omnia leuiora	2.20
Circa vigorem omnia grauiora	2.20
Circa finem omnia leuiora	2.20
In omni morbo mente constare bonum	2.33
In quouis morbo abdomen habere extenuatum in alium	2.35
Morbis extremis extrema remedia	1.6
Morbi	

APHOR. HIPPOCR.

Morbi ab euacuatione curantur repletione

2.22

Morbi ex repletione curantur euacuatione

2.22

Quae iudicata sunt & iudicantur sinenda non
mouenda

1.20

In principijs morborum si quid mouendum
moue

2.29

Qui morbi purgatione indigeant

2.8

Morbi vigor quem victum postulat

1.8

Ad Acutos morbos.

Acutus extremos statim habet labores

1.7

Acuti in quatuordecim diebus iudicantur

2.23

Acuti extremo victu tenui gaudent

1.7

sed non semper

1.4

Acutorum non omnino certa sunt prognostica

2.19

Ad longos.

Longi morbi victum tenuem non postulant

1.4

In longis morbis abdominis depressio malum

7.90

Ad febres, & primò ad Tertianam.

Tertianam generatur aestate

3.21

A 2

SYNOPSIS

<i>Tertiana vacat periculo</i>	4.43
<i>quæ periculosa</i>	4.43
<i>quando terminatur.</i>	4.59

Ad Quartanam.

<i>Quartana æstate fit</i>	3.21
<i>æstiva brevis</i>	2.25
<i>fit Autumno</i>	3.22
<i>estq; longa</i>	2.25

<i>Quartana liberat à conuulsione</i>	5.71
---------------------------------------	------

<i>Mala cum sanguis è naribus fluit</i>	7.87
---	------

Ad Quotidianam.

<i>Quotidiana incipit à rigore</i>	4.63
<i>desinit per rigorem</i>	4.63

Ad Ardentem.

<i>Ardens febris fit æstate</i>	3.21
<i>quando sitim non inferat</i>	4.54
<i>soluitur rigore</i>	4.58
<i>soluitur delirio</i>	6.26

Ad Acutam.

<i>Acuta febris fit per siccitates</i>	3.7
<i>fit æstate</i>	3.11
<i>fit Autumno</i>	3.9
<i>quæ lethalis</i>	4.37
<i>Item</i>	

APHOR. HIPPOCRATIS.

Item	4.66
non fit in senibus	1.14
cum suspirio mala	6.54
cum frigore extremorum mala	7.1
non habet certas prænuntiationes	2.19
in quatuordecim diebus iudicatur	2.23
Acute febris lac malum	5.6

Ad Longam.

Longa Autumnalis	2.25
fit per pluvias	3.16
fit circa pubertatem	3.27
vnde portendatur	2.28
fit si sudores die critico non habeat	4.36
inducit tubercula & arthriticos dolores	7.67

Item	4.44
abscessibus non soluitur	4.51
lentoires gignit circa dentes	4.53
est cum sedimento vrinarum farinaceo	7.32
iuuatur lacte	5.65
Continua febris fit aestate	3.21

SYNOPSIS

<i>est periculosa</i>	4.43
<i>Item</i>	7.66
<i>Continua cum rigore in agro debili est lethalis</i>	
4.46	
<i>cum cruentis sputis & foetidis est lethalis</i>	
4.47	
<i>cum frigore externarum partium & ardore internarum lethalis</i>	4.48
<i>item</i>	7.76
<i>cum distortionem oculi, nasi, &c. lethalis</i>	
4.49	
<i>Item</i>	7.77
<i>cum difficultate spirandi atque delirio lethalis</i>	4.50
<i>si sudore superueniente non solvatur, fit longa & mala</i>	4.56

Ad Intermittentem.

<i>Intermittens sua habet signa</i>	1.12
<i>periculo vacat</i>	4.43
<i>quæ difficile iudicatur</i>	4.30
<i>cibum non exigit per accessiones</i>	1.11
<i>cum rigore soluitur</i>	4.63
<i>Ad su-</i>	

APHOR. HIPPOCRATIS.

Ad sudores febrium.

<i>Sudor signum prognosticum febrium</i>	1.12
<i>quando multus in febribus</i>	3.6
<i>æstivus</i>	3.21
<i>Sudor à parte affecta erumpit</i>	4.38
<i>continuus quid indicat</i>	7.65
<i>criticus</i>	4.36
<i>die critico factus qui periculosus</i>	7.88
<i>Symptomaticus</i>	4.56
<i>frigidus</i>	4.37
<i>Item</i>	7.89
<i>Sudatiuncula</i>	7.89

Ad rigores febrium.

<i>Rigor à frigido fit</i>	5.17
<i>Item</i>	5.20
<i>à qua parte incipiat in mulieribus & viris</i>	5.70
<i>sexto die contingens</i>	4.29
<i>criticus</i>	4.58
<i>lethalis</i>	4.46
<i>quotidianarum</i>	4.63

Ad convulsiones quæ fiunt in febribus.

SYNOPSIS

Convulsio superueniens in febre, mala	2.26
in febribus mala	4.66
Item	4.67
quomodo significetur	4.68
superueniente febre soluitur	4.57
soluitur à quartana	5.71
ebrio superueniens lethalis ni febris accadat	

5.5

Ad Symptomata febrium varia.

Delirium in febre continua lethale	4.50
Timores in somnijs malum	4.67
Tremores in febribus delirio soluuntur	5.26
Convulsio in febre continua lethalis	4.49
Convulsio ex somnijs malum	4.67
Rigor febrem ardentem soluit	4.58
Rigor soluit febres	4.63
Rigor in agro debili lethalis	4.46
Surditas aduenit febribus	4.60
Lacryma in febribus quid significent	4.52
item	7.86
Hæmorrhagia ex naribus soluit febrem	
	4.60

Hæ-

APHOR. HIPPOCRATIS.

Hæmorrhagia aluum humectat	4.27
Lentor circa dentes fortes febres indicat	4.53
Strangulatio in febribus lethalis	4.35
Item	4.34
Spiratio interrupta in febribus convulsionem significat	4.68
Spirandi difficultas in febribus est lethalis	4.50
Tussis sicca in febribus sitim auertit	4.54
Tabes in febribus mala	2.28
Ventriculi æstus & dolor in febribus malum	4.65
Suspiria luctuosa in febribus malum	6.54
Vomitùs sanguinis cum febre malum	7.38
Dolor circa viscera malum	4.66
Icterus ante septimum diem, malum	4.62
quo die, bonum	4.64
Hypochondriorum murmur quid significet	4.73
Alui profluuium febrem soluit	4.60
Sedimenta vrinarum farinacea longam fe- brem designant	7.32
Bubo in omnibus febribus præter diarias ma- lus	4.55

SYNOPSIS

<i>Sudor febrem non auferens malum</i>	4.56
<i>Abscessus febrem non soluentes longum mor- bum denuntiant</i>	4.51
<i>Excretiones in febribus quæ malæ, quæ bonæ</i>	4.47
<i>Frigus externorum, internorum ardor cum siti, lethale</i>	4.48
<i>Lasitudo in febribus abscessus minatur</i>	4.31
<i>Recidiva in febribus quando fiat unde fiat</i>	2.12

Ad victum febricitantium.

<i>Victus humidus febricitantibus conuenit</i>	1.16
<i>Cibus febricitanti est morbus</i>	7.69
<i>Per accessiones febrium non cibandum</i>	1.11
<i>Item</i>	1.19
<i>Inedia cum fastidio malum</i>	6.3
<i>Lac malum febricitantibus</i>	5.65
<i>Ex bonis cibis non firmari, malum</i>	2.31
<i>id in principio morbi quid designet</i>	2.32

Apho-

APHOR. HIPPOCR.

APHORISMI

Ad morbos partium internarum pertinentes.

Et primo

Ad Capitis dolorem.

D olor capitis ab austrina constitutione generatur	3.17
quando hyeme fiat	3.13
Item	3.23
inducitur ab aromatibus	5.28
quando lethalis	6.51
Signum eius ex vrinis	4.70
Et lac contrarium	5.65
Iuuatur sectâ frontis venâ	5.69
Sedatur pure confecto	5.22
Sedatur pure, aqua, vel sanguine effluente	6.10

Ad Lethargum.

Lethargus viris familiaris	3.30
In veterno tremor malum	7.21
Somnus laborem faciens lethalis	2.1

S Y N O P S I S
Ad Apoplexiam.

<i>Apoplexia fit hyeme</i>	3.23
<i>fit per pluuiosam constitutionem</i>	3.16
<i>fit ex concussione</i>	7.60
<i>fit à melancholico humore</i>	6.56
<i>fit ab anno 40. ad sexagesimum</i>	6.57
<i>morbus est senum</i>	3.31
<i>Apopl. fortis soluta impossibilis</i>	2.42
<i>debilis soluta difficilis</i>	2.42

Ad Melancholiam.

<i>Melancholia fit vere</i>	3.20
<i>fit autumnno</i>	3.22
<i>Melancholia signa tumor & mæror</i>	6.23
<i>Item</i>	7.42
<i>atræ bilis redundantis signa</i>	7.72
<i>Melancholici plenius per inferiora purgandi</i>	4.9
<i>Melancholicos sanant varices superuenientes</i>	6.21
<i>Melancholicis superuenientes hæmorrhoides,</i> <i>bonum</i>	6.11
<i>Item</i>	6.21
<i>Melancholicis morbis humorum decubitus</i> <i>vere & autumnno suspecti</i>	6.56
<i>Quid</i>	

APHOR. HIPPOCR.

Quid illi decubitus denuntient 6.56

Ad Phrenitidem & delirium.

Phrenitis familiaris viris 3.30

sedatur à somno 2.2

secura est cum risu 6.53

periculosa cum studio 6.53

à peripneumonia mala 7.12

mala cum vrinis albis & perspicuis 4.72

Delirium à multa potatione malum 7.7

à profluvio sanguinis malum 7.9

ab Ileo malum 7.10

ex iectu capitis malum 7.14

in ossis excisione malum 7.25

in vigilia malum 7.18

Ad Maniam & Amentiam.

Mania fit autumno 3.22

fit vere 3.20

solvitur ecstasi 7.5

solvitur dysenteria 7.5

solvitur hydropo 7.5

solvitur superuenientibus varicibus aut

hemorrhoidibus 6.21

SYNOPSIS

Desipientia ex capitis ictu, malum 7.14

Qui supra quadragesimum annum insani
fiunt, raro conualescunt 7.85

Ad Epilepsiam.

Epilepsia fit vere 3.20

fit autumno 3.22

fit per pluuiosam constitutionem 3.16

familiaris est adolescentibus 3.29

quomodo in iuuenibus sanetur 2.45

qua etate sanabilis 5.7

qua etate insanabilis 5.7

Ad affectus Neruorum.

Neruis calidum vtile 5.18

frigidum inimicum 5.18

Neruus discissus nec augetur nec coalescit
6.19

Ad tremorem neruorum.

Tremor in febris delirio soluitur 6.26

Ad stuporem ac torporem.

Stupor ex capitis ictu malum 7.14

repentinus melancholiae signum 7.41

in morbis melancholicis 6.56

Torpor dolorem soluit 5.25

Ad

APHOR. HIPPOCR.

Ad Convulsionem.

Convulsio infantum affectus	3.25
fit in melancholicis	6.56
fit ex frigore	5.17
Item	5.20
fit ex repletionem & inanitionem	6.39
ab hæmorrhagia, malum	7.9
ab Ileo, malum	7.10
ab helleboro inducitur	4.16
ab helleboro lethalis	5.1
ex vulnere lethalis	5.2
ex superflua purgatione malum	5.4
ex medicamento purgante lethalis	7.26
ex vigilia malum	7.18
ab æstu vehementi, malum	7.13
superueniens hæmorrhagia malum	5.3
ex somnis per febres, malum	4.67
In acutis febribus mala	4.66
superueniens ebrjjs apoplecticis lethalis	5.5
Convulsionis signum in febribus	4.68
Convulsio mitigatur calido	5.22

SYNOPSIS

<i>frigida perfusione leuatur</i>	5.25
<i>superueniente febre tollitur</i>	4.57
<i>quartana superueniente tollitur</i>	5.71
<i>In fluxu muliebri mala</i>	5.57
<i>superueniens febre, non bonum</i>	2.26
<i>inducitur tumoribus in vlcere euanescentibus</i>	5.66

Ad Tetanum.

<i>Tetanus inducitur à frigore</i>	5.17
<i>Item</i>	5.20
<i>inducitur ab tumoribus in vlcere euanescentibus</i>	5.66
<i>intra quartum diem occidit, sin minus sanatur</i>	5.6
<i>ab aestu vehementi, malum</i>	7.13
<i>mitigatur calido</i>	5.22
<i>frigida perfusione leuatur</i>	5.21
<i>superueniente febre tollitur</i>	4.57

Ad Spasnum.

Spasmus in febre intermittente lethalis 4.49
Vide Conuulsionem & Tetanum.

Ad

APHOR. HIPPOCR.

Ad Vertiginem.

<i>Vertigo quid designet</i>	4.17
<i>fit hyeme</i>	3.23
<i>senibus familiaris</i>	3.31

Ad affectus oculorum.

<i>Oculi aegrorum considerandi diligenter</i>	6.52
<i>Oculorum humiditas senibus familiaris</i>	3.31
<i>mordicatio ab Aquilone</i>	3.17
<i>rubor à vomitu, malum</i>	7.3
<i>lippitudo qua tempestate fiat</i>	3.12
<i>Item</i>	3.14
<i>lippitudo fit æstate</i>	3.11
<i>Item</i>	3.21
<i>lippitudo fit per siccitates</i>	3.16
<i>lippitudini alui profluvium bonum</i>	6.17
<i>Oculorum convulsio in febribus intermitten-</i>	
<i>tibus lethalis</i>	4.49
<i>Superciliorum convulsio in iisdem febribus</i>	
<i>lethalis</i>	4.49
<i>Doloris oculi curatio</i>	6.31
<i>Item</i>	7.48
<i>Oculorum motum grauem efficit auster</i>	3.17
<i>Visus obtusus senibus familiaris</i>	3.31

B

SYNOPSIS

Ad Lacrymas.

*Lacrymæ spontaneæ in morbis absurdi nihil
denuntiant* 4.52

Item 7.86

*Lacrymæ inuoluntariæ absurdi aliquid signi-
ficant* 4.52

Item 7.86

Ad affectus Aurium.

Aurium humiditas infantium propria 3.24

senum propria 3.31

Aurium dolor fit æstate 3.21

Auditum hebetat Auster 3.5

exacuit Aquilo 3.17

Surditas in febre continua lethalis 4.49

*tollitur hæmorrhagia è naribus & alui
profluuiio* 4.60

tollitur biliosæ deiectionibus 4.28

sedat biliosas deiectiones 4.28

Ad affectus Narium.

Narium humiditas propria senum 3.31

*Nares humidiores minus integram sanitatem
demonstrant* 6.2

Nasi

APHOR. HIPPOCR.

Nasi peruersio in febre continua lethalis	4.49
Naribus apprehensis inhibitiō respiratiōis secundas expellit	5.49
Suffitus muliebrium ad nares pertingens secundam mulierem indicat	5.60
Grauedo fit autumno pluuiosa	3.13
fit autumno aquilonio	3.14
fit vere	3.20
in senibus coctionem non admittit	2.40
Ad hæmorrhagiam è naribus.	
Hæmorrhagia è naribus propria puerum	3.27
per febres aluum humectat	4.27
surditatem adimit	4.60
liberat ab abscessu articularum	4.74
suppressis menstruis bona	5.33
dolorem capitis soluit	6.10
Hæmorrhagia è naribus mala	4.25
in quartana febre praua	7.87
Ad Catarrhum.	
Distillationes senibus familiares	3.31
quo tempore sint senibus lethales	3.12
excitantur à frigore	5.24

SYNOPSIS

Destillationes in ventrem superiorem suppu-
rantur intra viginti dies 7.38

Ad Sternutationem.

Sternutamenti causa efficiens & materialis
7.53

Sternutatio sedat singultum 6.13

superueniens in difficili partu bona 5.35

Ad affectus Labiorum.

Labri peruersio in febribus lethalis 3.49

Oris.

Oris vlcera aestate fiunt 3.21

infantium familiaria 3.24

Oris amaritudo purgandi necessitatem indi-
cat 4.17

Linguae.

Lingua incontinens signum melancholicum
7.41

Balbuties alui profluuium tollitur 6.32

Dentium & gingivarum.

Gingivarum pruritus infantium proprius
3.25

Dentitio infantium propria 3.25

quos morbos inuehat 3.25

Lentor

APHOR. HIPPOCRATIS.

<i>Lentor circa dentes in febribus vehementiam indicat</i>	4.53
<i>Dentibus frigidum inimicum</i>	5.18
<i>Tonsillarum & Gutturis.</i>	
<i>Tonsillæ tument in pueris</i>	3.26
<i>Faucibus agrotantibus inspiciendæ sunt deiectiones</i>	2.15
<i>Strangulatio cum spuma lethalis</i>	2.43
<i>absque faucium tumore lethalis</i>	4.34
<i>Deglutio impedita quando lethalis</i>	4.35
<i>Colli peruersio in febribus lethalis</i>	3.35
<i>Ad Anginam.</i>	
<i>Angina fit vere</i>	3.20
<i>fit autumnno</i>	3.22
<i>fit per pluuiosam constitutionem</i>	3.16
<i>Vt lethalis, vt curabilis</i>	5.40
<i>Ab Angina tumor in collo bonum</i>	6.37
<i>Item</i>	7.51
<i>Ad Asthma & anhelitum.</i>	
<i>Asthma fit autumnno</i>	3.22
<i>familiare est pueris</i>	3.26
<i>familiare iuuenibus</i>	3.30
<i>familiare senibus</i>	3.31

SYNOPSIS

in febris conuulsionis est signum 4.68
 in febre continua lethale 4.50
 Ex asthma gibbi moriuntur 6.46
 Ad Vocem.

Rauedo fit hyeme 3.23
 Si obmutuerit repente obrius conuulsus mori-
 tur 5.5
 Si quis à dolore capitis repentino mutus fiat
 intra septimum diem moritur 6.51
 Concussio cerebri mutos facit 7.60
 Ad Tussim.

Tussis fit per aquiloniam tempestatem 3.5
 fit hyeme 3.13
 fit vere 3.20
 infantibus familiaris 3.24
 frequens senibus 3.31
 fit à frigore, niue, glacie 5.24
 superueniens hydropi malum 6.35
 Item 7.49
 Tussis sicca in febris ardentibus 4.54
 Ex tussi gibbi moriuntur 6.46

Ad Sputum Sanguinis.
 Sputum sanguinis spumosi à pulmone est 5.13
 est

APHOR. HIPPOCRATIS.

<i>est malum</i>	4.25
<i>adolescentibus familiare</i>	3.29
<i>dolorem capitis soluit</i>	6.10
<i>A sanguinis sputo, puris sputum malum</i>	7.15

Ad Pleuritidem.

<i>Pleuritis iuuenum affectus</i>	3.30
<i>fit hyeme</i>	3.23
<i>fit per austrinas constitutiones</i>	3.5
<i>quibus raro accidat</i>	6.33
<i>quot diebus repurgari debeat</i>	5.8
<i>Item</i>	5.15
<i>In pleuritide sputum considerandum</i>	1.12
<i>Dolores laterum an differant ab alijs perdis-</i> <i>scendum</i>	6.5
<i>Pleuritidi superueniens alui profluuium ma-</i> <i>lum</i>	6.16
<i>A pleuritide peripneumonia malum</i>	7.11
<i>In dolore lateris tumor est rubicundus</i>	5.66

Ad Peripneumoniam.

<i>Peripneumonia fit hyeme</i>	3.23
<i>affectus est iuuenum</i>	3.30
<i>si succedat pleuritidi, malum</i>	7.11

SYNOPSIS

Peripneumonia superueniens alui proflu-
uium, malum 6.16

Aperipneumonia phrenitis malum 7.12

Ad Empyema.

Empyici fiunt ex pleuriticis non repurgatis
5.8

Item 5.15

fiunt ex anginosis non repurgatis 5.10

Destillationes in thoracem suppurantur intra
viginti dies 7.39

Suppuratio succedit Erysipelati 7.20

In suppuratione tumor est rubicundus 5.65

Suppurationem impedit frigus 5.20

Suppuratio ubi non est manifesta 6.41

Suppurati vri debent 7.46

vt euadant quale pus esse debet 7.46

Ad Tabem seu Phthisim.

Tabes quo anno fiat 5.9

qua constitutione fiat 3.13

fit autumno 3.22

succedit hamorrhoidibus suppressis 6.12

familiaris adolescentibus 3.29

succedit pleuritidi 5.15

fit à

APHOR. HIPPOCR.

fit à puris sputo	7.16
Tabidis lac bonum	5.65
Tabidis superueniens profluuium alui est le- thale	5.14
Tabidorum sputum graecolens lethale	5.12
capilli defluentes lethale	5.12
Suppressio sputi purulenti tabidis lethalis	7.16
Tabidi per inferiora purgandi	4.8

Ad affectus Cordis.

Cordis vulnus lethale	6.18
Syncope accidit sanis qui purgantur	2.36
accidit ijs qui prae cibo viuntur	2.36
fit à tuberculi intus ruptione	7.8
in fluxu muliebri, malum	5.57
frequens sine manifesta causa lethalis	2.41

Ad affectus Mammarum.

Mammæ grauidarum repente graciles factæ abortum denuntiant	5.37
Item	5.54
quando id non contingat	5.54
Mammarum vna gracilescens quid portendat	5.39

SYNOPSIS

<i>Mammæ grauidarum solidæ sanum fœtum ostendunt</i>	5.53
<i>Lac è mammis grauidarum effluens fœtum imbecillum demonstrat</i>	5.53
<i>Lac generatur etiam in virginibus</i>	5.39
<i>cur id fiat</i>	5.39
<i>Sanguinis collectio ad mammas, maniam significat</i>	5.40
<i>Cucurbita adhibita mammis hysterica sistit</i>	5.50

Ad affectus Ventriculi.

<i>Ventres hyeme & vere natura calidissimi</i>	1.15
<i>Ventriculi æstus in febris malum</i>	4.65
<i>A ventris dolore diuturno, suppuratio</i>	7.23
<i>In ventrem effusus sanguis suppuratur</i>	6.20
<i>Ventris dolores & tumores sublimes leuiores & contra</i>	6.7
<i>Cardiogmos purgationis necessitatem indicat</i>	4.17
<i>Cardiogmos in febris malum</i>	4.65
<i>Ventriculi vulnera lethalia</i>	6.18
<i>Ad</i>	

APHOR. HIPPOCR.

Ad Famem.

Fame dominante ab omni agitatione & labore vacandum 2.16

Fames corpora siccatur 7.61

quibus utilis 7.61

Famem caninam vini potio soluit 2.21

Ad Sitim.

Potu impleri quàm cibo facilius 2.11

Sitim somnus sedat 5.27

Quibus in febris suis exigua 4.54

Sitis in febris lipyrijs 4.48

Sitis inditium est absolutæ purgationis 4.19

Sitientibus lac malum 5.65

Ad Vomitum.

Vomitum fit æstate 3.21

frequens in infantibus 3.24

fit in navigatione 4.14

fit à tuberculi intus ruptione 7.8

spontaneus quando conferat 1.2

spontaneus alui profluvium sistit 6.15

Vomitu purgandum æstate 4.4

SYNOPSIS

<i>Vomitus cauendus hyeme</i>	4.6
Item	4.12
<i>Vomitus praescribi non debet nisi aluo adstri-</i>	
<i>cta</i>	7.74
<i>Vomitus necessitatis signa</i>	4.17
<i>Ante vomitum dandus cibus</i>	4.13
<i>Vomitus nocet carnosus</i>	4.7
<i>nocet tabidis</i>	4.8
<i>nocet melancholicis</i>	4.9
<i>ab Ileo malum</i>	7.10
<i>Vomitus bilis fit praeciso cerebro</i>	6.50
<i>Vomitus atra bilis lethalis</i>	4.22
<i>A vomitu singultus malum</i>	7.3

Ad vomitum sanguinis.

<i>Vomitus sanguinis non bonus</i>	4.25
<i>sistitur in mulieribus erumpentibus men-</i>	
<i>struis</i>	5.32
<i>Vomitus sanguinis cum febre, malum</i>	7.38
<i>sine febre salutare</i>	7.38
<i>quibus rebus curatur</i>	7.38

Ad Singultum.

<i>Singultus fit ab inanitione vel replet.</i>	6.39
<i>fit ab</i>	

APHOR. HIPPOCRATIS.

fit ab inflammatione hepatis 5.59

à vomitu malum 7.3

ab Ileo malum 7.10

ab inflammatione hepatis malum 7.17

ex superflua purgatione malum 5.4

in senioribus supra modum purgatis non bonum 7.43

superueniens hæmorrhagia malum 5.4

Singultus tollit sternutatio 6.13

Luctuosa suspiria in acutis malum 6.34

Ad Ructum.

Ructus acidus longis intestinorum leuitatibus superueniens, bonum signum 6.1

Qui acidum eructant pleuritide vix laborant 6.33

Ad Oscitationem.

Oscitationem soluit vinum pari aquæ portione epotum 7.58

Ad choleram morbum.

Cholera morbus viris familiaris 3.30

Ad affectus hypochondriorum.

Hyponchondria suspensa murmurantia quid portendant 4.73

SYNOPSIS

Quibus hypochondria suspensa murmurant lac non bonum	5.65
Hypochondrij dolor sine inflammatione, su- perueniente febre soluitur	6.40
Dextri hypochondrij durities in ictero non est bona	4.64

Ad affectus hepatis.

Hepar inflammatum singultum parit	5.59
estq; id malum signum	7.17
Hepar durum in ictero malum	6.42
Item	4.64
Hepar suppuratum adurit	7.47
pus eius quid denotat	7.47
quo casu lethale	7.47
Quibus hepar circumdolet superueniens febris soluit dolorem	7.54
Iecoris vulnus lethale	6.18
Hepar aqua plenū in omentum se exonerans hydropem lethalem parit	7.57

Ad Cachexiam.

Cachexia senibus familiaris	3.31
Ad	

APHOR. HIPPOCR.

Ad Leucophlegmatiam.

Ex leucophlegmatia ascites generatur 7.78

Leucophlegmatia soluitur alui profluvio 7.30

Ad Tympanitem.

Tympanites quibus succedat 4.11

Ad Ascitem & omnem
hydropem.

Ascites succedit leucophlegmatia 7.78

Hydrops fit autumnis 3.22

fit sanatis in totum hæmorrhoidibus 6.12

fit à liene 6.43

quando lethalis 7.57

ut solvatur 6.14

Hydrops solvit maniam 7.5

Hydropi superueniens tussis malum 6.35

Item 7.49

Hydropici secati aut vsti euacuata tota aqua
moriuntur 6.27

Hydropicorum vlcera difficulter sanantur
6.8

Ad Ictericum.

Ictericus in febris ante septimum diem ma-
lum 4.62

SYNOPSIS

Septimo vel nono, vel vndecimo, vel decimo quarto die superueniens bonū 4.64

superueniens duro hepatis malum 4.64

Ictericis si fiat hepar durum malum 6.42

Ictericis flatibus parum obnoxij 5.73

Ad affectus Lienis.

Lienosi fiunt autumno 3.22

facti hydropici moriuntur 6.43

Lienosis superueniens dysenteria, bonum 6.48

Ad perturbationem & alui profluuium.

Perturbatio ventris quando proffit 1.2

quando tollat febres 4.60

Profluuium alui fit æstate 3.21

fit per pluuiosam constitutionem 3.16

fit in infantibus 3.25

fit in viris 3.30

fit in senibus 3.31

balbis familiare 6.32

iuuat lippiētes 6.17

soluit leucophlegmatiam 7.30

In profluuiio alui mutatio excrementorum

iuuat 2.14

Excre-

APHOR. HIPPOCR.

Excretionēs biliosæ faucibus aëris corpus mi- nimè sanum arguunt	2.15
Biliosæ deiectiones superueniente surditate cessant & è contra	4.28
In biliosis deiectionibus per febres lac dare ma- lum	5.65
In alui profluuiò inspiciendi oculi	6.52
Ab alui profluuiò supernæ purgationis reten- tio	7.82
Alui profluuium à fluxione capitis	7.82
Alui profluuium cum excrementis spumosis pituitam ex capite defluere arguit	7.31
Alui profluuium in grauidis periculum abor- tus minatur	5.34
succedens tabidis lethale	5.12
Item	5.14
succedens pleuritidi malum	6.16
succedens peripneumoniæ malum	6.16
Longum alui profluuium spontaneus vomitus soluit	6.15
Alui profluuium causa dysenterici	7.79
Ad Dysenteriam.	
Dysenteria fit per siccitates	3.16

C

SYNOPSIS

familiaris viris	3.30
fit autumno	3.22
fit ab alui profluvio	7.79
lienosis est bona	6.48
superueniens mania bonum	7.5
ab atra bile lethalis	4.24
à deiectione sincera malum	7.24
A dysenteria lenteria	7.80
In longa dysenteria, inedia malum	6.3
Quibus dysenteria fit tumores sunt rubicundi	
5.66	
In dysenteria caruncularum deiectio lethalis	
4.26	
Deiectiones nigra spontanea pessima	4.21
Atra bilis deiectio lethalis	4.22
Atra bilis deiectio in acutis morbis vel diu- turnis, in vulneratis aut extenuatis le- thalis	4.23
Ad Lenteriam.	
Lenteria fit autumno	3.22
A dysenteria	7.80
familiaris viris	3.30
superueniēs lienosis dysentericis leth.	6.45
	12

APHOR. HIPPOCR.

In lienteria longa acidus ructus bonum 6.1

Lienterici hyberno tempore per superiora pur-
gandi 4.12

Ad Tenesinum.

Tenesmus abortum facit 7.28

Ad Ileon.

Ileos fit autumnis 3.22

ex stillicidio urinae lethalis 6.44

Ab Ileo vomitus, singultus, desipientia, vel
convulsio malum 7.10

Ad affectus Intestinorum.

Gracilia intestina non coalescunt semel vul-
nerata 6.24

Tenuiora intestina vulnerata, lethale 6.18

Recto intestino inflammato stillicidium urinae
accidit 5.59

Ad Lumbricos.

Lumbrici rotundi & ascarides generantur in
pueris 3.26

Ad dolores ventris.

Tormina & circa umbilicum dolores contu-
males degenerant in tympanitem 4.11

SYNOPSIS

Dolores ventris sublimis leuiiores 6.7

non sublimis grauiiores 6.7

Dolores fortes circa viscera in febribus acutis
malum 4.66

In forti dolore ventris extremarum partium
frigiditas mala 7.27

A ventris dolore diuturno suppuratio 7.23

Dolor imi ventris vesicam malè habere signi-
ficat 7.40

Ad abdominis extenuationem.

Abdominis extenuatio in morbis, malum 2.35

Abdominis extenuatio ex purgatione malum
2.35

Abdominis depressio in longis morbis malum
7.90

Ad affectus Ani.

Herpetes exedentes ani 5.22

illis quid amicum quid inimicum 5.22

Ad Hæmorrhoidas.

Hæmorrhoides familiares viris 3.30

bonæ 4.25

superuenientes atrabilarijs bonum 6.11

superuenientes renũ passionib. bonam 6.11
super-

APHOR. HIPPOCR.

superuenientes infanientibus salutaras

6.21

Hæmorrhoidibus in totum sanatis periculum
hydropis vel tabis

6.12

Ad affectus renum.

Renum passiones senibus familiares

3.31

Renum vitia in senibus difficulter sanantur

6.6

Calculi familiares pueris

3.26

Renum passionibus superuenientes hæmor-
rhoides bonum

6.11

In morbo renali quos abscessus sperare debea-
mus

7.37

Ex renibus purulentis urinae stillicidium

5.59

Mictus sanguinis venulam in renibus ruptam
designat

4.78

Mictus sanguinis vel puris renum exulcera-
tionem significat

4.75

Carunculae vel capilli in urinis existentes à re-
nibus excernuntur

4.76

Bulle in urinis morbum renalem & longum
signant

7.35

C 3.

SYNOPSIS

Pinguis superficies vrinarum acutum renum
morbum ostendit 7.36

Ad affectus Vesicæ.

Vesicæ morbos arguit dolor imi ventris 4.80
idem facit mictus aut grumus sanguinis
4.80

Vesicæ morborum signa quæ 4.80
Vesicæ exulcerationem mictus sanguinis aut
puris ostendit 4.75

Item 4.81

idem facit grauis odor vrinarum 4.81

squamulæ quoque id arguunt 4.81

Vesicæ scabiem ostendunt crassæ vrinæ & fur-
furacæ 4.77

Vesicæ calculum arguit vrina arenosa 4.79

Vesicæ herpetibus quid amicum aut inimi-
cum 5.22

Vesicæ vitia in senibus difficulter sanantur
6.6

Vesicæ vulnera, lethalia 6.18

Ad difficultatem Vrinæ.

Difficultas vrinæ familiaris senibus 3.31
fit per

APHOR. HIP.

<i>fit per austrinam constitutionem</i>	3.5
<i>soluitur venæ sectione</i>	7.50
<i>soluitur vini potione</i>	7.50

Ad stillicidium vrinæ.

<i>Stillicidium vrinæ fit per siccitates</i>	3.16
<i>fit Autumno</i>	3.22
<i>familiare senibus</i>	3.31
<i>accidit renibus purulentis</i>	5.59
<i>accidit recto intestino aut vtero inflam-</i>	
<i>mati</i>	5.59
<i>Stillicidiū vrinæ, vesicæ morbos arguit</i>	4.80
<i>Item</i>	7.40
<i>Ex vrinæ stillicidio ileos lethalis</i>	6.44
<i>Stillicidium vrinæ soluitur venæ sectione &</i>	
<i>vini potu</i>	7.50

Ad Vrethræ affectus.

<i>Vrethræ tubercula post suppurationem sol-</i>	
<i>uuntur</i>	4.82
<i>Item</i>	7.59

Ad signa desumpta ex vrinis.

<i>Vrinæ signa sunt morborum</i>	1.12
<i>Vrina inspicienda num sanis similis</i>	7.70

SYNOPSIS

<i>Vrinae sedimentum</i>	4.69
<i>Vrina copiosè fluentes hypochondria elata deprimunt</i>	4.73
<i>Vrina plurima noctu facta parvam deiectionem significat</i>	4.83
<i>Vrina pituitam in epigastrio collectam expurgare potest</i>	7.56
<i>Ex vrinis crassis, grumosis & paucis tenues factae & copiosae bonum</i>	4.69
<i>Vrina multa, crassa & alba abscessu ad articulos liberat</i>	4.74
<i>talis in febris laboriosis quarto die exire incipit</i>	4.74
<i>Vrinae iumentorum similes dolorem capitis denuntiant</i>	4.70
<i>Nubecula rubra quarto die apparens crisin die septimo denuntiat</i>	4.71
<i>Vrina alba & pellucida mala praesertim in phrenitide</i>	4.72
<i>Vrinae graueolentes vesicae exulcerationem arguunt</i>	4.81
<i>Sedimenta vrinarum velut farina crassior longitudinem morbi denuntiant</i>	7.32
Sedi-	

APHOR. HIPPOCR.

Sedimenta biliosa acutum morbum ostendunt

7.33

Diuisa urinae turbationem corporis indicant

7.34

Bulle urinis innatantes nephritim indicant

7.35

Item longum morbum

7.35

Superficies urinae adipalis & conferta nephriticum morbum acutum arguit

7.36

Urina crassa cum exiguis carunculis est à rene

4.76

Urina crassa cum pilis à rene est

4.76

furfuracea scabiem vesicae indicat

4.77

sabulosa calculum vesicae arguit

4.79

squamosa vesicae ulcerationem

4.81

purulenta item vesicae ulcerationem

4.81

sanguinea ruptam in rene venam

4.78

Urina sanguinea renum aut vesicae exulcerationem arguunt

4.75

idem faciunt purulenta

4.75

Mictus sanguinis aut grumi vesicam affectam arguit

4.80

Item

7.40

SYNOPSIS

Mictus sanguinis vesicae ulcerationem significat 4.81

Ad affectus Pudendorum.

Genitalium putredines aestate contingunt 3.21

Pudendorum herpetibus calidum amicum 5.22

frigidum inimicum 5.22

Pudendorum intemperies sterilitatis est causa 5.64

Præputium discissum nec augetur nec coalescit 6.19

Ad affectus uterinos & muliebres.

Uteri herpetibus calidum amicum, frigus inimicum 5.22

Uteri procidentia 5.47

Os uteri durum comprimitur 5.55

Uteri inflammatio urinae stillicidium aduocat 5.59

Uteri Erysipelas in muliere grauida lethale 5.43

Uteri frigiditas aut caliditas, humiditas aut siccitas, crassities aut tenuitas sterilitatis causa 5.63

Uterina suffocationi sternutatio bonum 5.35

Ad

APHOR. HIPPOCR.

Ad Menstrua.

- Menstruis deficientibus mulier podagra potest laborare* 6.29
bene fluentibus non laborat 6.29
Menstrua suppressendi ratio 4.50
Menstruis deficientibus lac generatur etiam in virginibus 5.39
Menstruis deficientibus sanguis è naribus fluens bonum 5.33
Menstruis decoloribus nec statis periodis fluentibus purgatio necessaria 5.36
Menstrua in gravidis fluentia foetum imbecillum arguunt 5.61
Ex suppressis menstruis morbus 5.58
Menstrua prouocantur suffitu aromatum 5.28
Ex nimia copia menstruorum morbus 5.58
Menstruis erumpentibus conuulsio aut syncope adueniens malum 5.57
Mulier sanguinem vomenti menstruis erumpentibus solutio 5.32
Mulieres morbi terminantur menstruis erumpentibus 3.28
sin minus consenescent 3.28

SYNOPSIS

Ad fœcunditatem & sterilitatem.

Fœcunditatis causa	§.63
Sterilitatis signa	§.63
causa	§.63
Item	§.46
Autumnus Aquilonius mulieribus est utilis	

3.14

Ad Conceptionem.

Conceptionis signa	§.62
Item	§.60
In gravidis os vteri comprimitur	§.52
Conceptionis signa	§.41
Concepti maris signa	§.42
Conceptæ fœminæ signa	§.42
Mares in dextris, fœminæ in sinistris	§.48

Ad Abortum.

Abortus qua anni constitutione fiat	3.12
Abortus ex venæ sectione	§.31
Abortus periculum à profluio alui	§.34
Gravidarum mamma si gracilescant abortum significant	§.37
	Abor-

APHOR. HIPPOCRATIS.

Abortus futuri signa 5.38

Abortus ex utero tenui 5.44

Acetabula uteri mucosa abortus causæ 5.45

Abortus ex tenesmo 5.51

Item 7.28

Extenuatio mammarum foetus corrupti signum 5.54

Grauidæ febricitantes vel difficulter pariunt vel abortiunt 5.56

Grauidarum mammae solidae foetum sanum ostendunt 5.53

fluidæ vero imbecillum 5.53

Menstrua in grauidis fluentia foetum imbecillum arguunt 5.61

Ad difficilem Partum.

Difficili partui sternutatio bonum 5.35

Secundarum exclusio quomodo procurari possit 5.49

Grauidæ febricitantes difficulter pariunt 5.56

Ad Grauidas mulieres.

Grauidæ sunt medicandæ & purgandæ à quarto mense ad septimum 4.1

Item 5.29

SYNOPSIS

<i>Grauidam capi morbo acuto lethale</i>	5.30
<i>Grauidarum mammae si gracilescant abortus denuntiant</i>	5.37
<i>Erysipelas vteri in grauida lethale</i>	5.43
<i>Grauidarum mammae solidae foetum sanum ostendunt</i>	5.53
<i>fluida vero imbecillum</i>	5.53
<i>Grauidae febricitantes vel difficulter pariunt, vel abortiunt</i>	5.56
<i>Menstrua in grauidis fluentia foetum imbecillum arguunt</i>	5.61
<i>Collectio sanguinis in mammis furorem significat</i>	5.40
<i>Ad Articulorum affectus.</i>	
<i>Articulorum morbi fiunt vere</i>	3.20
<i>fiunt per pluviosam constitutionem</i>	3.16
<i>Articul. dolores senibus familiares</i>	3.31
<i>soluuntur affusa frigida</i>	5.25
<i>Articulorum labores fiunt post febres longas</i>	4.44
<i>fiunt ijs qui plurimo vtuntur cibo</i>	4.45
<i>Articulorum tubercula fiunt ijs qui plurimo cibo vtuntur</i>	4.45
<i>Arti-</i>	

APHOR. HIPP.

Articulorum tumores soluit affusa frigida

5.25

Articulorum abscessus fiant ex lassitudinibus
febrilibus

4.31

hos præuertit vrina multa crassa, & alba
facta

4.74

eos soluit hæmorrhagia è naribus

4.74

Ad coxæ & genuum affectus.

A coxendicis dolore diuturno luxatio & muci
generatio

6.58

A coxendicis dolore diuturno luxatio, claudi-
catio & cruris tabes

6.59

Coxæ laxationi conuenit vstio

6.59

Genuum grauitas necessariam purgationem
indicat in ijs qui non febricitant

4.20

Ad Podagram.

Podagra fit vere & autumno

6.55

Podagra non laborant Eunuchi

6.28

Podagra nõ laborat mulier menstrualis

6.29

Podagra non laborat puer ante veneris vsum

6.30

Podagra quadraginta diebus finitur

6.49

Podagram soluit affusa frigida

5.25

Apho-

SYNOPSIS

Aphorismi spectantes ad affectus externos.

Et primo

Ad affectus Capillorum.

C apilli defluentes in tabe lethale	5.11
Item	5.12
Calui nunquam fiunt Eunuchi	6.28
Calui non sunt varicosi	6.34
Caluis superuenientes varices capillos resti- tuunt	6.34

Ad Pustulas.

Pustula ulcerosa vere fiunt	3.20
Pustula lata non admodum pruriunt	6.9

Ad Tubercula.

Tubercula vere fiunt	3.20
familiaria pueris	3.26
cum nascuntur in corpore excretionibus in- spicienda	2.15
febris longis succedunt	4.44
Item	7.67
nascuntur ijs qui plurimo utuntur cibo	4.45
Item	7.68

Tubercu-

ATHOR. HIPPI.

Tuberculum vtrebra suppuratione facta sol-
uitur 4.82

Item 7.59

Tuberculum intus ruptum exolutionem, vo-
mitū, aut animi deliquium affert 7.8

Ad Tumores contra naturam.

Tumores molles boni, crudi mali 5.68

Tumores articularū affusa frigida leuat 5.25

Tumores in vlceribus apparentes conuulsio-
nem & insaniam auertunt 5.66

Sine tumore vulnera, ingens malum 5.67

Tumor in collo ex angina bonum 6.37

Tumor in pectore ex angina bonum 7.51

Ad Inflammationem.

Inflamatio vmbilici infantib familiaris 3.24

Inflammationes frigidis curandæ 5.23

Ad Syderationem & Gangrænam.

Quibus cerebrum syderatum tribus diebus
pereunt 7.52

Gangræna à frigore 5.22

Ad Erysipelas.

Erysipelas non vlceratum iuuat 5.23

vlceratum ledit 5.23

D

SYNOPSIS

<i>uteri in grauida lethale</i>	5.43
<i>ab exterioribus partibus ad interiores verti</i>	
<i>non bonum</i>	6.25
<i>ab interioribus verti ad exteriora bonum</i>	
	6.25
<i>Erysipelas ex ossis exustione</i>	7.19
<i>Ex Erysipelate putredo aut suppuratio</i>	7.20
<i>Ad Herpetem.</i>	
<i>Herpetibus exedentibus ani, pudendorum, uteri,</i>	
<i>vesicae, quid amicum, quid inimicum</i>	5.22
<i>Ad Strumas.</i>	
<i>Struma puerorum morbi</i>	3.25
<i>Ad Cancrum.</i>	
<i>Cancros occultos melius non curare</i>	6.38
<i>Ad Bubonem.</i>	
<i>Ex bubonibus febres omnes mala praeter dia-</i>	
<i>rias</i>	4.55
<i>Ad Leporam.</i>	
<i>Lepora fit vere</i>	3.20
<i>Ad Impetigines, ardores, & pruritus.</i>	
<i>Impetigines fiunt vere</i>	3.20
<i>Ardores fiunt in viris</i>	3.30
<i>Pruritus senibus familiaris</i>	3.31
<i>Ad</i>	

APHOR. HIPPOCR.

Ad Verrucas.

Verrucae familiares pueris 3.26

Ad Pus.

Dum pus conficitur dolores ac febres accidunt
magis 2.47

vide Empyema supra.

Ad Vulnera.

Vulnera magna sine tumore mala 5.67

Ex vulnere conuulsio lethalis 5.2

Vulnera vesicae, cerebri, cordis, septi, tenuio-
rum intestinorum, ventriculi, iecoris
lethalia 6.18

Vulnera ossis, cartilaginis, nerui, genae, prae-
putij non coalescunt 6.19

Ad Ulcera.

Ulcerosae pustulae fiunt vere 3.20

Ulcera oris familiaria infantibus 3.24

Ulcus vesicae & renum signa 4.75

Ulcus frigidum mordax 5.20

Ulcus calidum ininfectum 5.21

In ulceribus tumores auertunt conuulsionem
& insaniam 5.66

Ulcera circumglabra praua 6.4

SYNOPSIS

Vlcera hydropicorum curatu difficilia 6.8

Vlcera à frigore 5.22

A forti in vlceribus pulsu profluuium sang.
7.22

*In vlceribus annuis aut diuturnis os abscedere
necessarium est* 6.45

*Ad fracturas, luxationes, & vitia
offium.*

Fracturis offium calidum amicum 5.22

Luxatio vertebrarum pueris familiaris 3.26

In osse agrotante caro liuida malum 7.2

In ossis excusione erysipelas 7.19

In ossis praecisione desipientia 7.25

Os abscissum non coalescit 7.29

Abscessus ossis ex corruptione 7.81

Ad Cartilaginis affectus.

Cartilago abscissa non coalescit 7.29

APHOR. HIPPOCR.

Aphorismi ad res naturales &
non naturales pertinentes.

Et primo

Ad Naturam.

Natura moderationem amat 2.4

Natura nimium omne inimicum 2.51

Ad vitam & calidum innatum.

Vita brevis 1.1

Calidum innatum viget hyeme & vere 1.15

paucum in senibus 1.14

in quibus multum 1.14

Ad temperamenta & constitutiones.

*Temperamenta cum tempestatibus bene vel
malè conueniunt* 3.2

Naturalis constitutio inspicienda 1.3

Ad habitus corporis.

Constitutio athletica periculosa 1.3

Athletæ calidiores hyeme & vere 1.15

Craffi & pingues breuioris vitæ 2.44

D 3

SYNOPSIS

Graciles longioris vite	2.44
Carnosi purgandi per inferiora	4.7
Graciles purgandi per superiora	4.6
Eunuchi neque calui neque podagrici	6.28
Magnitudo corporis in iuuenib. elegans	2.54
in senibus inutilis	2.54
Magnitudo corporis deterior paruitate	2.54
Viris cutis est rara	5.70
Pilus indicium est raritatis corporis	5.70
Ad Tempestates anni vniuersim sumptas.	
Temporum mutatio prodest	2.45
Tempestates anni constantes quos morbos pa- riant	3.8
inconstantes quos	3.8
Tempestates consideranda	1.2
item	1.12
item	1.17
Temporum mutationes pariunt morbos	3.1
Ad tempestatem Vernam.	
Ver sanum pueris & puberibus	3.18
Ver saluberrimum	3.9
Ver siccum & aquilonium quid afferat	3.12
Ver	

APHOR. HIPPOCR.

Ver pluuioſum & australe quid moliatur 3.11

Vere qui bene degant 3.18

Verni morbi 3.20

Item 6.55

Vernus morbus eſt podagra 6.55

Vere & hyeme plenius cibandum 1.15

Ver facile poſt hyemem cibos fert 1.18

Ad æſtiuam.

Æſtate qui bene degant 3.18

Æſtatis morbi 3.21

Quartana æſtiua 2.25

Æſtius ſudores 3.6

Æſtate febres acutæ, lippitudines, dyſenteria

3.11

Æſtas grauis mulieribus & viris humidiori-
bus

3.11

Æſtas veri ſimilis quid inferat 3.6

Æſtas ſicca & aquilonia quid præſtet 3.13

Æſtas cibos difficillimè fert 1.18

Ab æſtu conuulſio & diſtentionis malum 7.13

Æſtate quâ purgandum 4.4

Æſtas ſenibus ſalubris 3.18

SYNOPSIS

Ad Autumnum.

<i>Autumnus aquilonius & siccus quibus natu-</i>	
<i>ris salubris</i>	3.14
<i>quos morbos inferat</i>	3.14
<i>Autumnus tabidis malus</i>	3.10
<i>morbos habet exitiales</i>	3.9
<i>morbos habet acutissimos</i>	3.9
<i>Autumnales morbi quando expectandi</i>	3.4
<i>Autumnus pluuiosus quid inferat</i>	3.13
<i>quartanas parit</i>	2.25
<i>tabes</i>	3.10
<i>grauedines & tabes</i>	3.13
<i>tusses, rauedines, dolores capitis</i>	3.13
<i>Autumnus cibos difficillime fert</i>	1.18
<i>Autumno qui bene degant</i>	3.18
<i>Autumnales morbi</i>	3.22
<i>Item</i>	6.55
<i>Autumnus senibus salubris</i>	3.18

Ad Hyemem.

<i>Hyeme bene degunt etate constantes</i>	3.18
<i>Hyemales morbi</i>	3.23
<i>Hyems australis quid inferat</i>	3.12
<i>quid aquilonia</i>	3.11
<i>Hyems</i>	

APHOR. HIPPOCR.

Hyems cibos facile tolerat 1.18

Hyeme plenius cibandum 1.15

Hyeme somni longissimi 1.15

Ad austrinam constitutionem.

Austri effectus 3.5

Morbi ab austro 3.5

*Austrina constitutio dissolvit corpora, hume-
stat, auditum obtundit, capita aggra-
uat, vertigines facit, &c.* 3.17

Ad Aquiloniam constitutionem.

Ab Aquilone morbi 3.5

Aquilonie constitutionis utilitates 3.17

vitia item 3.17

Ad Pluviosam constitutionem.

*Per pluuiam constitutionem qui morbi præ-
sertim fiant* 3.26

Ad Siccam constitutionem.

Sicca constitutio quos morbos pariat 3.7

Siccitates imbribus salubriores 3.15

Siccæ constitutionis morbi 3.16

Ad loca & regiones.

Regio consideranda à Medico 1.2

item 1.17

SYNOPSIS

Locorum mutatio prodest 2.45
Ad Aetates.

Aetas inspicienda 1.2

item 1.15

item 1.17

Aetatis mutatio prodest 2.45

Aetates bene vel male se habent ad tempora

3.3

loca 3.3

victus genera 3.3

Aetatum differentiae 1.13

Ad Infantiam.

Infantium recens natorum morbi 3.24

Infantium grandiorum morbi 3.25

*Infantium morbi quando iudicentur atque
solvantur* 3.28

Ad Pueritiam.

Puerorum morbi 3.26

Pueri non podagrici 6.30

Pueri qua tempestate bene degant 3.18

Pueri difficulter ieiunant 1.13

item 1.14

Pueri

APHOR. HIPPOCR.

Pueri victu humido uti debent	1.16
Puerorum morbi quando solvantur	3.28
Ad Pubertatem.	
Puberes qua tempestate bene degant	3.18
Ante pubertatem epilepsia curabilis	5.7
Puberum morbi	3.28
Ad Adolescentiam.	
Adolescentum morbi	3.29
Ad Iuuentutem.	
Iuuenes morbo comitiali laborant	2.45
Aluus Iuuenum humida bona	2.53
Iuuenum aluus qualis	2.20
Iuuenum morbi	3.30
Ad virilem ætatem.	
Viri qua tempestate bene degant	3.18
Virorum morbus apoplexia	6.57
Virorum morbi	3.30
Ad Senectutem.	
Senibus parum calidi innati	1.14
Senes frigidum habent corpus	1.14
paucis fomitibus egent	1.14
Senes iuuenibus minus agrotant	2.39
Senum morbi longi	2.39

SYNOPSIS

<i>Senum rauedines & grauedines coctionem non admittunt</i>	2.40
<i>Senes assueti minus offenduntur laboribus & motu quam iuuenes non consueti</i>	2.49
<i>Senes qua tempestate bene degant</i>	3.18
<i>Senum morbi renales difficiles curatu</i>	6.6
<i>Senum morbi</i>	3.31
<i>Senes cur facilius ieiunium ferunt</i>	1.13
<i>Item</i>	1.14
<i>Alius senum sicca & mala</i>	2.53

Ad Consuetudinem.

<i>Labores assueti facilius feruntur</i>	2.49
<i>Consueti insuetis minus molesta</i>	2.50
<i>Mutatio aliqua repentina, periculosa</i>	2.51
<i>Mutare remedia nō licet etsi non prosint</i>	2.52
<i>De consuetudine</i>	1.17
<i>Item</i>	1.16
<i>Item</i>	2.45

Ad Cibum.

<i>Ciborum mutatio prodest</i>	2.45
<i>Qui prauo vtuntur cibo cito exoluuntur</i>	2.36
<i>Ex cibis prognostica desumpta</i>	2.32
<i>Bene</i>	

APHOR. HIPPOCRATIS.

Benè cibatus ex aegritudine & non confirma- tus malum	2.31
Cibus cito nutriens cito elabatur	2.18
Cibus præter naturam ingestus morbum facit	2.17
Impura corpora quo magis nutries eo magis ledes	2.10
Extenuata corpora ut reficere oporteat	2.7
Paulo deterior cibus, sed iucundior præferen- dus est	2.38
Victus humidus consuetis viilis	1.16
conuenit pueris	1.16
In accessionibus cibum dare noxium	1.11
Item	1.19
Victu tenuissimo quando utendum	1.8
Victus tenuis in longis morbis semper, in acutis interdum periculosus	1.4
Victus extremè tenuis grauis	1.4
In victu tenui magis delinquent aegri	1.5
Tenuis victus sanis periculosus	1.5
Cibus cum morbo conferendus	1.7
Item	1.8
Item	1.9

SYNOPSIS

<i>dandus ut aeger sufficiat</i>	1.10
<i>distribuendus pro ratione morbi</i>	1.17
<i>quoties in die exhibendus</i>	1.17
<i>Victu tenui quando utendum</i>	1.10
<i>Item</i>	1.7
<i>Cibus plenior quando</i>	1.15
<i>Cibus nimius non roborat</i>	2.8
<i>morbum facit</i>	2.17
<i>Cibus est sano robur</i>	7.69
<i>febricitanti morbus</i>	7.69
<i>Ad Satietaem.</i>	
<i>Refectioes extremae periculosa</i>	1.3
<i>Satieta modum non excedat</i>	2.4
<i>Ad Famem.</i>	
<i>Inedia periculosa</i>	1.3
<i>Fames humidis corporibus utilis</i>	7.61
<i>desiccet</i>	7.61
<i>Ieiunium qui melius ferant</i>	1.13
<i>Fames modum non excedat</i>	2.4
<i>Vbi fames non laborandum</i>	2.16
<i>Famem vini potio soluit</i>	2.21
<i>Ad Sitim.</i>	
<i>Sitis est terminus purgationis</i>	4.19
	<i>Sitim</i>

APHOR. HIPPOCR.

Sitim somnus sedat 5.27

Ad Potum.

Paulo deterior potus, sed iucundior preferendus meliori 2.38

Potus facilius implet quam cibus 2.11

Ad Aquam.

Aqua quæ leuissima 5.26

Ad Vinum.

Meri potio soluit dolores oculorum 6.31

Item

7.48

soluit vrinae stillicidium 7.50

soluit famem 2.21

Vinum pari aqua portione epotum quos usus habeat

Ad Motum & Quietem.

Motus turbat corpus 4.14

Motus à sumpto elleboro commodus 4.14

Item

4.15

Lassitudo spontanea denuntiat morbum 2.5

Lassitudo in febribus 4.31

Quies lassitudinis remedium 2.48

Quies sistit ellebori operationem 4.15

SYNOPSIS

Ad Somnum & vigiliam.

Somnus sumpto elleboro minus cōmodus	4.14
sistit enim eius vim purgatoriam	4.15
Somnus sit moderatus	7.75
sit im sedat	5.27
Somnus hyeme & vere longissimus	1.15
Somnus in morbis laboriosus, letalis	2.1
in morbis iuuans, bonus	2.1
delirium sedans bonus	2.2
immoderatus malus	2.3
Vigilia immodica, mala	2.3
sint moderata	7.75
adsunt in senibus	3.31

Ad excreta & retenta.

Excrementa ineuntia secundum naturam	
iuuant	1.2
Item	1.23
Item	1.25
Excrementa signa sunt morborum	1.13
Excrementa seu deiectiones non multitudine,	
sed qualitate aestimanda	1.23
Excretiones inspicere oportet	2.15
Alvus	

APHOR. HIPP.

Aluus iuuenum humida fit in senectute sicca

2.20

Aluus iuuenum sicca fit in senectute humida

2.20

Alui humida meliores siccis

2.53

*Vide praterea Aphor. 21.22. & 23. sectionis
quarta.*

Ad Sputa & Sudores.

Sputa tabidorum graueolentia quid arguant

5.11

*Excreationes in febris acutis quæ bonæ quæ
malæ*

7.73

Sudores signa sunt morborum

1.13

*Nonnulli Aphorismi ad The-
rapeuticam spectantes.*

Ad Euacuationem.

E *vacuationes extrema periculosa* 1.3

E *uacuandum vsque ad syncopem* 1.23

Euacuatio curat morbos ex repletionem 2.22

Repletio curat morbos ex euacuatione 2.22

E

SYNOPSIS

Ad Purgationem.

<i>Medicari oportet cocta non cruda</i>	1.22.
<i>Medicari oportet turgentia</i>	1.22
<i>Medicandum in principijs morborum</i>	2.29
<i>Non medicandum in vigore morbi</i>	2.29
<i>Medicandum in acutis eodem die</i>	4.10
<i>Turgente materia purgandum</i>	4.10
<i>Primo die quando purgandum</i>	4.10
<i>In principijs morborum medicari non oportet</i>	1.22
<i>Item</i>	1.24
<i>Medicamenta non exhibenda in iudicatione morborum</i>	1.20
<i>Medicamenta purgantia raro in acutis</i>	1.24
<i>Purgationis necessaria signum</i>	2.28
<i>Purgationem qua indicent</i>	4.17
<i>Item</i>	4.41
<i>Purgationem superiorem qua indicent</i>	4.18
<i>inferiorem qua</i>	4.18.
<i>Item</i>	4.20
<i>In purgationibus qua educenda</i>	4.2
<i>Item</i>	4.3
	Si

APHOR. HIPPOCR.

<i>Si qualia oportet purgentur confert</i>	1.25
<i>Purgationes noxiae sanis</i>	2.27
<i>Aestate per quas partes purgandum</i>	4.4
<i>Vere purgandum</i>	6.47
<i>Purgatio circa caniculam difficilis</i>	4.5
<i>Mouere & alterare corpus repente noxiam</i>	2.51
<i>Tabidi quæ via purgandi</i>	4.8
<i>Melancholici quæ via purgandi</i>	4.9
<i>Grauidæ quando medicandæ</i>	4.1
<i>Corpora purganda fluida esse oportet</i>	2.9
<i>Item</i>	7.74
<i>Fluida corpora quomodo reddenda</i>	7.74
<i>Grauidæ quando purgandæ</i>	5.29
<i>Purgationis absolutæ signum sitis</i>	4.19
<i>Purgatio superflua quid afferat</i>	5.4
<i>Purgatio solui oculorum dolorem</i>	6.31
<i>Convulsio ex medicamento lethalis</i>	7.26
<i>Purgatio quæ utilis</i>	4.2
<i>Item</i>	4.3
<i>Hyeme quæ via purgandum</i>	4.4
<i>Graciles per superiora purgandi</i>	4.6

SYNOPSIS

<i>Carnosi per inferiora</i>	4.7
<i>Aestate per inferiora non purgandum</i>	4.7

Ad Helleborismum.

<i>Cautio in sumendo helleboro</i>	4.13
Item	4.14
Item	4.15
<i>Motus sumpto helleboro necessarius</i>	4.14
Item	4.15
<i>Helleborus quibus periculosus</i>	4.16
<i>Helleborus conuulsionem facit</i>	4.16
<i>Vide plura de vomitu.</i>	

Ad Venæ sectionem.

<i>Venæ sectionis vsus</i>	6.22
<i>Venæ sectio vere competit</i>	6.47
Item	7.55
<i>Venæ sectio soluit dolorem oculorum</i>	6.31
Item	7.48
<i>Venæ sectio vrinae difficultati auxiliatur</i>	6.36
<i>soluit vrinae stillicidium</i>	7.50
<i>Venæ frontis sectio</i>	5.69
Ad	

APHOR. HIPPOCR.

Ad Cucurbitulas.

Cucurbitarum vsus 5.50

Ad Balneum & fomentum.

Balneum soluit oculorum dolorem 6.31

Fomentum soluit oculorum dolorem 6.31

Ad ferrum & ignem.

Ferrum curat quæ medicamenta non curant

7.91

Ignis curat quæ ferrum non curat 7.91

Quæ ignis non curat, sunt incurabilia 7.91

Ad calefacientia atque refrigerantia.

Calidi vsus 5.22

noxæ 5.16

Frigidi vsus 5.21

Item 5.23

Item 5.25

Item 7.44

Frigidi noxæ 5.16

Frigidum quibus inimicum 5.18

Item 5.20

E 3

SYNOP. APH. HIP.

Item	5.22
Item	5.24
Refrigerata curantur calefacientibus	5.19
Ad Lac.	
Lactis vsus quibus noxius	5.65
quibus utilis	5.65
Ad Aromata.	
Aromaticum vsus	3.28
noxæ	5.28

FINIS.

APHO-



APHORISMORVM

HIPPOCRATIS

Sectio prima.

APHOR. I.



Βίη βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρὴ,
ὁ δὲ ἡμῶν ὄξυς, ἡ δὲ πείρα σφα-
λερὴ, ἡ δὲ κρίσις χαλεπὴ. Δεῖ δὲ
μόνον ἑαυτὸν παρέχον τὰ δεόντα
ποιέοντα, ἀλλὰ καὶ ἑαυτὸν νοσέοντα,
καὶ τὰς παρέοντες, καὶ τὰ ἔξωθεν.

Vita brevis, Ars verò longa, Occasio pre-
ceps, Experimentum periculosum, Iudicium
difficile. Nec verò satis est, medicum suum
fecisse officium, nisi suum quoque ægrotus,
suum astantes faciant, sinique externa ritè
comparata.

*Ars longa est, si eam hominis vita metiamur:
tam variarum enim rerum inuestigationem &
cognitionem requirit, ut homo (quantumvis di-
ligens ac laboriosus) hanc & inchoare & ad si-*

nem usque perducere non possit, nisi processerit
via doctrina aphoristica, qua omnes rei proprie-
tates quàm breuissimis verbis circumscribat. Pro-
pterea operae precium est qua quisque cognouit ea
mandare literis, & tradere posteritati commen-
tationes, qua rerum percipiendarum naturam
omnem diligenter ac citò, & sermone dilucido
interpretentur, ut qui volunt breui tempore ar-
tem longam ediscant, nec difficultate rei exterriti
auocentur à proposito, nec presumpta desperatio-
ne perueniendi quo volunt, animo statim initio
despondeant. Quod autem ars longa sit, hac etiam
ostendunt, Occasio preceps, qua ob humani cor-
poris defluxum assiduamq; mutationem citò pre-
terit: experimentum remedium medicorum pe-
riculosum, ob subiecti dignitatem: iudicium, quo
quid faciendum sit inquirimus, difficile, ob sectas
& varias in medicina opiniones. Intelligent au-
tem quantum veritatis habeant omnia qua in
hoc libro scribuntur, imò nihil eorum falsum esse
comperient, medicinam ita ut hîc docti fuerint,
facientes: si à medico, agro, ministris, externis,
nullus proficiatur error. Et hac sponsio reddit
auditiorem attentiorē ad intelligendos aphori-
smos. Porro cùm quatuor sint qua ad actionem
aliquam concurrunt, id à quo fit, sine quo non
fieret, per quod fit melius, & per quod tria illa
conseruantur: Medicus, est à quo fit actio, est enim
prin-

SECTIO I.

3

principale instrumentum curationis. Aeger habet rationem eius sine quo non fieret actio. Assidentes & externa per quod fit melius. Vsus rectus remediorum, per quod tria illa conseruantur. Vsus autem rectus est fusus per omnes aphorism.

I I.

Εν τῇσι θεωρηῇσι τῇ καρδίᾳ, καὶ τοῖσιν ἐμέτοισι τοῖσιν αὐτομάτως γινομένοισιν, καὶ μὴ οἷα δεῖ καρταίρεα καρταίρωνται, ξυμφέρει τε καὶ σφύρως φέρουσιν, καὶ δὲ μὴ, τοῦαντίον. ἔτω δὲ καὶ ἡ καρταίρεα, καὶ μὴ οἷα δεῖ γίνεα, γίνηται, ξυμφέρει τε καὶ σφύρως φέρουσιν. καὶ δὲ μὴ, τοῦαντίον. ὁπβλέπειν οὐκ δεῖ καὶ χάρω, & ὥρω, καὶ ἡλικίω, καὶ νέσους ἐν ῇσι δεῖ, ἢ ἔ.

In perturbationibus ventris & vomitibus spontaneis, si talia purgentur qualia purgari oportet, confert, & leuiter ferunt: sin minus, contrā. Sic & vasorum inanitio, si talis fiat qualis fieri debet, confert, & benè tolerant, sin minus, contrā. Inspecere itaque oportet, & regionem, & tempus, & ætatem, & morbos in quibus conueniat, aut non.

Preponit vacationem naturalem medica, ut exemplo sumpto à vacationibus quæ sunt à natura, sciat medicus quales ipse moliri debeat:

Medicus enim minister est nature bene operantis,
& Ars imitatur naturam. Deiectione ergo illa
que tantum fit impetu facilius naturalis, non
à causa externa, si qualia oportet purgari pur-
gentur, hoc est ea que sua qualitate corpus infe-
stant, confert, & leuiter ferunt: nam facilitas co-
lerantie indicium est quod talis euacuatio facta
est qualis erat facienda. Quod si aliorum fiat e-
uacuatio, & non eorum que corpora nostra mo-
lestant, contrarium evenit, neque enim confert,
& grauiter ferunt agrotantes. Eodem pariter mo-
do si medicus molietur aliquam facere euacua-
tionem, eorum esto que corpora nostra molestant,
quemadmodum & in alijs locis humorem no-
xium precipit euacuari, neque alterum illi in
euacuatione preferri. Si igitur pituita super-
abundet, hanc omnino oportet euacuari: flua
autem bile vel atra infestante, abstinendum est à
pituita, & bilis infestans euacuanda. Sic & si
humor sanguineus in corpore modum excesserit,
sanguinem euacuari oportet, sicut & serosam eius
partem, si hac fuerit superabundans. Omnium
itaque vacuationum intentio, est humor super-
abundans, cuius notitia perquirenda est ex regio-
ne, tempore, etate, natura & colore agrotantis, &
ex ipsis morbis: nam biliosa pustula, fastidium ci-
bi, sitis, amaritudo oris, erysipelas, tertiana febris,
suadent utendum medicamento cholagogo. Item
calor

SECTIO I.

5

calor ad nigritiem tendens, pustula nigra, elephus, canis, quariana febris, lien magnus, varices nigra, delirium mentis, melancholia, sciadent utendum medicamento melanogogo. Regio frigida, humida, Hyems, etas senilis, hæc significant abundare pituitam sicut regio calida, æstas, etas iuuenilis bilem. Ad has & similes intentiones resspicientes, oportet nos inuenire qualitatem euacuationis, hoc est, qualis humor vacuandus est.

III.

Εἰς τοὺς γυμναστικοῖσιν αἱ ἐπὶ ἀκροῦν διεξίαι σφαλεραί, καὶ ἐν τῷ ἐσχάτῳ ἔωσιν. οὐ γὰρ διώκοντα μῦθον ἐν τῷ αὐτῷ, εἰδὲ ἀτρεμέειν. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀτρεμέειν, εἰδὲ πὶ διώκοντα ἐπὶ τοῦ βέλτιον ἐπιδιδόναι, λείπεται ἐπὶ τοῦ χείρον. τρετῶν οὐκ εἴνεκεν τῷ διεξίλω λύειν ξυμφέρεται μὴ βραδέως, ἵνα πάλιν δεχθὼ ἀναθρήψῃ. ὁ λάβῃ τοῦ σῶμα, μηδὲ τοῦ ξυμπλώσιαι εἰς τοῦ ἐχάτον ἀγῆν. (σφαλερὸν γὰρ) ἀλλ' οὐκ οἶον αὐτῇ φύσει ἢ τοῦ μέλλοντος ὑπομῆναι, εἰς τοῦ ἀγῆν. αἰσάντως δὲ καὶ αἱ εἰς κενώσιαι αἱ εἰς τοῦ ἐχάτον ἀγῆν, σφαλεραί καὶ πάλιν αἱ ἀναθρήψαι αἱ ἐν τῷ ἐσχάτῳ εἶσαι, σφαλεραί.

Habitus Athletarum, qui ad summum bonitatis attingunt, periculosi, si in extremo constiterint; neque enim possunt in eodem permanere, neque quiescere. Cum vero non quiescant & non possunt proficere in

melius, reliquum est ut decidant in deterius. His de causis bonum habitum statim soluere expedit, ut corpus rursus nutrir incipiat. Neque compressiones ad extremum ducendæ (periculosum enim:) Sed qualis natura fuerit eius qui debet perferre, ad hoc ducere conuenit. Sic & euacuationes quæ ad extremum deducunt periculosæ. Et rursus refectiones, cum extremæ fuerint, periculosæ.

Quod neque euacuare neque replere supra modum oporteat, documento esse potest Athletarum bonus habitus, qui alioqui inculpabilis existens, ut qui & bonis abundet humoribus & vires habeat robustas, hoc solum malum maximum gerit, quod ad extremam venit repletionem: hunc itaque soluere nos oportet haudquaquam morantes, sed anticipantes solutione periculum. Causam vero ob quam soluere oporteat, talem ipse subiicit dicens: neque enim possunt in eodem permanere neque quiescere: nam cum semper natura coctionem, alimenti distributionem, sanguinis generationem, adiectionem, adglutinationem, atque assimilationem operetur, quando nihil adijci solidis corporis partibus potest, neque vena amplius habent conceptaculum in quod alimentum distributum recipiatur: tunc periculum imminet aut disruptionis vasorum, aut suffocationis

SECTIO I.

7

focationis caloris naturalis & mortis repentina. Ut igitur corpus rursus nutriri possit, bonum habitum oportet sine mora soluere. Eius autem solutio est euacuatio, & hanc quoque oportet facere non ultra modum, cum sit immodica euacuatio non minus periculosa quam immoderata repletio. In euacuationibus enim non solum quid abundantia requirit attendendum est, sed quantum vires ferre possunt eius qui debet euacuari. Alij siquidem melius, alij minus benè ferunt euacuationes. Porro nihil immodicum periculo vacat, siue sit in demendo, siue in addendo.

I V.

Αἱ λεπταὶ καὶ ἀκραιβέες διαίται, καὶ ἐν τοῖσι μικροῖσιν αἰεὶ πάθουσι, καὶ τοῖσιν ὀξέσιν, ἧ μὴ ἐπιδέχεται, σφαλεραί· καὶ πάλιν αἱ ἐς τὸ ἔχατον λεπτότητος ἀφιγμέναι διαίται, χαλεπαί· καὶ γὰρ αἱ πληρώσεις αἱ ἐς τὸ ἔχατον ἀφιγμέναι, χαλεπαί.

Victus tenuis atque exquisitus in morbis quidem longis semper, in acutis verò in quibus non conuenit, periculosus. Et rursus qui ad extremum deuenit tenuitatis, grauis est. Nam & repletiones quæ ad extremum deueniunt graues sunt.

Hic agit de victu egrotantium, ostendens nobis in morbis longis semper periculosum esse victum tenuem, quòd scilicet vires ipsas demolatur quas

præstat tum fouere, tum integras, ut morbi diu-
turnitati pares esse queant, seruare. In acutis ve-
rò non semper esse periculosum. Competi enim in
simpliciter acutis, quibus maximus vigor & in-
dicatio primis diebus futura est: Non competit in
acutis ex decidentia, qui possunt ad quadragesi-
mum usque protrahi diem. Est autem victus in
extremo tenuis, qui per solam mediam ad indi-
cationem usque sic procedit: tenuissimus, per mel-
lioratum: tenuis verò qui per pauca & parum
nutrientia edulia fit, qualis est p. sane uccus.
Omnis talis victus vires quidem comminuit sed
adhibendus cum iudicio, ea tenus ut non fiat exo-
lurio virtutis & natura.

V.

Εν τῇσι λεπλῇσι διαίτησιν ἀμαρτάνουσιν οἱ νο-
σέοντες, διὸ μᾶλλον βλάπτονται. πάντες γὰρ τὰ ἀμαρ-
τήματα, ὃ ἀνὴρ γίνετο μᾶλλον, ἢ ἐν τῇσιν
ὀλίγων ἀδρότερησι διαίτησι. Διὰ τοῦτο καὶ τοῖσιν
ὕμειναι σφαλερὰ αἰ πάντες λεπταὶ καὶ καθεστη-
κῆται καὶ ἀκρεβέες διαίται, ὅτι τὰ ἀμαρτανόλυστα
χαλεπώτερον φέρουσι. Διὰ τοῦτο οὖν αἰ λεπταὶ καὶ
ἀκρεβέες διαίται σφαλερὰ εἰς τὰ πλείεστα τῶν
σμικρῶν ἀδρότερων.

In tenui victu ægri delinquant, quo fit ut
magis lædantur. Quicunque enim error
com-

committitur magnus, maior in hoc fit quam in paulò pleniore victu. Propterea etiam anis periculosus existit valde exquisitus victus & constitutus, quoniam errores grauius ferunt. Ob hoc igitur tenuis victus atque admodum exquisitus magna ex parte periculosior est eo qui paulò plenior.

Quicumque error accidit agrotantibus qui tenui victu reguntur, hic maximum affert periculum: & quia natura à tali victu debilitatur, & quia transitus ad eum est insuetus. virium autem iam imbecillum reliquias facile deijcit quicumque supervenerit error. Hippocrates in lib. de ratione victus tenuiorem victum ratione viventibus meliorem predicat, & re vera laudabilior est p. eniore, praesertim in acutis: idem verò hic periculosiorem aut sed delinquentibus. Quemadmodum enim (si modò prophana sacris conferre licet) qui legem acceperunt, aut religione distringuntur, his grauius est delictum, si peccare contingat, quam aut religione solutis, aut legis expertibus: sed tamen lex m. a, aut religio periculosior non est censenda: Sic tenuior vivendi ratio, licet hac exquisitè viventibus grauius sit delictum cum errauerint, non tamen idcirco peior pleniore iudicatur.

Ες δὲ τοῖς ἔχαστα νοσήμασι, αἱ ἔχαστα θεραπεύειν ἐς ἀκρίβειαν, κρείττωται.

Extremis morbis extrema exquisitè remedia optima sunt.

Extremos morbos nominavit Hippocrates summos, ultra quos non sunt alij. Quare precipit in ipsis fieri exquisitissimam curationem, & victum adhiberi tenuissimum.

Ὅτε μὲν οὖν κατὰ τὸ νόσημα, αὐτὰς τὰς ἑκάστας πόνας ἔχει, καὶ τῇ ἐχάτως λεπιοπέτῃ διαίτῃ ἀναγκάζον χρέεσθαι. ὅπου δὲ μὴ, ἀλλ' ἐνδέχεται ἀδροτέρως διατᾶν, τοσοῦτον ὑποσημαδεύειν, ὅσον αὐτὸ νόσος μεγαλύτερη τῇ ἐχάτων ἢ.

Vbi morbus peracutus est, statim extremos habet labores, & extremè tenuissimo victu vtendum est: vbi verò non, sed pleniorē victum contingit adhibere, tantum cibi indulgendum est, quantò morbus extremis est mollior.

Peracutus est morbus qui statim circa primos dies in summo vigore consistit. Porro in morbi vigore, tenuissimo victu vtendum est: Nam si propter inflammationes vel febres, quæ à morbis acutis vix unquàm separantur, abstinendum est, hoc ipsum (morbo in suo vigore consistente)
magis

SECTIO I.

II

magis est faciendum, ne si liberalior victus indulgeatur, natura, quæ contra morbum pugnat, eo relicto, ad coctionem cibi se conuertat. In alijs morbis qui tardius in vigore sunt futuri, tantum à victus tenuitate declinandum est, quantum morbi ab extremis recedunt.

VIII.

Ὁ νόσος ὅ ἀκμῆς τὸ νόσος, ἔτε καὶ τῇ λεπτοτάτῃ διαίτῃ ἀναλγῆτον χρῆσθαι.

Quando morbus in suo vigore constiterit, tunc victu tenuissimo vtendum est.

Hæc sententia similis est præcedenti: nisi quod generalior extendi posse videatur ad omnes morbos, quorum in vigore, tenuissimo victu vtendum est.

IX.

Συνεκμαίρεται ὅ χρὴ καὶ τὸν νοσέοντα, εἰ ἐξαρκεῖσθαι τῇ διαίτῃ πρὸς τὴν ἀκμὴν τὸ νόσου, καὶ πότερον ἐκείνῳ ἀπαιδῆσθαι πρὸς τὴν καὶ ὅσον ἐξαρκεῖσθαι τῇ διαίτῃ, ἢ ἡ νόσος πρὸς τὴν ἀπαιδῆσθαι καὶ ἐμβλῆναι.

Coniectari oportet an æger sufficiat cum victu perdurare, donec morbus consistat, & nunquid prius ille deficiat nec possit cum victu perdurare, vel morbus antea deficiat atque hebescat.

Bona medicina pars est coniecturalis. Totam victus rationem igitur non solum morbi tempo-

F

re, de quo superius dictum est, abstinendum esse in vigore, sed etiam agrotantis virtute melioremur: quæ si imbecillior fuerit, adijciendum aliquid victui, & tanto plenior est adhibendus quanto plenior natura imbecillior exposculet. Quocirca etiam in ipso morbi vigore, vel aliquis casus interuenierit robur natura dissolvens, nutrire aliquando cogimur.

X.

Ὅσοις μὴ οὐδ' αὐτὴ καὶ ἡ ἀκμὴ, αὐτίκα λεπτοῦς διατᾶν. ὅσοις δὲ ἐς ὑπερὸν ἡ ἀκμὴ, ἐς ἐκείνο καὶ πρὸς ἐκείνους μὴ καὶ ἀφαιρετέον. ἐμωθεῖν δὲ πωτέρως διατᾶν, ὡς αὐτὸ ἐξαρκεῖσθαι ὁ νόσέων.

Quibus igitur statim morbus consistit, iis statim tenuis victus adhibendus est, quibus verò posterius debet consistere, iis & in ipso consistendi tempore, & parum ante illud, cibus subtrahendus: Prius verò vberius agendum ut æger sufficiat.

Sermo hic uniuersalis est, de omnibus morbis pronuntians, in quibus dum vigor adest, tenuis conuenit victus. Verum longè ante tempus vigoris erit alendus ager, ut imminentem morbi tempestatem ferat potentius cibo plenior firmitus.

E'v

Εν τῷσι παροξυσμοῖσιν ὑποτέλλεσθαι χρὴ, τὸ
παροξυνεῖν γὰρ βλάπτει. καὶ οὐδὲν κατὰ τὸ εὐ-
δὲς παροξυνέται, ἐν τῷσι παροξυσμοῖσιν ὑπο-
τέλλεσθαι χρὴ.

In accessionibus abstinere oportet: nam
cibum dare, nocivum est, & quibus per cir-
cuitum fiunt accessiones, in ipsa accessione
abstinere oportet.

Cibandi consilia petenda sunt à tempore, & à
viribus aegri: itaque cum praecipit in accessionibus
abstinendum esse, ne cibus oblatuſ distrahat na-
turam, quae circa morbi materiam tum est occu-
pata, intelligit si per vires id permittatur, & na-
turam aegrotantis.

Τὰς δὲ παροξυσμοὺς καὶ τὰς καταστασίας δη-
λώσουσιν αἱ νύκτες, καὶ αἱ ὥραι τοῦ ἔτους, καὶ αἱ τῶν
παιδιῶν πρὸς ἀλλήλας ἀντεπιδόσεις, ὡς τε καὶ
ἡμέραι, ὡς τε παρ' ἡμέραι, ὡς τε ἐκ τῶν πλείων
χρόνων γίνονται. αὐτὰρ καὶ τῷσιν ἐπιφαινομένοιςιν,
οἷον ἐν πλεονεκτοῖσι πύρελον, ὡς αὐτῆς ἐπι-
φαίνεται δριμύς, βραχυῖ. ὡς δ' ὑπερὺν ἐπι-
φαίνεται, μηκύνει. καὶ ἔρα, καὶ ὑποχωρήματα, &
ιδρώτες, καὶ οὐκρετα, & δίσκρετα, καὶ βραχέα, καὶ
μακρά τὰ νοσήματα, ἐπιφαινόμενα δηλοῖ.

Accessiones autem & constitutiones morbi indicabunt, & anni tempora, & circuituum successiva incrementa, siue quotidie, siue alternis diebus, siue per maiora fiant intervalla. Sed ex iis quæ mox apparent, indicia sumuntur, quemadmodum in morbo laterali si circa initia statim sputum appareat, breuiat morbum: Si verò postea appareat, producit. Et vrinæ & alui excrementa & sudores, quæcunque apparuerint, vel bonam morborum indicationem, vel malam, vel breues, aut longos fore morbos ostendunt.

Cum victus instituendi ratio sumatur vel à viribus agri, vel à morbo ipso seu morbi constitutione, vel à particularibus accessionibus, vires imprimis cognoscenda sunt: cognoscuntur autem ex pulsibus & ex iis notis quas describit Hippocrates in Prasagijs. Accessiones & constitutiones, morbus ipse indicabit. Nam si tertiana fuerit, per tertium accessio fiet: si verò quotidiana, singulis diebus: at si quartana, per quartum. Animaduertere si morbus est acutus vel peracutus vel longus, & quando maximè in vigore consistet, nihil aliud est quàm morbi constitutionem considerare. Item anni tempora indicabunt easdem constitutiones & accessiones: Nam Æstas addit celeritatem: Hyems tarditatem, ita ut æsti-

na quartana magna ex parte breues sint : Autumnales & quæ magis hyemem attingunt, longæ. Circuituum etiam incrementa, hoc est accessionum quæ fiunt in circuitibus incrementa, siue quotidie, siue alternis diebus, siue longiore tempore fiant, constitutiones indicabunt. Hæc sicut ætas, natura, consuetudo, industria, regio, & aëris ambientis qui tunc vagatur, temperatura, constitutionem morbi declarant, an ipse sit peracutus, an longus & chronicus : & declarant ipsas accessiones, an per tertium, vel per quartum, vel singulis diebus, siue qua hora diei aut noctis sint inuassura. Hæc autem eò pertinent, ut secundum vires, morbi constitutionem & accessiones particulares, recta victus ratio præscribatur. Morbi etiam constitutio brevisne futurus sit an longus, coniectabitur ex ijs quæ post apparent ac superueniunt : cuiusmodi sunt in morbo costali, sputum, urina, alui excrementa, sudores. Quod planum fit exemplo laborantis ex pleuritide Anaxionis, de quo satis multa verba Galenus in commentario facit. Quantò enim citius apparent quæ excernuntur costæ in pleuritide, tantò breuior sperari debet morbus : Quantò verò tardius, tantò longior.

XIII.

Γέροντες δὲ φοβάται νηεῖν φέρονσι, δὲ τερον οἱ νεφεληγέτες, ἥματα, μεράκια, πάλιν

των δὲ μάλιστα παιδία. τετέων ὃ αὐτέων ἅπασαν αὐ-
τὴν αὐτὰ ἐων δὲ αὐτὴν μάλιστα εἶναι.

Senes facillimè ieiunium ferunt, secundo loco qui ætatem consistentem habent, minus adolescentes : omnium minimè pueri, præsertim qui inter ipsos sunt viuidiores.

Ætatum differentia confert etiam ad constituendam victus rationem, nam indicatione sumpta ab hominis etate senibus instituendus est victus tenuis etiam in morbis, quia facillè ieiunium ferunt, ij præsertim qui sunt in principio senilis ætatis : Nam extremè senes tale quid patiuntur quale lucernis penè extinctis accidit, quæ continuam exigunt olei suffectionem, multam autem & subitam simul nequeunt sustinere. Pueris verò largior victus indulgetur, quia plurimum cibum conficiunt propter abundantem in eis calorem naturalem. Media ætates inter senes & pueros, quantiò propinquiore his aut illis existant, tantiò minus aut magis offendentur ex longis inedijs.

XIV.

Τὰ αὐξανόμενα, πλείστον ἔχει τὸ ἔμφυτον θερ-
μὸν. πλείστης οὖν δὲ ἔται προφῆς· εἰ δὲ μὴ, τὸ
σῶμα ἀναλίσκεται. Γέροντες δὲ ὀλίγον τὸ θερμὸν·
ἀλλ' ὅσον ἄρα ὀλίγον ὑπερκαυμῆται δέονται.
ὑπὸ πολλῶν γὰρ ἀποσβέννυται. ἀλλ' ὅσον τὸ εἶναι πυ-
ρετοῖ

περὶ τοῦ ζῆσι γέγονεν ἔχ' ὁμοίως ὁξείας· ψυχρὸν δὲ
τὸ σῶμα.

Qui crescunt, plurimum habent calidi innati: plurimo igitur egent alimento, alioquin corpus absumitur. Senibus verò parum calidi innati inest: propterea paucis alimentis egent, quia à multis extinguuntur. Hanc etiam ob causam febres senibus non similiter acutæ fiunt, frigidum enim est eorum corpus.

Cùm tota moles animalium in perpetuo fluore sit, ni similis altera substantia pro ea qua defluxit restituta sit, euaporabitur cerèdè atque dissipabitur uniuersa. Quo factum arbitror, ut natura non animalibus modo, verumetiam stirpibus, insitas quasdam vires deficientis ac desiderati semper appetentes statim ab initio dederit, tantò profectò magis aut minus intensas quanto maior minòr ue fieret iste fluor in vnoquoque animali. Proinde cùm ex humida & aëria substantia puerorum, eorumq; qui crescunt, plurimum continenter dissipatur, ob innati caloris in eis abundantiam substantiam, qui potenter cibos conficit, sit ut pluribus egeant alimentis. Senes autem, quia paucus sit fluor substantia illorum, quæ iam sicca est & terrestris, nec faciliè resolubilis, & quia paucus ille calor senilis opprimitur multis,

Ἐξσβένθεται, ἰδέο φρουγὰλῖτερ Ἐξ παρὶὲ ρεῖϑὶ δε-
 bent. Eadem ex causa subinfertur, febres acuta
 non tam facile contingunt senibus quàm iunio-
 ribus : multum enim calidum promptè in im-
 mensum attollitur, paucum verò non facile. Ac-
 cenditur autem febris ob innati caloris conuer-
 sionem ad igneam naturam: verùm tantam seni-
 bus euenire conuersionem, ut aqua sit ei qua iu-
 nioribus accidit, vix fieri potest : nam corpora se-
 num frigida, puerorum calida sunt.

XV.

Αἱ χειλὶα χρεῶν ὅτι καὶ ἡρεῖς θερμότητι φύ-
 σι, καὶ ὑποὶ μακρότατοι. ἐν ζώῃτησιν οὐκ τῇ-
 σιν ὠρησι καὶ ὅτι πῶς δόματα πλεῖον δότεον· καὶ γὰρ
 ὅτι ἐμφυτον θερμὸν πλεῖον ἔχουσι. Τροφῆς οὐκ
 πλεῖον ὅτι δέοντι· σημεῖον αἱ ἡλικίαι, καὶ οἱ ἀθλη-
 ται.

Ventres Hyeme & vere natura calidissi-
 mi sunt, & somni longissimi : quare per ea
 tempora alimenta copiosiora sunt exhiben-
 da. etenim tunc calor innatus plurimus est,
 vnde & pluribus egent alimentis : indicio
 sunt ætates & athletæ.

Non parum etiam conducunt ad victus ratio-
 nem inueniendam anni tempora : nam hyberno
 tempore cùm plus appetant homines, Ἐξ cibum
 facilius concoquant quàm æstiuo, plus etiam ex-
 hibendum est. ventres enim, hoc est, capacitates
 omnes

omnes & interna partes, ventriculus, vena, arteria, cordis sinus, Hyeme & Vere calidissimi sunt calore naturali: Nam ob circumstantem extrinsecus frigiditatem se recipit intro calor, sicut Æstate ad sibi affinem protenditur, atq; ita contingit dissolui quidem ac dissipari eius substantiam tempore æstiuo: contineri ac cohiberi & in profundum secedere hyemali. Ob hoc igitur, & quia ibi inclusus, & quia tum plurimus est, idcirco cibi appetentiam intendit, coctiones auget, & plus sanguinis cumulat, & crassius efficit corpus, & ut superfluitates excernantur providentiam habet: hic enim est omnium operationum naturalium autor & causa. Accidit & his temporibus somnos fieri longissimos ob noctium longitudinem, quod & ipsum multum confert ad coctiones, nutritiones, & cetera natura opera. Quod verò plurimum alimentum sit necessarium ubi calidum abundat, argumento sunt pueri, qui quia calidum plurimum habent, idcirco & pluribus egent, & plura concoquunt. Athleta verò quia exercitijs augent calorem nativum, ob id etiam multis frui possunt alimentis.

XVI.

Αἱ ὑπερὰ διαίται πᾶσι τοῖσι πυρεταίνουσι συμφοροῦσι, μάλιστα ὅ ποιόνοισι, καὶ τοῖσιν ἄλλοις τοῖσιν ὅπως εἰδισμένοις διαταῖς.

Victus humidus febricitantibus omnibus confert, maxime verò pueris & iis qui tali victu vti consueuerunt.

Hactenus de quantitate, nunc de qualitate victus agit, tam agrorum quàm sanorum: nam febris quoniam calida & sicca est passio (est enim conuersio natua calida aëris ad igneam) victum humidum consulit, indicatione sumpta ab eo quod dicitur, contraria contrariorum esse remedia. Humidioribus verò naturis, siue propter aetatem, siue propter consuetudinem, non contrariam, sed magis affinem seruandam statuit: naturam enim eorum fouere debemus per humida, non eodem quo morbos modo demoliri, semper in memoria habentes, quòd victuum sanorum indicationes, in ijs quidem quæ præter naturam sunt, contrarias, in ijs autem quæ sunt secundum naturam, similes facere oporteat. Sed in agris si complicentur affectus, ita ut simul sit hydropisis & febris, quia (indicatione sumpta à morbis ipsis) calida & sicca uni, frigida & humida alteri debentur remedia, ad id festinandum est quod magis urget, altero non omnino posthabito aut neglecto. Sed, cum essentia febris sit in calore præter naturam, magis quàm in siccitate, cur unius contrarij tantum, id est, humidum meminit, prætermittens omnino alterum, id est, frigidum? Dic ipsum id fecisse studio breuitatis, aut vni tantum

tum humidi meminisse, ut suum Aphorismum pluribus communem faceret: Sermo enim institutus est tam de febrientibus, quam de sanis. Item alia causa est, quod in temperaturarum omnium pessima est siccitas, & curatu difficillima; & ne talis intemperies, quae ferè inemendabilis est, inualescat, eam oppugnat suo contrario. Præterea humidorum usus est iutissimus, ergo iutissime huiusmodi pestem na corrigit: mors enim nihil est aliud, quam calidi & humidi defectus. Item calor in subiecto sicco euadit acrior, (febricitantis autem corpus calidum & siccum est) hanc acrimoniam caloris, humiditate obtundit. Post, emò solius humidi non frigidi meminit, quod frigidorum usus periculosissimus est, ut docetur in libro methodi medendi.

XVII.

Καὶ οἷον ἄπαξ, ἢ δις, καὶ πλείω, ἢ ἐλάσσω, καὶ μέγας. δοτέον δὲ καὶ τῇ ᾠρῇ, καὶ τῇ χύρῃ, & τῇ ἡλικίᾳ, καὶ τῷ ἔθει.

Et quibus semel aut bis, & quibus plurane, an pauciora particulatim oporteat offerre, considerandum. Condonandum autem aliquid ætati, regioni, tempori, & consuetudini.

De quantitate & qualitate dictum superius, nunc de modo offerendi dicitur. Non enim satis est cognoscere quod huic tenuis vel plenus, illi

conueniat humectans vel siccans victus, sed nun-
quid semel aut saepius plura aut pauciora singu-
lis partibus offerri debeant, intelligendum. Nimi-
rum ex viribus agra & dispositione eius qui est
robustus vel imbecillus, plethoricus vel exuccus,
intelligetur quàm multum & quàm parum,
quàm frequens & quàm rarum alimentum in-
stitui debeat. Robustus & exuccus, eget multo,
quia valet concoquere multum: & frequente, ut
quod habet diminutum resarciatur. Imbecillus
& plethoricus, eget paucis & raro. Si cum imbecil-
litate sit humorum defectus vel corruptio, parum
& saepius offeremus: parum quidem, quia vires
imbecilla multum non sustinent: saepius autem,
quoniam defectus exigit adiectionem, corruptio
verò contemperamentum. Sic quidem oportet &
à morbo & à viribus agrotantis ad ea quae pro-
posuimus sumere indicationes. Qua in re ma-
gnum etiam momentum habet tempus, aetas, &
consuetudo.

XVIII.

Θέρει & καὶ φθινόπωρον σίτια δυσφορώτατα
φέρονται, ἡμῶν & ῥήϊστα, ἤρεος δ' ἄτερον.

Æstate & Autumno cibos difficillimè fe-
runt, Hyeme facillimè, secundum locum
Ver habet.

Superius in eo Aphorismo, Ventres Hyeme,
&c. quantum offerri debeat, nunc quomodo offe-
rendum

rendum sit, indicatione sumpta à tempore ostendit. Quapropter Hyeme quidem raro & plurimum cibi concedit, quoniam tunc inest plus innati caloris: Æstate verò frequentius & parum singulo quoque pastu, propter diminutionem eiusdem caloris, cuius officium est coquendi ac conficiendi cibos. Reliqua verò duo tempora, Autumnus quidem Æstatem subsequitur, Ver Hyemem.

XIX.

Τοῖσιν ἐν τῇσι διεσπασμένοισι παρξυνομένοισι μὴ δὲν δίδναι, μὴ δὲ ἀναγκάζειν, ἀλλ' ἀφαίρειν τῇσδε ἀφαιρέσειαν ἀπὸ τῇσδε κρείστων.

Iis qui per circuitus accessiones habent, nihil dare oportet, neque cogere, sed subtrahere adiectioni ante indicationes.

Ex ipsis etiam accessionibus quæ per circuitus, hoc est per certum ordinem & seriem temporis redeunt, discendum est quomodo cibus offerri debeat egrotantibus. Nihil enim cibi vel potus exhibendum in accessione, nec nisi longè ante accessionem, ne cum natura tota est in concoquendo morbo, ad conficiendos cibos renocetur.

XX.

Τὰ κενόμυα καὶ τὰ κεκευμένα δὲ πῶς, μὴ κινέειν, μὴ δὲ νεωτεροποιεῖν, μήτε φαρμακείησιν, μήτε ἄλλοις ἐλκυσμασί, ἀλλ' εἶναι.

Quæ iudicantur & iudicata sunt integrè neque mouere neq; nouare aliquid, siue medicamentis, siue aliter irritando, sed sinere.

Cum sit crisis solius natura opus, non medici. Est enim crisis subitus natura, id est facultatis naturalis, & præsertim expultricis, motus in morbis, ad salutem omnino, vel ad melius, ad mortem vel ad peius, per insignem aliquam euacuationem. Nihil omnino agendum est medico cum ipsa perficitur crisis, aut iam perfecta est; sed omnia natura permittenda, ne eius actionem turbemus, quæ in hoc tota est, ut materias nocentes expellat. Si verò quicquam deficiat, medici est ut id quod deficit suggerat, euacuans ea quæ ab imperfecta iudicatione sunt relictæ, ne recidivam faciant. Perfecta iudicationis, & cui nullus numerus iudicatorius deest, hæc signa sint: Primum, melior est quæ per euacuationem inferiorem fit, quàm quæ per abscessum: Deinde, per quam humor noxius, quàm per quam alius quispiam euacuatur: Tertio loco, quæ recto sit tramite: Post hæc, quæ facile toleratur: Dein, quæ cum coctione: Et in die decretorio. Horum aliqua si desint, neque integra fuerit iudicatio neque exquisita.

X X I.

Α δὲ ἀρχὴ, ὅτε αὐτὸ μέγιστα πέπνηται τῇ ἀρχῇ,
ἀπὸ τῆς συμφορῶντων χυρίων.

Quæ

Quæ ducere oportet quò maximè natura vergit, per loca conferentia eò ducere.

In euacuatione eorum quæ sunt ab imperfecta indicatione relictæ, oportet medicum naturæ motum animadvertere, & si quidem idoneus fuerit, ei convenit adminiculari, viam struendo, si verò contrarius & noxius, hunc prohibere atque divertere oportet, ne in partem principatum obinentem humores noxios, aut omnino quò non expedit, detrudat. Sunt autem euacuationibus conferentia loca; intestina, deiectionibus; vesica urinæ; ventriculus, vomitionibus; (nam si facultas naturalis ad vomitum insurgat, non est eius motus interruptendus, postquam locus & meatus conferens est & manifestus) cutis, sudoribus; palatum & nares, fluxui sanguinis & pituitæ, &c.

XXII.

Πένονα φαρμακόν εἰν καὶ κινεῖν, καὶ ὡς μὲν, καὶ δὲ εἰ δέχῃ πιν, καὶ μὴ ἐργάζεσθαι. καὶ ὡς εἴς τε σὺν ὅρῳ αἵ.

Concocta medicari atque mouere, non cruda, neque in principis, modò non turgent: plurima verò non turgent.

Humores qui agitantur & de loco ad locum moventur ac transfluant, medicamento vacuare primo quoque tempore licet: crudos autem & qui in aliqua parte fixati sunt, hos neque medica-

mentis irritare, neque alio auxilio mouere oportet, nisi post coctionem: tunc enim natura peliente & pharmaco attrahente facilius sequitur educio. Videtur siquidem ipsa natura post coctiones, humores discernere ac utilibus in usum asseruatis superfluos expellere. Quod sola si potest exequi, nec eget auxilio manum porrigentis, medicamento opus non est. Si verò imbecillius agat, id quod deficit oportet supplere, ut tandem humoris noxii fiat euacuatio. Ratio itaque prohibita purgationis ante coctionem est, quia crudus humor ob crassitiem & frigiditatem est tardi motus, nec pharmaco obedit, unde ex commotione symptomata praua sequuntur, tanto certè deteriora quanto pharmacum est in attrahendo generosius, & humor ob maiorem crassitiem in reluctando validior, aut magis fixus, & in vijs angustioribus. Per alium quidem ducere crudos humores vetat ratio aphorismi, sed aphorismo minimè prohibentur initio pharmaca lenia, quæ alium lubricant & à ventre communes materias ducunt. Nam hoc non est crudum humorem, sed excrementa trahere. Aphorismus autem, omnem crudi attractionem prohibet, non omnem alui deiectionem. Ut igitur medicandi prohibitio, à cruditate; sic initio purgandi atque à remotis attrahendi, permissio, ab illa turgidi ratione pendet. Nomine turgentium intelliguntur tennes, biliosi, aliquam motionem

motionem excitantes, aut aliquò erumpentes, ventrem molestantes, aut saltem non fixi, quales in morbis rarò contingunt. frequentius enim quietem habent humores, & in una aliqua parte consistunt, in qua concoquuntur toto morbi tempore usque ad eius solutionem.

XXIII.

Τὰ χωρέοντες μὴ τὴν πλὴν τεκμήρεα, ἀλλ' ὡς αὐτὸ χωρὲν οἷα δ' εἶ κ' φέρει δ' ὀφθαλμοῖς. καὶ ὅταν δ' εἶ, μέλει λεπτοθυμίας ἀγῶν, καὶ τοῦτο ποιεῖν ὡς ἐξαρκείη ὁ νοσέων.

Deiectiones, non multitudine sunt æstimandæ, sed si talia dejiciantur qualia conveniunt, & ægri facillè tolerant. Atque ubi usque ad animi defectionem expedit ducere, faciendum, si æger possit tolerare.

Non ex copia vacuatio, sed ex his duobus probanda est, si qualia oportet, nimirum quæ vitiosè se habent euacuentur, & si ægri facillè tolerant. Vacuationis autem modum statuet etiam virtus agrotantis, ad cuius usque defectionem procedendum est interdum, ubi in maximis inflammationibus, in adurentibus febribus, & vehementissimis doloribus id suadet usus, & ubi sic valent vires, ut ex animi deliquio rursus emergere facillè queant. Nam huiusmodi euacuationibus multos ita adiutos esse cognovimus, ut vel san-

tati prorsus restituti sint, vel obtusa morbi vehementia plurimum alleviati:

XXIV.

Εν ῥῖσιν ὅξείσι πάθεισιν ὀλιγάκις, καὶ ἐν δὲ χῆσι τῆσι φαρμακείῃσι χεῖρα δὲ, καὶ τοῦτο πρὸς ἐξουκλήσαντας ποιεῖν.

In acutis morbis, raro: & in principiis, medicinis purgantibus uti, & hoc cum præmeditatione faciendum.

Non sine ratione dixit raro circa principia morborum acutorum nobis in usum venire purgationes, quoniam non saepe turgent humores in principijs, qui præcipuam offerunt purgationis initio faciendæ occasionem. In longis quidem morbis expectanda concoctio est, sed in acutis in quibus turgent, aut saltem fixi non sunt humores, inter initia purgandum, ne morbus inualescat, dissolvantur vires, ac in partem aliquam principem decumbant humores vagi. Qua in re cum sint multa perpendenda, tam ex modo humoris quàm dispositione corporis, merito dixit Hippocrates, multa præmeditatione ei opus esse qui in principijs purgare tentat. Non quòd in aluo exoneranda requiratur multa præcautio, sed in parte humoris noxij velut turgentis educenda: tunc enim perpendere oportet qualis sit humor, & quatenusurgentium vel fixorum participationem habeat:

In

In corporis dispositione perpendendum, per quos
meatus sint humores educendi, an satis illi sint
referati necne, an idoneè se habeat ager ad huius-
modi purgationem. Nam qui cruditate laborant
multa, qui tenaces ac crassos cibos assumpserunt,
quibus est aliqua viscerum inflammatio y haud-
quaquam apti sunt ad purgationes. Quibus ex
causis, & quia medicamenta calida febrem au-
gere nata sunt, suadet initio purgandum esse cum
multa religione & cautela.

XXV.

Ἡν οἷα δεῖ καὶ ταῖρα, καὶ ταῖρα, συμ-
φέρει τε καὶ ὁ φόρος φέρουσιν. Τα δὲ ἐναντία,
δυσχερῶς.

Si qualia oportet purgari purgentur, con-
fert, & facile ferunt: si contra, difficulter.

Est hic Aphorismus magni usus, qui toties ab
Hippocrate inculcatur, & tot locis, in 2.22. & 23.
libri primi. In 2. & 3. libri quarti: In quo, cum
alias purgationes, tum eas præcipuè vult intelligi
que per inferna fiunt deiectione. Nam morbi pro-
pæmodum omnes initium habent à vent. e infe-
riore, & per ventrem insignes purgationes fiunt
totius corporis, & venter ipse totum hominem
regit, ipsiusq; moderatur habenas, ac vitæ guber-
nacula tenet: acceptos enim cibos conficit & per

omnia membra diuidit : ac utili distributo, quod ex his superfluum est educit. Certe huic nihil potest offensionis accedere sine grauissimo totius corporis incommodo. Quod olim planum fecit Agrippa, confecto de membris conspirantibus in ventrem apologo.



APHORISMORVM

HIPPOCRATIS

Sectio II.

APH. I.

ΕΝ ὁ νοσήματι ὕπνῳ πόνον ποιεῖ, θανάσιμον,
ἐν δὲ ἀφελείᾳ, ὁ θανάσιμον.

In quo morbo somnus laborem facit, mortale : si verò iuuat, non mortale.

Somnus eo tempore quo non conuenit (ut in principijs accessionum, in quibus horror vel rigor, vel exteriorum partium refrigeratio contingit) si noceat, nihil nouum, aut graue aliquid portendit, ut qui non conuenit esse tunc utilis. verum quo in tempore morbi plurimam conferre solet

selet somnus, ut in declinatione, in eo (si prater id quod nihil prodest, etiam nocet) mortem non absque ratione significat. Nam per somnum calor ad intima receptus, & quantum fieri potuit auctus, cum tamen causas morbum efficientes euincere pra imbecillitate sui aut humorum prauitate nequiverit, ostendit quod natura (quae post somnum leuata non est, sed ex eo peius habet) quam ante fortiori malo succumbit. Ex somno autem lusiones sunt, quod febres aut non dissoluantur, aut etiam exacerbantur, & quod dolores intenduntur, & fluxiones multiplicantur, & crescunt inflammationes. Quidam autem inter dormiendum delira loquuntur, & ubi expergefati fuerint, multo tempore in delirio perseuerant. Quosdam somnus grauissimus dormientes occupat, & vix cum punguntur excitantur. Hac vero contingunt propter humorum prauitatem, qui, dum per somnum minimè concoquuntur à calore naturali, perniciem magnam indicant. Si verò euicti fuerint à natura, & somnus iuuerit, hinc sanitatis indicium habebunt, dummodo signa alia salubria eodem conspirent.

II.

Ὅταν ὁ ὕπνος ἐξ ὀνείρου ὅπου ἔστι παῖς, ἀγὰρ ὁν.

Vbi somnus delirium sedat, bonum.

G 3

Quoddam velut exemplum particulare subiungit antecedenti sermone, periculosioris morbi nomine a iis etiam intelligi volens: quos si somnus sedauerit, naturam victricem esse significabit.

III.

Υπὸν, ἀγρυπνίαν, ἀμφοτέρω τοῦ μέρους
μᾶλλον ἡνέκευ, καὶ ἡνέκευ.

Somnus, atque vigilia, vtrunq; si modum excesserit, malum.

Non solum de somno & vigilia hoc verum est, sed & de adiuuendis, sumendis, faciendis, educendis omnibus, inquit us quicquid mediocritatem excesserit nocivum esse solet. Quemadmodum somnus longus dicitur, qui modum naturae convenientem excedit: ita gravis, qui praeterquam quod immoderatus est, habet etiam difficilem expergesactionem, qualis in Comate soporifero videri potest: fit autem huiusmodi somnus refrigerato cerebro: qua refrigeratio cum fuerit fortis, mixta quidem humiditati, lethargicas passiones inducit: cum siccitate verò, eas quae Cathocae seu catalepses aut deprehensiones vocantur. Caterum immodica vigilia, qua vel ex sola intemperie calida cerebri, vel ex humoris biliosi abundantia cum siccitate fiunt, hoc habent mali, quod spiritus vitales unà cum calore naturali diffi-

dissipant, cruditates pariunt, cibi & potus coctionem impediunt.

I V.

Οὐ πλεονεξία, ἢ λιμὸς, ἢ οἱ ἄλλοι ἑδὲν ἀγαθόν, ὅτι αὐτὸ μᾶλλον τῆς φύσεως ἢ.

Non satietas, non fames, neque aliud quicquam quod modum naturæ excefferit, bonum.

Cum sanitas moderatio quadam sit, & temperies, necesse est omnes excessus, qui plurimum à modo recesserunt, iam agriitudines esse. Idem vult intelligi in sumendis, admouendis, faciendis, educendis omnibus quæ si modum excedant (excessu notabili) mala putanda sunt. Labor (inquit) cibibus potus, somnus, verus, omnia mediocria sunt. Epidemiorum 6.

V.

Κόποι αὐτὸι γὰρ τοὶ φράζονται νῆστες.

Lassitudines sponte natæ morbos prænuntiant.

Non hîc lassitudinum meminit quæ ex motionibus & laboribus fiunt, sed earum quæ sponte, hoc est, sine ullo motu corporis & animi natæ contingunt. hæc morbos prænuntiant, nimirum febres, si in toto sentiantur corpore, vel morbos partium in quibus consistant illæ lassitudines: Quippe ex ipsis, morbi causa adesse significatur. Sunt autem varisquæ lassitudinis tres species:

Prima, qua ulcerum: Secunda, qua tentionis: Tertia, qua inflammationis sensum habet. Prima quidem, ex vitiosis humoribus ortum habet: Secunda, ex plenitudine: Tertia, ex utrisque simul coniunctis: De quibus amplissime alijs in libris disputatum est, ut hinc non sit opus repetitione.

V I.

Οἱ πόνοι πονέοντες ἢ τὸ σώματος, ἢ πολλὰ καὶ πολλῶν ὅσα αἰσθάνονται, τετέλειον ἢ γνώμην νοσέει.

Quicumque dolentes parte aliqua omnino dolorem non sentiunt, iis mens ægrotat.

Dolentes hinc intelliguntur habentes aliquam affectionem dolorificam: nam verè dolor non est absque sensu, quum sit planè nihil aliud dolor, quàm rei contristantis, & in contrarium naturæ habitum mutantis repentina perceptio: Quod dormientes, si pungas, vel colaphis cadas, non doleant, idèò fit, quia eorum apprehensio id non animadvertit. Proinde in dolore sunt alteratio subita, vel solutio continui, impressio in parte qua nata est sentire, & apprehensio illius impressionis: Vnde fit ut dolentes & non sentientes repugnantia sint, nisi intelligas dolentes, hoc est, habentes affectus dolorificos, seu qui dolores excitare consueverunt: huiusmodi affectus si adsint, & ab

Et ab agroto non sentiantur, ei mentem laesam esse significant.

VII.

Τὰ ἐν πολλῷ χρόνῳ λεπιδόμυα σώματα, τὰ ἥδη ἐπικρατέφειν δέει· τὰ δὲ ἐν ὀλίγῳ, ὀλίγως.

Quæ longo tempore extenuata sunt corpora, lente reficere oportet, quæ verò breui, breuiter.

Cùm solida substantia nisi longo tempore extenuari non possit, longo etiam tempore eget ut reficiatur: humida non tanto tempore eget: Spirituosa omnium minimo.

VIII.

Εἰ ἐν νέῳ τροφῇ λαμβάνων τις, μὴ ἰσχύει σημαίνει ὅτι πλείονι τροφῇ τὸ σῶμα χρεΐται. ἢ ὅτι τροφῇ μὴ λαμβάνοντος ἔδω γίνηται, χρεὶ εἶδεναι, ὅτι κενώσει· δέεται.

Si à morbo cibum assumens quis non corroboratur, pluri alimento corpus uti significatur: quòd si non assumenti cibum hoc accidat, scire oportet quòd indiget euacuatione:

Qui post morbi solutionem abundans alimentum sumentes cum appetitu, non possunt vires salubres recuperare, copiosiore utuntur quàm pro ratione, Et quàm vires possint conficere, unde ex eo grauantur, Et non nutriuntur. Qui vero

nec appetunt, nec quod satis est assumere possunt, vitiosos humores habent, quos nisi euacuauerint, aut missione sanguinis (si corpus est plethoricum) aut deiectione purgant (si cacochymum) feri non potest ut sanitati restituantur. Hippocrates enim quando proportionem inuicem seruata humores omnes augentur, aut alio modo peccant, missione sanguinis auxiliatur: Vbi verò unus aliquis superabundat, aut vitiosè se habet, purgatorium dat medicamen.

I X.

Τὰ σώματα γὰρ, ὅπου αὐτὸς βέλῃται καὶ ταί-
ρην, ὅργα ποιεῖν.

Corpora cum quispiam purgare voluerit, oportet fluida facere.

Sive per vomitum sive per alui subductionem purgare velis, fluidum corpus efficiens optimè purgabis: Erit autem fluidum omnib. meatibus, per quos educenda est materia, sic reſeratis, ut nulla obstructione impedit, si facile eam transmittant: humoribus autem, si fuerint in corpore crassi ac glutinosi, sic incis, abstersis, atq; extenuatis, ut quàm maximè fieri potest ad fluendum sint parati. Verùm in acutis morbis, in quibus ferè iurgent humores, ista preparandi non datur occasio, nec semper etiam est necesse preparare.

Τὰ μὴ

X.

Τὰ μὴ καθαρά τῶν σωματικῶν, ὀκρόσιν αὐτὴν ἰσχυρῶς,
μεγάλον βλάβης.

Non pura corpora quantò plus nutries
tantò magis lædes.

*Impura corpora, in quibus sunt aliqua reli-
quia humoris corrupti per morbum, offenduntur
alimento cacochymia familiari, ut si pituitosum
pituitosis, biliosum biliosis. &c. detur. Corrum-
pitur enim alimentum adueniens corpori malos
humores habenti. Nutries, dixit, pro eo quod est
largiore cibo implebis: nam nutritio propriè di-
cta, vacuati est repletio & perfecta assimilatio,
quæ tum non fit cum læduntur corpora nutri-
mento. Sunt ergo paulatim purganda, ac in pur-
gati locum substituendus bonus cibus, sed par-
cus.*

XI.

Πρόιον πληροῦσθαι ποτοῦ, ἢ σίτης.

Facilius est impleri potu, quàm cibo.

*Eadem sententia est in libello de alimento:
Quicumque indigent citissima adiectione, humi-
dum remedium ad recuperandas vires optimum
est: ubi verò adhuc celeriore egent, per odores resi-
ciuntur. Nam humida, si non ita nutriunt ut so-
lidiora, superant tamen nutriendi celeritate, qua-
niam humidum ut facilius alteratur, ita prom-
ptius quoque distribuitur.*

Τὰ ἐγκατελειμμένα νόμματα ἐν τῇσι νέστοις μὲν
κρίσιν, ὑποστροφὰς ποιεῖν εἰώθεν.

Quæ relinquuntur in morbis à iudicatione,
recidivas facere consueverunt.

Humorum prauorum reliquæ, post crisin imperfectam, in putredinem conuertuntur, ac febres accendunt, aut alios morbos excitant, nisi in tempore vacuentur à medico. Qui relinquitur inter alios sophista, hereticus, malus homo, alijs morbum afflat, & scabiem affricat, sanis contagiosus: ita morborum reliquæ, putredine inualefcente, recidivas facere consueverunt.

Οἱ πόσοι κρίσις γίνεται, τέττοισιν ἢ νύξ δυσφορίας ἢ πρὸς τὴν παρὰ ξυσμῶδ. ἢ δὲ ἐπιόδου δυσφορώτερη οἷς ἐπιτοπολύ.

Quibus iudicatio instat, iis nox, quæ accessionem præcedit, difficilis est: quæ verò subsequitur magna ex parte facilius existit.

Crisis est subita in morbis ad melius, vel ad deterius mutatio: fit autem natura separante à bonis mala, & ad excernendum preparante. Quo fit ut in tali turbatione grauius se habeant egri: grauius autem hac nocte præcedente accessionem,

sionem, clarius percipitur, quod ea somnum interrumpi contingat, nocte vero sequente crisin perfectam, lenius habent, natura scilicet à superuacuis & molestis humoribus exonerata.

XIV.

Εν τῇσι τῆς κριλῆς ῥύσεσιν, αἱ μεταβολαὶ τῆς
Διὰ χωρημῶν ὠφελέουσιν, ὡς μὴ ἐς τὴν πονηρὰν με-
ταβάλλῃ.

In profluuiis alui mutationes excrementorum iuuant, nisi ad mala mutatio fiat.

Deiectiones versicolores per crisin excerni melius est, quàm eas in corpore retineri. Quod si mutatio fiat ad signa coctionis, vel ad colorem eum qui sit naturali vicinus, bonum: Sin minus, contrà. Idem iudicium de urinis, in quibus si fiat talis mutatio, ut ubi tantùm apparebat nebula, nunc appareat enaorema, ac tandem hypostasis alba, lauis, equalis, optima est mutatio: Sin minus, contrà.

XV.

Ὅπου φάρυγξ νοσέει, ἢ φύματι ἐν τῷ σώματι ἐμφύεται, τὰς ἐκκρίσεις σκέπτειται. ὡς γὰρ χολώ-
δεις ἔωσι, τὸ σῶμα ξυμνοτέει, ὡς δὲ ὁμοίαν τοῖσιν ὑγιαίνεισι γίνωνται, ἀσφαλὲς τὸ σῶμα τρέφει.

Vbi fauces agrotant, aut tubercula nascuntur in corpore, excretiones inspicere

oportet: Nam si biliosæ fuerint, corpus vnâ agrotat: Si verò similes sanis, tutum est corpus nutrire.

Ore, aphthis aut alijs ulceribus affl. etato, vel tuberculis in corpore natis, excretiones inspicienda sunt: Nam si biliosæ fuerint aut atrabilaria, aut etiam phlegmatica, significant non tantum ad cutem herere ipsos humores prauos, sed & intus esse. Quocirca purgationi tum potius insistentum quam nutritioni, quoniam impura corpora quò magis nutries eò magis lades. Si verò excretiones sint sanis similes, tunc significant naturam omnes prauos humores ad cutem expulisse, ac nihil intus reliquisse mali. Quare sine periculo corpus huiusmodi vitiosis humoribus vacuum nutriemus.

XVI.

Ὄνγου λιμὸς, ὃ δ' εἰ πονέειν.

Vbi fames, laborandum non est.

Est hic sermo communis ad sanos & agros, sanis enim non sunt precipienda exercitia simul cum inedia, neque etiam agris aliquis vehemencior motus adhibendus eo die quo cibi abstinentia imperari debet, neque sanguinem mittere oportet, neque citare vomitum, neque purgare, neque multa uti frictione, neque aliquo forti motu. Motus siquid in huiusmodi vires dissol-
uunt

nunt ubi cibus defuturus est. E diuerso dici potest, ubi laborandum, esuriendum non est.

XVII.

Ὅταν αὖ τροφή πλεονέχῃ φύσιν πλείων ἐσέλθῃ, πλεονέχον ποιεῖ. Δηλοῖ δὲ καὶ ἡ ἱστορία.

Vbi cibus præter naturam plus ingestus est, hic morbum facit: ostendit autem sanatio.

Plus cibi quàm natura modo conueniat, repletio nominatur: plus autem in corporibus duplex est, unum, quantum ad vasorum capacitatem, alterum, ad vires seu ad illam quæ nos gubernat naturam; de quo intelligens Hippocrates, dixit excedentem cibum id est, grauantem vires, esse præter naturam, & morbum subinde generare: Nam cibo supra modum ingesto, ubi adhibita euacuatione agrotus leuabitur, argumento erit morbum ex cibi multitudine fuisse ortum. Euacuationem autem dicere consuevit Hippocrates, quando humores omnes aequaliter vacuantur, quod potissimum fit venæ sectione: purgationem autem, quando praua affecti qualitate educuntur, medicamento proprio, quod humores peccantes solos natum est educere.

XVIII.

Τὸν πρεφόντων ἀνθρώπων καὶ ταχέως, ταχέως ἐκ αὐτῶν ἀλγυρήσεις γίνονται.

Eorum quæ vniuersim, & velociter nutriunt, veloces quoque fiunt excretiones.

Omnia quæ paruo post assumptionem tempore, & velociter nutriunt, velocem etiam habent excretionem: sed quæ contrariam naturam habent, ea tardè excernuntur. Nam una quæque pars proprium sibi ex cibis alimentum nata est attrahere, & sibi apponere: mox ubi fuerit saturata, tunc ipsos emitte ad excretionem. Siquidem ubi id completum est, cuius gratia retentrix facultas erat vsui, succedit expultrix, quæ quod reliquum est expellit foras.

XIX.

Τῶν ὀξέων νοσημάτων ἡ πλείων ἀσφαλές αἰ ἀποδιαγροῦσις, ἔτε δ' ἰανάτῃ, ἔτε τῆς ὑγείης.

Acutorum morborum non omnino tutæ sunt prædictiones, neque salutis, neque mortis.

Acuti morbi quos magna ex parte comitantur febres continuæ, præterquàm quòd celerrimè iudicantur, statim etiam magnitudinem habent: fiunt vel ex humoribus calidis nullum certum obsidentibus locum, vel in loco certo patiente fiunt, ut pleuritis, peripneumonia, synanche. Morbi verò longi à crassis, lentis, & frigidis humoribus facti, in patientibus partibus impacti sunt

sunt atque fixi, qui, quia causam habent non
ad id motuam, predictiones in his sunt tutiores:
In acutis verò non omnibus certa sunt, verum
aliquando falli praecognitionem facit Hippo-
crates, ob subitas quae in his contingunt mu-
tationes. Et quia humor noxius saepe ex uno loco
transfertur ad alterum, de parte ignobili ad
principem, & de principe ad aliam fertur: haec est
causa propter quam multi venalescunt, quos mo-
rituros medicus praeiudicavit: & multi mori-
antur, quos minimè morituros existimavit: huius autem
rei causa est humor noxius sic errabundus, unde
prognostici falsitas contingit. Quo fit ut in his
non temerè sit de morbi exitu pronuntiandum.

X X.

Ὅ κρύσσει νέοισιν ἔστιν, αἱ κρύσεις ὕδατος εἰσι,
τετέοισιν ἀποξηρόσκειν ξηραίνοντα. ὁ κρύσει
ἢ νέοισιν ἔστιν, αἱ κρύσεις ξηρὰ εἰσι, τετέοισι
περὶ στυτέοισι γινώσκουσιν ὕδατινεντα.

Quibus iuuenibus adhuc alvus humecta
est, iis senescentibus exsiccat: quibus verò
iuuenibus adhuc alvus sicca est, iis senescenti-
bus humectatur.

Qui alvos habent natura humidiores, magna
ex parte sit, iis senescentibus, ad contraria trans-

H

mutatio: qui vero sicciores, iis eadem victus ratione seruata, fient in senectute humidiores, propter contrarias iuuenum & senum temperaturas. Vel quia minus cibi assumitur in senectute, quam potencie hepatis congruat, vel quia partium bilis confluat ad aluum, vel quia retentrix facultas est robusta, expultrix imbecilla, excrementa siccantur. Quibus vero ob innatam siccitatem facultas retentrix fortior existerat, iis senescentibus fiet imbecillior, & ea ratione excrementa humectabuntur, quoniam expultrix valens est, retentrix imbecilla non remorante fluxum ciborum. Quod etiam ob hepatis refrigerationem accidere potest, vel ob multa bilis affluxum ad intestina, que ea sollicitat, & ad excretionem inuitat.

X X I.

Λιμὸν ἰώρηξις λύει.

Famem vini potio soluit.

Fames, non omnis, sed vehemens, implacata ciborum appetentia, dicta canina fames, suctus continuus oris ventriculi ab intemperie frigida: hac meri potu soluitur. Vinum enim generosum (si praesertim post edulia pingua offertur) innanziens, quia longiore tactu calefacit, emendat intemperiem illam frigidam, unde famem excitatam sedat.

Α' πδ

Α' πὸ πλησμενῆς ὁκρῶσαι αὐὸ νοσήματα γλῆνη.
κένωσις ἰήται. καὶ ὁκρῶσαι ὑπὸ κενώσεως, πλη-
πλησμενῆ. καὶ τῇ ἄλλων ἢ ὑπεναντίωσις.

Quicunque morbi ex repletionione fiunt, cu-
rat euacuatio. Et quicunque ex euacuatio-
ne, repletio; & aliorum contrarietas.

Quod quidem multitudo morbum efficiat, an-
tea dictum est: quod autem euacuatio sit eius
curatio, cum id unicuique manifestum sit, non
est opus dicere, sicuti neque de omnibus alijs cau-
sis quæ morbos committunt, quod per contraria
curentur.

Τὰ ὁξεία τῶν νοσημάτων κρῖνεται ἐν τεσσα-
ρεσκαίδεκα ἡμέρησι.

Acuti morbi intra quatuordecim dies
iudicantur.

Acuti morbi simpliciter, quia magni sunt, &
ad suum vigorem celeriter properant, magnas, &
subiitō faciunt permutationes: in quibus si ad
melius, vel ad sanitatem mutatio repen'e fiat,
superante natura perniciem imminuentem ab eo
quī morbum committebat humore, bona iudi-
catio dicitur ab Hippocrate: si verò ad deterius,
vel ad mortem fiat, natura vi prostrata, mala.
Terminum autem istius iudicationis definit se-

cundam septimanam, ita ut non ultra decimum quantum diem prorogetur, licet illum diem anticipare possit. Sunt alij quidem, sed non simpliciter acuti, quos interpretes nonnulli, ex decidentia vocant. Hippocrates in prognost. hos dicit acutos, qui in quadraginta diebus indicantur.

XXIV.

Τῶν ἐπὶ τῇ αἰ τετάρτῃ ἐπίδηλῶν. ἑτέρης ἐξδομοῦδος ἢ ἐν δόμῃ δευτέρῃ. θεωρητὴ δὲ ἐν δόμῳ αὐτῇ γὰρ ἐπὶ τετάρτῃ τῆς ἑτέρας ἐξδομοῦδος. θεωρητὴ δὲ πάλιν ἢ ἐπὶ δευτέρῃ δόμῳ. αὐτῇ γὰρ ἐπὶ τετάρτῃ μὲν ἀπὸ τῆς περὶ αἰσθητικῆς, ἐξδομῇ δὲ ἀπὸ ἐν δόμῳ.

Quartus dies septenorum est index, octavus alterius septimanæ principium existit: est verò & undecimus contemplabilis: Ipse enim quartanus est alterius septimanæ: contemplabilis rursus decimus septimus, quippe quartus est à quarto decimo, septimus verò ab undecimo.

Indices & contemplabiles dies nominat, quod sequentes dies decretorios, quales futuri sint, quale, ve habebunt mutationes, aut crises, inditent. In diebus autem (quoniam septenario circuitui magna vis inest in iudicando; quartanario verò in demonstrando) fit ut quartus, dies septimi; undecimus, decimi quartus; decimus septimus.

vigs-

vigesimi; vigesimus quartus, vigesimi septimi;
 & sic deinceps, à quartanario ad septenarium
 procedendo, fit index. Caterùm alij inter iudica-
 torios & indices, dies intercidentes dicuntur, in
 quos, non nisi erratis quibusdam interuenienti-
 bus, crises transferuntur. Quippe in ijs, non natu-
 ra motu ac impulsu, sed morbi magis malitia, aut
 extraneo aliquo impellente, iudicationes fiunt.
 hinc est quòd à nonnullis prouocatoriij nomenen-
 tur, quòd nimirum in ijs natura, non sua sponte,
 sed prouocata pugnam contra noxios humores
 adoriatur.

XXV.

Οἱ θερινοὶ τεταρταῖοι τὰ πολλὰ γίνονται βρα-
 χέες. οἱ δὲ φθινοπωρινοὶ μακροὶ, καὶ μάλιστα οἱ
 πρὸς τὴν χειμῶνα συνάπτοντες.

Æstiuæ quartanæ magna ex parte breues
 sunt, Autumnales verò longæ, præsertim
 quæ Hyemem attingunt.

Non solum quartana breues Æstate fiunt, sed
 & ægritudines aliæ, propterea quòd humores vi-
 tiosi ambientis calore per vniuersum corpus fusi,
 promptè discutiantur, meatibus totius corporis
 patefactis. Quibus igitur vires validæ sunt,
 noxijs humoribus euacuatis, ij citò reualescunt
 à morbo: quibus verò sunt imbecilles vires,
 unà cum euacuatione humorum ipse dissoluntur.

tur ac agri intereunt. Quare non sine ratione morbi Æstate longi non sunt. Sicuti ve d Æstate discuti humores, & vires dissolui contingit, hoc est, agros sanitati restitui, aut citò interire: ita Hyeme contraria eueniunt, ut & humores intus remaneant meatibus corporis frigore occlusis, & vires seruentur robustæ. Neque igitur morbi solvuntur manentibus ijs qui eos efficiunt humoribus, neque agri moriuntur viribus interim sufficientibus.

XXVI.

Πυρετὸν ἐπὶ ἀσθενείᾳ βέλπειν βέλαι, ἢ ἀσθενείᾳ ἐπὶ πυρετῷ.

Febrem conuulsioni superuenire melius est, quàm feбри conuulsionem.

Cum sanum aliquem repente conuelli acciderit, huiusmodi conuulsionem fieri ex repletionem partium nervosarum est necessarium. Etenim nervi replentur frigidis & glutinosi humoribus, unde contracti versus originem suam nobis nolentibus conuulsionem patiuntur. Hisc igitur febris sponte natura superueniens solita est magna ex parte calfacere, extenuare, digerere superfluum humiditatem, atque adeo conuulsionem ipsam sanare, affectus affectum. Si verò ex febris ardentibus totum corpus exsiccetur, & nervi deinde ex siccitate conuulsio accadat, hoc maximum est malum, & penè insanabile, quoniam

longum tempus exigitur ad consummatam nervorum siccitatem remouendam: quinimo habitualis humiditas, si semel absumpta fuerit, vix unquam recuperari potest: morbi autem acerbitas inducias non admittit, sed vires dissoluit, & subitum exitium affert.

XXVII.

Τοῖσι μὴ καὶ λόγον ἔχουσιν ὁ δὲ εἰς πῶς εἶναι, ὁ δὲ φοβεῖσθαι λίαν τὰ μυχθὲν γινώσκοντες λόγους. ὅτι καὶ πολλὰ τῶν τοιούτων εἰς αἰδέσθαια, καὶ ὁ πάντων ἀμάρτυς ὁ δὲ χρονίζων εἶωθεν.

His quæ non ex ratione leuant, confidere non oportet, neque admodum formidare mala quæ præter rationem eueniunt. Plurima enim horum instabilia & infirma sunt, nec perseverare aut diutius durare consueverunt.

Cum morbus vehemens subitò cessat & remittitur, idque neque per sudorem aut vomitum, neque per alui detractionem aut profluvium sanguinis, corpore euacuato, ac nec apparente quidem ullo coctionis signa, exstet talem morbi remissionem infidam esse, & minimè securam. ut pote, quæ deterius quiddam in posterum comminetur. Mala verò quæ in morbo præter rationem accidunt, ut spirandi difficultas, delirium, rigor, febris, non admodum formidanda sunt, nam hæc quoque stabilia non sunt, tantumque abest ut ma-

lum aliquod significant, ut etiam futuram breui tempore morbi indicationem ostendant, praesertim ubi prius signa coctionis apparuerint.

XXVIII.

Τῶν πυρεσόντων μὴ πάντες οἱ ἐπιπολαῖες
 ἔσονται καὶ μὴ γὰρ ἐνδεόναί τ' οὖμα καὶ συν-
 τήκεται μὲν οὖμα καὶ λόγον, μετὰ θέν. Ἐμὲ γὰρ
 μέγας ἔστι σιμῶν, καὶ ἡ ἀδένειαν.

Corpus eorum qui non omnino leuiter febricitant, perflare & nihil comminui, aut magis quam ratio exoptulet extenuari, malum. Alterum enim diuturnitatem morbi, alterum imbecillitatem significat.

Febriantium non omnino leuiter, id est, grauiter, & sicut media quadam febre intermittem a modum ac vehementem, corpus permanere, & nihil minui neque collabi, vel plusquam magnitudo morbi postulat contabescere, malum. Nam quod tale permaneat id ex densitate cutis accidit & crassitie humorum, & propterea longitudo morbi significatur: quod autem contabescat nimis, id contingit ob humorum tenuitatem, aliquando & cutis raritatem, aliquando vero & ob solam virium imbecillitatem, qua magna ex parte cutis & humoris tenuitatem consequitur: tum enim celerrime corpora emaciantur & euacuatur per eam qua difflatio insensibilis nominatur.

A. p. 20.

29 Ἀρχομένων δὲ νόσων ἢ πρὸς κίνησιν, κίλει. ἀκμαζουσῶν ὅμως ἡσυχίᾳ ἔχειν βέλπιόν ἐστιν.

Cum morbi inchoant, si quid videtur mouendum, moue: cum vero consistunt ac vigent, melius est quietem habere.

30 Περὶ τῶν ἀρχαῖς καὶ τοῖς τέλει πάντα αἰσθε-
νέστερα, καὶ ὅμως ἀκμαζούσιν ἰσχυρότερα.

Circa initia & fines omnia imbecilliora, circa statum verò fortiora.

Cum humores in aliqua corporis parte fixos atque formatos ante coctionem mouendos esse vetuerit, non abs re consulit hic ut si expediat, & si quid initio mouendum appareat, moueamus; non semper inter morborum initia humores mouendi libertatem concedens, sed ium solum cum turgent, aut saltem fixi non haerent. Quod certè non impedit quominus initio aluum ducas glande, clystere, vel leui pharmaco quod lubricando non fortiter attrahendo purget, ut ab excrementorum onere leuentur intestina, & alijs succis educendis reddantur paratiora. Hec levis inanitio, qua vacuatio crudorum non est, sed excrementorum, prodest interim ad maiora: nam si quid noxij humoris circumstat,

etiam educitur & omnibus his meatibus reseratis
 sapissime per quandam sequelam ex superioribus
 partibus aliquid emittitur, ut 2. de compositione
 medicamento um secundum locos. § 12. methodi
 traditum est de clystere, qui etiam ex mesenterio
 & simis hepatis frequenter educitur. Rei summa
 in hoc sita est, ut cum nobis non desint medicamenta
 clementia, antiquis etiam ignota, liceat initio morbi
 purgare eo pharmaco, cuius vis ex ea parte non attrahat
 in qua haeret aliquid cruditas, & praeterim à
 mesenterio & iocinore: nam primarum venarum
 cruditas, quamvis alia omnis, hac tamen est
 quae pharmacum maxime detestatur. Quare sicuti
 turgens humor, & qui turgentis nomine potest
 intelligi, tenuis, sincerus, pestilens, mobilis,
 deorsum vergens, quiescere non permittens,
 & qui unque à crudis longius recedit, mox
 educi cum praemeditatione potest: ita crassus
 & fixus educendus in principio non dicitur,
 ideo quia prius extenuari & incidi debet, &
 morbi coctio expectari. Medicus itaque, si quid
 initio mouendum esse duxerit, vel missione
 sanguinis, vel purgantibus medicamentis id
 moueat, in memoria semper habens, quod desperatos
 attingere non oportet. In vigore autem ab omni
 remedio abstineat. Nam in statu symptomata omnia
 cum sint acerbissima & natura sit intenta morbo
 profligando, ea medicamentis auocanda non est
 ab n. Aliuto.

Τὰ ἐξ ἀρρώστιας δύσσιτέοντα μὴ δὲν ἐπιδιδόναι
ἐσώμα, μεχθρόν.

Eius qui ex ægritudine benè cibatur, ni-
hil proficere corpus, malum.

Quod corpus eius qui à morbo cibum capit,
non proficit nec euadit carnosum, vegetum, flori-
dum, hoc fit ex facu tatis imbecillitate, vel ex
malo: um humorum superabundantia.

Ὡς γὰρ πολλὰ πάντες οἱ φασίως ἔχοντες, κατ'
ἄρχας μὴ δύσσιτέοντες, καὶ μὴ δὲν ἐπιδιδόντες,
πρὸς τὴν τέλει πάλιν ἀσιτέσθιν· οἱ δὲ κατ' ἀρχαίς
μὴ ἀσιτέοντες ἰχυρεῖς, ὑπερβν δὲ δύσσιτέοντες, βέλ-
λον ἀπαλλάσσουσιν.

Omnes ferè qui malè se habent circa ini-
tia cupide comedentes, nec quicquam pro-
ficientes, ad postremum rursus cibum non
appetunt: qui verò circa initia cibum valde
fastidiunt, postea benè appetentes, ij in me-
lius euadunt.

Quidam soluti morbo benè appetunt, qui se
corroborantur, bonum: sin minus, vel facultas
nutrix imbecilla est, vel abundant humores no-
xij, vel plenius quàm pro naturæ modo cibantur.
Quidam non appetunt, quia natura longa pugna
fatigata, quiete gaudet magis quàm alimento:
Quod ex longo itinere fessis usu venit, paulatim

tamen comedentes corroborantur & renalescunt.
Quod si perseveret deiecta appetentia, significantur
reliquia humorum vacuandorum.

XXXIII.

Εν πάσῃ νόσῳ ὁ ἐρρῶς τὴν ἀλγύνοιαν, καὶ
ὁ ἔχθρ' αὖτος τοῖς αἰσθησφορῶσι, ἀγαθόν· ὁ δὲ ἐναν-
τίον, κακόν.

In quovis morbo mente constare, & bene
se habere ad illa quæ offeruntur, bonum:
contrà verò se habere, malum.

Ex constantia mentis significantur omnia sa-
na esse quæ circa cerebrum sunt; sicut ex prom-
ptitudine quadam ad ea quæ offeruntur, conie-
ctura fit de ijs quæ ad ventrem attinent, & hepar,
& cor. Sic se res habet: In ijs omnibus in quibus
ager parum recessit à consuetudine naturali per
morbum, siue in apprehensione & ratiocinatio-
ne, siue in appetitu cibi, in colore, vigore, siue in
alijs omnibus consuetis, melius est quàm si mul-
tus fiat recessus. Omnes enim morbi iudicantur
quanti sint, aut quales, ex recessu à natura.

XXXIV.

Εν τῇσι νόσοισιν ἥσων κινδυνεύουσιν οἷσιν αὖ
οἰκείῃ τῆς φύσεως, καὶ τῆς ἡλικίης, καὶ τῆς ἐξέ-
ως, καὶ τῆς ὥρης ἢ νόσος ἢ μὲλλον, ἢ οἷσιν αὖ μὴ οἰ-
κείῃ κατὰ τὰ τέλει.

In

SECTIO II.

55

In morbis minus periclitantur, quorum naturæ, habitui, aut ætati, aut tempori, magis cognatus est morbus, quam quibus nulli horum cognatus est.

Omnis morbus calidus, frigidus, humidus, siccus, ægri temperatura conueniens, aut ætati, aut habitui, aut tempori, ideo minus habet periculi, quia cum minus recedit à statu naturali, ad eum faciliorem egressum fieri permittit. Ut pernicioſa mala sunt quæ sunt dissimilia, ob idq; maiori de causa pronenerunt: ita minus malum putandum est, quod accommodatum naturæ facile irrepserit: curatur enim facilius quod ex causa prodiit leuiore. Quibus efficitur ut duarum febrium ardentium magnitudine pariam, ea quæ iuueni contigerit Æstate, sit multò minus periculosa, quod ætati congruat & tempori: Quæ verò senî & Hyeme, calidissima frigidissimo, & per tempus frigidissimum acciderit, hæc ut sit maximè pernicioſa necesse est, quod scilicet excitari non poterit nisi à maxima & vehementissima causa.

X X X V.

Εν πάσῃσι τῇσι νέουσι τῷ αἵματι τὸν ὀμφαλὸν καὶ τὸ ἥπαρ πάχος ἔχον βέλπιδόν ἐστι. τὸ δὲ σφρόδρα λεπλὸν καὶ ἐκτετηγὸς, μαχθηρόν. Εἰς σφάλας δὲ τὸ τῷ σφρόδρον καὶ αἵματι καὶ τῷ ἥπατι καὶ τῷ σπένδι.

In omnibus morbis partes quæ ad umbilicum, & imum ventrem sunt crassiores esse melius est : plurimum verò extenuari, & contabescere, prauum. Ad purgationes etiam quæ per inferna fiunt, hoc idem tutum non est.

Hypochondria optimum est absque dolore esse, & mollia, & equalia. In his autem quæ carnosæ sunt & crassæ, hæc meliora sunt : Quæ verò tenuia, mala : & tanquàm signa, & tanquàm causa. Signa enim sunt partium, quæ contabuerunt, imbecillitatis : causa verò, quòd ciborum concoctio bona non fiat in ventre, neque sanguificatio in hepate. Nam à crassitie abdominis calor nativus augetur, à quo partes subiectæ calfactæ cibum benè concoquunt, & bonum generant sanguinem. Porro quæ easdem partes colliquatas & extenuatas habet, non sustinet inferiores purgationes. Oportet enim omnes quæ infra thoracem sunt partes robustas esse, ut benè purgationibus seruiant : alioqui magna incommoda patiuntur à vi medicamentorum.

XXXVI.

Οἱ ὑπερβῶς ἔχοντες τὰ σώματα, ἐν τῇσι φαρμακείοις καὶ ταῖς ἐμύλοις ἐκλύονται ταχέως, καὶ οἱ πονηρῇ τῷ φῶγι χροιάσονται.

Qui

S E C T I O I I .

57

Qui sanitate corporis fruuntur medica-
menta assumentes, statim exoluuntur, &
qui prauo vtuntur cibo.

Qui partes similes & organicas temperatas,
& ob id actiones omnes inculpatas habet, si me-
dicamentum validum sumit, syncope prehendi
solet, viribus exolutus: quoniam medicamentum
cum non inuenit humorem sibi familiarem in
homine temperato redundantem, necessario &
quasi tyrannicè trahit eum qui cum sanguine
mixtus, una cum alijs, essentiam hominis consti-
tuit. Itidem qui prauo vtuntur cibo, & ob id la-
borant cacochymia, si affatim purgentur, viribus
exoluuntur, propter malorum humorum super-
abundantiam, qui, cum acres sint & mordaces,
transitu suo molestiam inferunt, & tandem a-
nimi defectum. Quare paulatim educendi sunt
humores noxij, & boni vicissim apponendi per
epicrasin.

X X X V I I .

Οἱ δὲ τὰ σώματα ἔχοντες, φαρμακὸς εὐδαι-
μονίδεες.

Qui benè valent corpore, difficulter fe-
runt medicationes.

Nam & vertigines, & tormina, & syncopas
patiuntur, & exoluuntur, & difficulter omnino
his purgatio procedit, qui comoderato sunt cor-
pore. Funt autem hac omnia medicamento pro-

primum quidem humorem attrahere appetente,
 ut flauam bilem, vel atram, vel pituitam, vel a-
 quosam supe-fluitatem: qui, quia non adest pec-
 cans in corpore symmetro, absumit sanguinem,
 & carnes colliquat, ut ex ipsis proprium attrahat
 humorem.

XXXVII.

Τὸ σπικρὺ χεῖρον καὶ πόμα, ἢ σίτον, ἢ ὄλον δὲ,
 τῷ βελτιόνων μᾶλλον, ἀνδρεστέων δὲ, μᾶλλον αἰρε-
 τέον.

Parum deterior potus aut cibus, suauior
 autem, melioribus quidem, sed minus suauibus,
 est præferendus.

Hac sententia vera est, non in cibo tantum
 & potu, sed omnibus sumendis, ad mouendis, fa-
 ciendis, educendis: ut medicus gratificetur egro in
 eo in quo delectatur, & cui consuevit modo ne
 multum recedatur ab eo quod secundum ratio-
 nem faciendum est. Nam quæ cum voluptate
 sumuntur, ea ventriculus amplexatur avidius,
 & magis concoquit: sicut illa quæ displicent re-
 fugit, unde nausea, flatus, & fluctuationes subse-
 quuntur.

XXXIX.

Οἱ πρεσβύται τῷ νέων τὰ μᾶλλον ποτὰ νοσέουσιν
 ἥσων. ὅσα δὲ αὐτῶν χρόνια νοσήματα γίνε-
 ται, τὰ ποτὰ ζῶντα ἀποθνήσκουσι.

Senes

SECTIO II.

59

Senes magna ex parte minus quàm iuue-
nes ægrotant: diuturnis verò morbis corre-
pti commoriuntur.

Senes quia diligentes sanitatis sue custodes
prudentius viuunt quàm iuuenes, qui sunt in-
temperantes, magna ex parte minus ægrotant.
Sed id acceptum referre debent optima victus ra-
tioni, non dispositioni senili, quæ natura ita
morbofa est, ut Poëta Comico sit senectus ipsa
morbus, & permulti senectutem morbum natu-
ralem, alij morbum insanabilem esse non imme-
ritò dixerint. Quòd verò multi morbis diuturnis
commoriantur, quales sunt rucedines, & graue-
dines, alijq; huiusmodi morbi frigidi, clarum est,
siquidem & calor est paucus, & facultas imbe-
cillis, ita ut morbos frigidos concoquere non pos-
sit. In hos autem facilius incidunt senes, quo-
niam omnes congruentibus natura sua morbis
facilius corripiuntur: & minus in his periclita-
rentur per sententiam precedentis Aphorismi: ac
re vera minus periclitantur, quàm in calidiori-
bus morbis. Sed cum non possint illos concoquere,
propter caloris inopiam, & viriam imbecillita-
tem, diutius ægrotant.

XL.

Βαλάνη καὶ κόρυζα εἰς σφόδρα πικρὰ εἰσὶν
& πικρὰ πάντα.

I

Raucedines, & grauedines in valde senibus coctionem non admittunt.

Raucedines & grauedines quæ sunt destillationes; illæ quidem à capite ad fauces, hæc verò ad nares, coctionem vix admittunt in valde senibus, propter caloris naturalis imbecillitatem, & virium: sed ipsos senes ferè comitantur ad mortem, ut alia morborum genera quæ ex frigidis humoribus ortum habent, iusses, asthmata, nephritis, arthritis, coxendicum dolores, &c.

X L I.

*Οἱ ἐκλυόμενοι πομπῆς καὶ ἰσχυρῶς αὐτοὶ
φανεροῦς αἰσθητικῆς ἐξαιτίας τελευτῶσι.*

Qui frequenter ac fortiter absque causa manifesta animo deficiunt, repente moriuntur.

Non omnes qui deficiunt animo, repente moriuntur, nisi sapius hoc patiantur, & fortiter, & sine causa manifesta. Nam mulier, longum in balneo tempus commorata frequenter animo deficiebat, ob temporis diuturnitatem: Alteri idem accidebat si per heram lauabatur, nisi aliquid panis assumpsisset: quibus os ventriculi dabile erat, aut exactissimo sensu percipit. Verum non erat hoc mortis signum, cum causam haberet manifestam. Sed qui ex nulla tali causa sapius ac for-

ac fortiter animo deficiunt, ij, ob virtutis vitalis imbecillitatem, hoc patiuntur. Etenim quibus robur vitale infirmum est, animi verò affectiones ob imperitiam fortes, ijs anima essentia facile dissolui potest. Ceterum ut proprio affectu cor laborare solet, quem cardiaca syncope consequitur, sic ex stomachi vitio syncope eos affectus insequitur quibus os ventriculi (stomachum nonnulli appellant) infestatur. Porò utriusque partis, tum oris ventriculi, tum cordis, hæ dispositiones, aut à forti duntaxat intemperie, aut venoso humore, nonnunquam ab erysipelate, aut inflammatione, aut alio quopiam præternaturam tumore feri solent: quas interdum mors repentina comitatur.

X L I I.

Λύειν ἀποπληξίαν ἰσχυρὰν ἢ ἀδυνάτην, ἀδυνάτῃ δ' ἐπιδοῦν.

Solvere apoplexiam fortem, impossibile: debilem verò, non facile.

Hic Aphorismus est prognosticus, docens medicum, ne temerè curationem eius apoplexiæ attemptet, quæ curari non potest. In apoplexijs totum corpus sensu priuatur, & motu, solus restat antelirius, qui si & ipse prohibeatur, maxima est apoplexia, quæ curationem non admittit: nam vitæ

consistere non potest sublatâ respiratione. Omnes autem apoplexiae sunt vi animalis non potente defluere ad partes infra caput existentes; quæ autem propter aliquam dispositionem similem inflammationi, quæ in ipso est cerebro constituta, aut ventriculis ipsis oppletis humore pituitoso. Verum causa magnitudinem, morbi etiam magnitudo consequitur. Magna siquidem vel parua lesio respirationis vehementem arguit, vel leuem apoplexiam: atque illi quidem nulla salus, huic autem etsi aliqua, non potest tamen nisi dubia promitti.

XLIII.

Τὸν ἀπὸ χυμῶν καὶ κατενυμῶν, μὴ δὲ πρὸς τὴν καρδίαν, ὅντιν αἰφύροντι οἱ αὐτοὶ ἀφ' οὗς ἢ πρὸς τὸ σῶμα.

Qui strangulantur & moriuntur, nondum tamen mortui sunt, non redeunt ad vitam quibus spuma circa os fuerit.

Qui à causa vel externa, vel interna strangulantur, nondum tamen viribus omnibus privati, raro ad sanitatem redeunt. qui spumante ore conspiciuntur. Spuma enim pulmonis violentiam significat, quam patitur, dum animal suffocatur.

O:

XLIV.

Οἱ παχέες σφόδρα καὶ φύσιν, ταχὺ θάνατοι γί-
γνονται μᾶλλον τῶν ἱσχνῶν.

Qui natura admodum obesi sunt, celerius
moriuntur quam qui graciles.

*Est habitudo corporis à prima confirmatione
mediocris, duæ sunt extrema, obesorum & exte-
nuatorum. Sed excessus ad crassitiem. peior est eo
qui est ad gracilitatem, nam graciles habent ve-
nas latiores, & in his plus sanguinis, ac ideo plus
caloris & spiritus, & ita sunt vivaciores: hoc ta-
men habent incommodi, quòd adipis munimento
destituti à causis exterioribus, vento, aqua frigo-
re, & similibus promptius offendantur. Obesis
autem, quia paucus est sanguis & spiritus, citò
ipsis, vel parvam ob causam, calor natiuus extin-
guitur.*

XLV.

Τῶν ἐπιληπτικῶν τοῖσι νέοισιν ἀπαλλαγὴ καὶ αἱ
μεταβολαὶ μάλιστα τῆς ἡλικίης. καὶ τῶν τόπων, καὶ
τῶν βίων ποιέεσι.

Quicunque iuvenes morbo comitiali la-
borant, mutatione maxime ætatis, & tem-
porum, & locorum, & victuum quoque li-
berantur.

Quia iuuentus, cum mutatur, cedit etati consistentie, quæ minus calida est, & ob id ineptior ad superandum humorem illum frigidum & crassum, legatur in textu: Quicumque pueri, non iuvenes: Succedit enim pueritia iuuentus multo calidior. Neque verò mutationes qualibet morbum solvunt comitiales, sed quæ calidiorem & sicciorum corporis habitum efficiunt, quæ nimirum ad contrarium transferunt. Morbus enim comitialis proximus est quodammodo apoplexia, cum idem locus in utroque patiatur, & idem humor in causa sit, frigidus enim & crassus est humor ambobus. Verum apoplexia ob omnimodam carentiam illius potentie, quæ ad nervos defluit, unde abolitio sensus & motus: Epilepsia verò, propter motum vitiosum (nervorum principio seipsum quatiente, quò id quod noxium est excutiat) generatur. Etatis ergo, locorum, temporum, & victuum mutationes ad contrarium, liberant huic malo obnoxios pueros: quia contraria contrariis curantur.

X L V I.

Δύο πόνων ἄμφω γινομένων, μὴ καὶ τὸν αὐτὸν ἔπον, ὁ σφοδρότερος ἀμυνεῖ τὸν ἑτερον.

Duobus doloribus simul factis, non eodem loco instantibus, vehementior alterum obscurat.

Si duo

Si duo dolores eodem tempore, eodemq; in loco molesti sint, ij quidem augent loci afflictionem, cum neuter lateat agrotantem: Si verò sint in locis diuersis simul, ut in capite unus, alter in brachio, tunc unum ab altero obscurari contingit, cum vis sensibilis tota ad vehementiorem ducatur ac distrahatur. hinc taciè monemur, ut quando res ita contigerit, v'gentiori succurramus dolori, non neglecto tamen altero.

XLVII.

Περὶ τῆς πυρετοῦ καὶ πύρετοι, καὶ οἱ πυρετοὶ συμβαίνεισι μέλλον ἢ ἀναμύει.

Dum pus conficitur, dolores accidunt magis quam iam confecto.

Dum pus conficitur, dolores ac febres accidunt ex quadam veluti ebullitione, atque exustione sanguinis, in extenta simul ac calefacta prater naturam inflammata particula; qui ubi ex toto exustus fuerit, residuum eius fit pus, quem admodum ex lignorum exustione cinis: atq; ideo tempore illo dolores sedantur, ac febres, praesertim, cum pus fuerit excretum, utpote iam consumpta quidem materia, extincta autem ignea caliditate.

XLVIII.

Εν πάσῃ κινήσει τῶ σώματος, ὁρῶνται δὲ χύται πόνειν, καὶ διακρίνεται ὁ πυρετός, ὁρῶνται.

In omni corporis motu, quum fatigari
cœperit, quies confestim lassitudinis est re-
medium.

*Vt alia omnia suis contrarijs sumantur, sic
etiam fatigatio, quam ex valido motu contraxi-
mus, quiete. Nam, ut est apud Poëtam,
Hac reparat vires, fessaq; membra lenat.*

X L I X.

Οἱ εἰς διαμύροι τὰς συνήθους πόνας φέρειν, καὶ
ὡπὴν ἀδυνάεις ἢ γέγοντες, οὐκ ἀσυνήθων ἰσχυρὰν τε
καὶ νέων πόσον φέρουσιν.

Qui consueti labores solitos ferre, et si in-
validi sunt aut senes, facilius ferunt quam
qui non sunt assueti, quamvis robusti & iu-
venes.

Magna vis est consuetudinis: nihil enim ubiq;
tam difficile est & arduum, quod in familiarita-
tem non perducatur assidua meditatio. Vnde fit ut
alii terram fodiant, aut arent; alij remigent, &
facilius & incundius ἢ videlicet quibus id saepe
usu venit. Nam exercitio rebus, & consuetudine
voluptas ad agendum acquiritur. Quod Poëta
significauit: Quod male fers, assuesce, feres bene:
cuncta vetustas lenit.

Τὰ ἐκ

I.

Τὰ ἐκ πολλοῦ χρόνου συνήθεια, καὶ ἡ χεῖρ, καὶ
 αἰσινήτων ἥσασον ἐνοχλεῖν εἴωθε. δεῖ οὖν καὶ ἐς τὰ
 αἰσινήθεια μεταβάλλειν.

Quæ longo tempore assueta sunt, etiam
 si deteriora sunt, minus iis quæ insueta sunt
 molestare consueverunt: Conuenit igitur
 etiam ad insueta permutari.

Hic aphorismus de consuetis omnibus enun-
 ciat sumendis, admouendis, faciendis, educendis,
 quorum singula etsi mala sunt, minus tamen
 nocent quàm ea quæ natura quidem, non aequè
 noxia, sed nunquam in consuetudinem peruene-
 runt. Verùm quoniam mutanda consuetudinis
 incidere potest necessitas, & natura non sustinet
 repentinam mutationem absque noxa, prouiden-
 dum ne repentiè diffecemus mala consuetæ, sed
 dissuamus insuetæ paulatim assuescentes.

APHORISMORVM

HIPPOCRATIS

Sectio III.

APH. I.

Αἱ μεταβολαὶ τῶν ὥρων μάλιστα ἵκνυνται νοσήματα, καὶ ἐν τῇσιν ὥρῃσιν αἱ μεγάλαι μεταλλάξεις, ἢ ψύξις, ἢ θάλψις, καὶ τ' ἄλλα καὶ λόγον ἔστω.

Mutationes temporum maximè pariunt morbos, & in ipsis temporibus magnæ mutationes, aut frigoris, aut æstus, & alia pro ratione, eodem modo.

In anni temporibus magna mutationes aëris, id est, multa alterationes temperamentorum, alia post aliam, frigoris, vel caloris; humiditatis, vel siccitatis; ventorum, vel horum defectus, causa sunt effectrices morborum natura sua familiarium, in ijs præsertim corporibus quæ sunt ad patiendum idonea. Aër dici potest re. naturalis, ubi concurrit ad compositionem hominis: Non naturalis, quia sinistrè adhibitus, corpus humanum alteret, atque ad id sanitatem destruat. Præter naturam est aër, ubi à sua tempera-
tura

natura multum immutatus, corpus nostrum
 ledit atque corrumpit. Nam quum aëre ne mo-
 mento quidem careere possimus, fit ut is nos con-
 tinenter afficiat, ac in suam qualitatem alteret,
 & si corruptus est, in similem trahat corruptio-
 nem, propriumque in vitium transmutet. His de
 causis mutationes quaedam sunt aëris naturales,
 quae fiunt temporibus propriam seruantibus na-
 turam, ut mutatio ad calidum & siccum in Æ-
 state, ad frigidum & humidum in Hyeme, &c.
 Quaedam sunt mutationes non naturales, quae
 sunt aëris, à natura sua non multum recedentis:
 non naturales enim dicuntur, quia possunt uti-
 liter & inutiliter applicari corporibus nostris.
 Quaedam sunt mutationes præter naturam, quae
 ideo possunt alterare corpora nostra & corrumpere,
 quia magna sunt & repentina: de his hîc lo-
 quitur Hippoc. Sanitas enim, cum sit mediocri-
 tas quaedam, nisi idoneo temporum statu conser-
 uari non potest.

I I.

Τὸν φύσιν αἱ μὲν αἰεὶ τῆς ἡέρας, αἱ δὲ αἰεὶ τῆς
 ψυχρῆς οὐκ ἔστιν ἀλλοίωσις.

Naturarum hæ quidem Æstate, illæ verò
 Hyeme benè aut malè afficiuntur.

Natura nomine intelligi hîc debet tempera-
 tura quatuor qualitatum, calidi, frigidi, humidî,

sicci. Temperatura verò multis modis dicitur:
nam undequaque optima & exactissima cense-
tur unica & simplex, qua reliquarum est index
& regula. Siquidem in omnium rerum genere,
quod optimum & perfectissimum est id unicum
est, vitiosa verò plurima. Quare cum una tempe-
ratura sit optima, octo sunt ab optima illa defi-
cientes, magis & minus, pro varietate recessus à
mediocritate: quatuor quidem simplices secun-
dum qualitatem excedentem, quatuor verò com-
posita secundum duas: quarum tamen unaqua-
que (modò ne per eam actiones consuetæ impe-
diantur) intra terminos sanitatis contenta, cor-
rigenda est contrarijs, ut siccior humectantibus,
sumendis, admouendis, educendis, faciendis, &
alia similiter, non seius quàm qua morbosa est
intemperies, nisi quòd hac morbosa valentiora
requirit contraria, ob id quòd ab aequalitate
magis recessit. Quapropter natura frigida & hu-
mida benè afficiuntur Æstate suam seruante
naturam, quòd earum immoderatio Æstatis ca-
liditate & siccitate temperetur: Contrà, malè
afficiuntur calida & sicca natura, quando
propter similitudinem Æstatis aucta in immo-
derantiam quandam incidunt. Hyeme benè affi-
ciuntur calida & sicca natura, quòd per utran-
que oppositionem. Hyemis emendetur excessus, &
ad symmetriam fiat reditus: malè verò affiun-
tur

tur frigida humida, quod à simili Hyemis temperatura earundem excessus augeatur. Æstatis & Hyemis tantum meminit, propterea quod due partes anni sunt ha maximè insignes, & sub his reliquas complectitur.

III.

Τῶν νέσων ἄλλαι πρὸς ἄλλας οὗ ἢ κακῶς πε-
φύκασιν, καὶ ἡλικίαι βνὲς πρὸς ὥρας, καὶ χώρας, &
δραίσεις.

Morborum alij ad alia tempora magis aut minus proclives sunt, eodem modo & ætates ad tempora, loca, victus rationes, magis apt minus aptæ sunt.

Morbi, ut quedam ætates, ad contraria quidem benè, ad similia verò malè se habent: præterquàm si ætas temperata victui, & regioni, & aëri temperato comparetur, hoc enim solummodo similes à similibus benè afficiuntur. Quæ verò plus à commodatione recesserunt ætates, ijs secundum temperaturam contraria loca, & tempora, & victus genera conferunt. Porro morbi omnes cum à temperie & modo recedant, generatio quidem à similibus locis, temporibus, viuendi rationibus fit, solutio verò à contrarijs. Nam morbi calidi in locis calidis magis generantur, & minus sunt periculosi, sed magis

soluuntur in frigidis, atque in alijs proportionali-
ter. Idem est iudicium de atatibus & naturis,
qua à proba temperie declinauerunt.

I V.

Εν τῇσιν ὥρῃσιν ὅτιεν τῆς αὐτῆς ἡμέρης ὅτε ἔ-
σταλπος, ὅτε δὲ ψύχος γίνεται, φθινοπωρινὰ ἔ-
νσταται πρὸς δέχεται ἡγῆ.

Per tempora, quando eodem die modò
quidem ætus, modò frigus fit, autumnales
morbos expectare oportet.

Recte: neque enim appellationes temporum
causa sunt morborum, sed temperatura. Cum
igitur ipsa variant, necesse est & morbos conua-
riari. Quod etiam cognouit Ouidius;

Cum modò frigoribus premimur, modò solui-
mur æstu. Aëre non certo, corpora languor habet.
Autumnales morbi sunt inaequales, inconstan-
tes, & mali iudicij.

V.

Νότοι βαρήχοι, ἀχλυώδεις, κρηβαίνοι,
νωθροί, ἀχλυπηνοί. ὁκόταν ἔτος διώας δὴ, ἔ-
αῦται ἐν τῇσιν ἀρρώσῃσι πάχουσιν. καὶ δὲ βόρειον
ἦ, βῆχες, φάρυγγες, κηλῖαι σκληραί, δυσουρίαι,
φρικώδεις, ὁδιώαι πηλιδύων, σηθέων. ὁκόταν
ἔτος διώας δὴ, ἔ-
αῦται ἐν τῇσιν ἀρρώσῃσι
πρὸς δέχεται ἡγῆ.

Adustris

Austri auditum hebetant, caliginem obducunt, capitis grauitatem efficiunt, pigros reddunt & languidos, vbi ita præualuerit tempestas, huiuscemodi in morbis patiuntur: Sin aquilonia fuerit constitutio, tusses, faucium asperitates, alui duræ, difficultates vrinæ, horrores, laterum & pectoris dolores fiunt. Quando hæc tempestas præualuerit, talia in morbis expectare oportet.

Vix potest quicquam de ventis absolute pronunciari, propterea quod diuersas vires accipiant à locis per quæ flant: ob id Austri sunt lethales magis & minus pro natura locorum. Cum continenter inspiretur aër, necesse est ut talis reddatur spiritus, qualis est aër, qui sensus omnes & actiones spiritus animalis, visum, auditum, odoratum, gustum, & denique motum, tardas pigrasque efficit, si crassus, turbulentus, & caliginosus est: Et cum sit aër medium quo videmus, audimus, olfacimus, non mirum si crassus & turbulentus, crassas imaginationes & falsas offerat sensibus. Aquilo vero ventus, Austro contrarius, nempe frigidus, siccus, tusses inducit, & faucium asperitates, quod tum frigidus inspiretur aër, qui asperam arteriam, aliisque instrumenta inspirationi seruientia ladic, fauces deficcat & exasperat: & quia temporis huius constitutio tota vergit ad siccitatem, alui constringuntur, totum

corpore exsiccato, tum præcipuè, quia ad seipsum trahit humidiores partes alimenti, tum etiam, quoniam faeces in corpore diutius remanent, nec excernuntur, ea omnino exuguntur & arescunt. Urina etiam accidunt difficultates, vesica frigidity Aquilonis offensa. Eadem Aquilonis frigiditas horrores efficit, laterum & pectoris dolores, quando hac tempestas prævaluerit, id est, cum Aquilo vehementior & crebrior alijs ventis fuerit.

V I.

Ὅταν ἡ εἰς ῥύηται ἢ ἐκ ὀμβρίου, ἰδρῶτες ἐν τοῖσι πυρετοῖσι πολλὰς ὥρας δέχονται χεῖρ.

Quando Æstas fit Veri similis, sudores in febribus copiosos expectare oportet.

Æstas egressa temperaturam suam, quæ est calida & sicca, si naturam Veris induat, quæ est calida & humida, ob caliditatem quidem attrahit ad cutim: ob humiditatem vero non potest per modum vaporis resolvere. Affatim igitur, dum tota humiditas in morborum induijs excernitur, sudores facit.

V I I.

Ἐν τοῖσιν αἰσχυροῖσι πυρετοῖσι ὀξείες γίνονται, καὶ ὡς μᾶλλον ἐπὶ πολλοῦ ἢ τοῦ ἐλαττοῦς τοῦ πυρετοῦ, οὕτως τὸν χρόνον.

SECTIO III.

75

κατασκευάζουσιν ἐπιπλοῖσιν, αἱ ἐπιπλοὶ καὶ τὰ νοσήματα
ταῖς ἐπιπλοῖς δὲ τὰ νοσήματα.

Per ficitates febres acutæ fiunt: quòd si
amplius talis pergat esse annus, qualem fe-
cerit constitutionem, tales plurimum mor-
bos expectare oportet.

Ambientis humiditas pituitosos acrua: hu-
mores, & non paucos generat aquosae superflui-
taes: siccitas verò pauciores quidem humores ef-
ficat, sed qualitate biliosiores: Et hanc ob cau-
sam febres numero quidem sunt pauciores quàm
in temporibus pluviosis sed acutiores, ut tempo-
ribus morbi respondeant.

V. I. I. I.

Εν τοῖς κατὰ μέτρον καὶ κατὰ ἄλλαν τὴν ἀερίαν τὴν ἀ-
ραιὰν ἀποδιδόναι, οὐκ αἱ ἀεὶ καὶ οὐκ αἱ ἀεὶ αἱ ἀεὶ
γίνονται. ἐν ᾧ τοῖς ἀνταρθεῖσιν ἀνταρθεῖσιν
καὶ ἀνταρθεῖσιν.

In moderatis temporibus, quum tempe-
stiva sunt tempestive, morbi stabiles, & bo-
ni iudicij accidunt: in immoderatis autem,
instabiles, & mali iudicij.

In constantibus temporibus quæ ordine quo-
dam suam servant temperatam, cum tempe-
stive sunt omnia ut cum syderum ortus & occa-
sus pluvia, et eniæ, & venti suo tempore fiunt,

K

morbi constantes & faciles, & boni iudicij accidunt, quorum causas facile demoliantur vires minimè deiecte. In inconstantibus autem, quæ non seruant secundum aliquid anni constantis ductum, instabiles morbi sunt, inquieti, & mali iudicij: vel enim cum periculosis symptomatis iudicantur, vel statim sunt perniciosi, vel omnino faciunt recidivam.

I X.

Εν φθινοπώρῳ ὁ ἐξ ὑπέρτατος αἵ νοσσοῖ, καὶ θανάτου δέσεται ὁ ἐπίπνυ. ἢ ῥ' ὁ ὑμεινότετον, καὶ ἡκίστα θανάτωδες.

Per Autumnum morbi acutissimi & exitiosissimi magna ex parte accidunt: Ver autem saluberrimum, & minimè morbis exitiosis obnoxium.

Cum tempora convenientem seruant totam temperaturam, inter ipsa Ver est saluberrimum, ut quod optimam habeat temperaturam: Autumnus autem morbos acutissimos atque exitiosissimos, aliorum comparatione, affert, propter eius inequalitatem. Ob id à veteribus Philosophis & medicis tanquàm morbifer, & à poëis tanquàm pestifer iustis rationibus est damnatus: Prima, quòd traditum ab Æstate corpus languidum,

quidum, & iam effectum is excipit, quod tantum
abest ut inuet, ut ei penitus aduersetur: Corpora
enim nostra sanguine constant, sanguine facta
sunt, sanguine nutriuntur; Autumnus vero san-
guinem gigni tota sua natura prohibet. Secunda,
quod vita nostra in calido & humido est, at ille
frigidus est & siccus. Tertia, quod excrementa
per totam Aestatem liquata & fusa per corpus,
& ad cutim, ut vacuentur, festinantia, Au-
tumnus suo frigore intra corpus regerit, ibique
continet, mille morborum genera paritura.
Quarta, quod suo calore, per meridiem, cutim
corporis rarefacit & aperit, mox intra corpus
tanquam hostis frigidus irruit, & veluti odio
quodam destinato, vesperi, tota nocte, manè,
per ipsum grassatur, & quicquid habet frigoris
& mali, id uniuersum in corpus intrudit, quo
calorem nostrum natium (qui paucus ab
Aestate superfuit, & idem imbecillus & lan-
guidus) sua qualitate mala extinguat. Quin-
ta, quod eundem calorem, & nos miseros, sua
illa inequalitate caloris, & frigoris, veluti cha-
rybdi & syrci quadam, perpetuo agit. Sexta,
quod cruditatem in corpore nostro cumulat, quæ
nos & nostrum calorem obruit, ob usum crudo-
rum, qualia sunt fructus omnes, omnia noua,
quæ liberalis, si diis placet, Autumnus nobis
suppeditat.

Τὸ φθινόπωρον τοῖς φθινοπώρου καὶ τοῖς φθινοπώρου.

Autumnus tabidis malus.

Autumnus siccitate quidem prodest v'ceri
ipsius pulmonis: sed multis alijs nominibus ob-
est, tum quia frigidus omne enim frigidum (qua-
tenus tale est) ulceribus inimicum, tum, quia
mordax, ex paruo ulcere magnum facit, tum
quod ulcera reddit insuppurabilia quae suppurari
conueniunt. Praeterea cum calidus in eadem sit, &
Phthisis raro sit absque hectica, calorem & fe-
brem intendit: & excrementa auget, quae in ulcus
invehit. Verum Hippocrates in Epidemijs cum
dicit ver etiam esse tabidis malum, intelligen-
dum est Veris principium tantum, quod ferme
coniunctum cum Autumno, eiusque naturam habet,
hoc est, inaequale existit, iam scilicet frigidum,
iam calidum. Proinde cum hic dicatur Ver salu-
berrimum, & minimè exitiale, non simpliciter
alibi dixit esse malum: sed cum quadam condi-
tione, quando nimirum sic folia cornicis pedibus
similia fuerint: quae periphthisis est principij veris,
qua etiam usus est Hesiodus in lib. cui titulus,
ἐρπια καὶ ἡμέραι.

XI.

Περὶ τῆς φθινοπώρου, καὶ τοῖς φθινοπώρου καὶ τοῖς φθινοπώρου.

Βόρειος

βόρειο ὡνται, & δὲ ἑαρ' ἐπορεύον καὶ νότον,
 αὐτάκη & ἥρεο πυρετὸς ὀξεία, καὶ ὁ θα μίας,
 καὶ δυσεντερίαις γίνεσθαι, μάλιστα δὲ τῇσι γυναιξί,
 καὶ ἀνδράσι τοῖσιν ὑγροῖσι καὶ φύσιαι.

Inter anni tempora si Hyems plus iusto
 sicca & frigida fuerit, Ver autem pluvium
 & austrinum, febres acutas fieri Æstate ne-
 cessè est, & lippitudines, & difficultates in-
 testinorum, præsertim mulieribus & viris
 natura humidis.

Cum antea generatim dixerit mutationes
 temporum parere morbos, nunc particulatim id-
 ipsum in mutationibus quæ per varia anni tem-
 pora sunt, ostendit. Nam si Hyems aquilonia
 fuerit, Ver autem australe & pluviosum, necesse
 est Æstate sequenti febres acutas fieri, & lippitu-
 dines, & difficultates intestinorum. Tali siqui-
 dem vere existente colliguntur in corporibus hu-
 miditates, quæ per Æstatem calfactæ & corru-
 ptæ, febres acutas generant cum reliquis omni-
 bus, tum præsertim pituitosis. Convenit etiam
 difficultates intestinorum fieri, & oculorum lip-
 pitudines, ijs præcipuè qui ad huiusmodi effectus
 sunt præciores, vel materia ad oculos decumben-
 te, vel eadem ebulliente, & à capite ad intestina
 transmissa, quæ tandem sua mordacitate corro-
 dit intestina, & exulcerat. Vide Problema 8. pri-
 mæ sectionis apud Aristotelem.

Ἦν δὲ νόστιος ὁ χιμῶν καὶ ἐπομερος ἐ δὲ δὲ
 γίνονται, ὅ δὲ ἔαρ αὐχμηρὸν καὶ βόρειον, αἱ μὲν
 γυναῖκες ἣσιν οἱ ἔθροι παρὰ τὸ ἦρ, ἐκ πάσης πα-
 φάσιος ἐκτερώσκειν. αἱ δὲ αὐτὴ τέκωσιν, ἀκρο-
 τέα καὶ νοσώδεα τὸ παιδίον ἔκτεκωσιν, ὥστε ἢ παραπύ-
 κη ἀποκινῶσθαι, ἢ λεπία ἐ νοσώδεα ζῶν ἔοντα. τοῖσι
 δὲ ἄλλοις δύσεντερίαι, καὶ ὀφθαλμῖαι ξηραὶ γί-
 νονται. τοῖσι δὲ πρεσβυτέροις κρυπτοὶ σιντόμως
 ἀποκινῶσθαι.

Si verò Hyems austrina & admodum
 pluvia fuerit, Ver autem siccum & aquilo-
 nium, mulieres, quibus partus Vere immi-
 nent, ex quacunque occasione abortiunt:
 Quæ verò pepererint, imbecilles & mor-
 bosos infantes edent, ita ut aut statim per-
 eant, aut inualidi & morbofi viuant. Cæte-
 ris verò difficultates intestinorum, & lippi-
 tudines oculorum accidunt siccæ: Seniori-
 bus autem, destillationes breui interimen-
 tes.

Hyeme verò humida existente & calida, Vere
 autem frigido ac sicco, mulieres, quibus partus
 incidit in Ver, ex quacunque abortiunt occasione:
 Corpora siquidem humida ac mollia & rara
 reddita per Hyemem tepidam, ad intimas sui
 partes frigiditatem aëris admittunt: itaque qui-
 cunque

cunque infantes longo tempore assueuerunt
aëris tepori, à frigore facile offenduntur, alij qui-
dem in ipso tam utero mortui, alij verò in ipso
partu morituri. Qui verò ex ijs viui in lucem
eduntur, non ferentes subitam ad contrarium
mutationem, vel breui pòst tempore moriuntur,
vel imbecilles & morbofi vix in vita perdurant.
Ceterum alijs seu pituitosis ac mulieribus diffi-
cultates intestinorum ait accidere ex pituita à
capite ad ventrem defluente, qua si salsa est &
veluti biliosa, transeundo affliget, intestinis ha-
rens, ac semper aliquid deterens, propter qualita-
tem faciet intestinorum difficultatem. Lippitudi-
nes autem siccas (sic vocat eas, quae sunt absque
fluxu) par est, in sicca constitutione, calidis & sic-
cis naturis accidere. Caput enim prius repletum
est, & in humida & calida constitutione; frigus
autem superueniens, veluti manus quadam ca-
piens ac premens quandam uti spongiam, cere-
brum, exprimit illam quae in ipso continetur hu-
miditatem: hac verò non effluit extrà, propter
ambientis frigiditatem densantis superficiem ex-
teriorem. Senes autem à destillationibus correpti
in tali constitutione, repenti, ob venarum colli-
quationem, & nervorū dissolutionem, intereunt.
Huc pertinet Problema 9. primae sectionis Aristot.

XIII.

ΗΥ ΔΕ ΤΙ ΤΙΕΘΣ ΑΥΧΥΝΕΘΥ ΚΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΧΩΝΤΑΙ.
Κ. 4.

Ὁ δὲ φθινόπωρον ἔπομβρον καὶ νότον, κεφαλαλ-
γίαι εἰς τὸν χροῖα, αἰεὶ οὐ ταί, καὶ βήχες, καὶ βρογχίτις,
καὶ κέρυφαί, ἐνίοισι δὲ καὶ φθίσεις.

Si Æstas sicca & Aquilonia fuerit, Au-
tumnus verò pluuius admodum, & austrin-
us, dolores capitis Hyeme fiunt, & tusses,
raucitates atq; grauedines: nonnullis etiam
tabes accidit.

Sed si Æstas sicca fuerit & Aquilonia, Au-
tumnus autem humidus & Austrinus, necesse
erit ijs qui naturam habent humidorem, supra
modum repleto capite, hos morbos Hyeme adue-
nire, Hyeme videlicet suscipiente caput a austrinis
pluuijs rep'eta. Si ergo humer in capite constite-
rit, grauitatem comenitrit: sed si ob nimiam sui
copiam concrefcere non potuit, in partes inferio-
res defluit: atque ita iussim & raucedines si in
asperam arteriam: si in nares, grauedines: & ta-
bem, si in pulmones, contrahit. 10. Problemas
prima sectionis apud Aristotelem.

XIV.

Ἦν δὲ βόρειον ἢ καὶ αὐτὸν, τοῖσι μὲν ὑπερῷσι
ἐοδὸς τοῖς φύσιαις, καὶ τῇσι γυναιξὶ ἐν μέρει,
τοῖσι δὲ λοιποῖσιν ὀφθαλμίας ἐσόντων ξηρά, καὶ
πυρετοὶ ὀξείες τε καὶ μακροὶ, ἐνίοισι δὲ καὶ μελαγ-
χολία.

Si

Si verò Autumnus Aquilonius & ficcus fuerit, iis qui natura humidi sunt, & mulieribus confert: reliquis verò lippitudines ficcæ accidunt, & acutæ febres & longæ: Nonnullis verò & melancholiæ.

Autumnus succus & Aquilonius confert ijs qui sunt humido præditi temperamento, exsiccantur enim ab hac constitutione, & exsiccati perueniunt ad Hyemem, aut minus humidi: Biliosus verò talis Autumnus est inimicissimus, quia nimis exsiccantur: bilis enim pars humidissima, atque aquosissima absumitur, crassissima verò & acutissima relinquitur, unde hi & alij morbi contingunt.

XV.

Τὸν δὲ κατὰ τὰς αἰτίας τῆς αἰτίας τοῦ ὅτι μὲν ὅλον οἱ αἰχμὲν τῶν ἐπομβριῶν εἰσὶν ὁ μείνότερος, καὶ ἥσοςον θανάτωδες.

Ex anni constitutionibus (vt in vniuersum dixerim) siccitates imbribus sunt salubriores, & minus mortiferæ.

Sicca constitutio (quod semel dictum sit) salubrior est humida constitutione: nam morbi magna ex parte fiunt à putredine, cui contraria est siccitas, humida siquidem intemperies aëris excrementorum prouentum generat, qui prouentus

est morborum soboles: Siccitas autem & exercitatio non colligunt multa excrementa, aut collecta absumunt.

XVI.

Νοσήματα δὲ ἐν μὲν τῇσιν ἐπομβρίῃσιν ὡς τὰ πολλὰ γίνεται πυρετοὶ τε μακροὶ, καὶ καλῆς φύσεις, καὶ σιμπεδόνες, & ἐπίληπτοι, καὶ ἀπόπληκτοι, καὶ κυκασχοί. ἐν δὲ τοῖσιν αὐχμηροῖσι, φθινώδεις, ὀφθαλμικά, δὲ σπρίπδες, σπασμωδία, & δυσεντερίαι.

Morbi per affiduos imbres magna ex parte fiunt, febres longæ, alui deiectiones, putredines, comitiales morbi, apoplexiæ & angina. Per siccitates autem tabes, lippitudines, articulorum dolores, stillicidia urinæ, & difficultates intestinorum.

Febres quidem longas fieri ex multitudine humiditatis, minimè mirum, siquidem agroti ad morborum solutionem egent coctione, plures autem humiditates, non nisi in longo tempore concoqui possunt. Neque extra rationem est, quòd alui profluvia in temporibus pluviosis eueniant, quum humorum superabundantia per aluum expurgetur, sicuti etiam quòd eisdem temporibus putredines fiant; quoniam perspicuum est humida siccis magis esse obnoxia putredini. Morbi autem comitiales, ex pituita ortum habent. Et angina fit superfluitatum multitudine ad fauces collectarum, fit etiam

fit etiam magna ex parte fluxionibus ex capite firmatis in faucibus. In humida constitutione alij etiam morbi ab Hippocrate non commemorati, nasci possunt. In sicca verò constitutione, licet avara sit salubrior, in ea tamen proprij erunt morbi, naturam constitutionis sequentes, morbi tabem afferentes, absque tamen pulmonis exulceratione, que in siccior tempore potius curetur quàm irriteretur. Lippitudines sicce, articulorum dolores, ij, qui ex humorum acrimonia ad articulos decumbente, procreantur, cum caliditas immodica accesserit. Urina stillicidia fiunt propter acrimoniam urine & facultatis reentricis imbecillitatem. Difficultas autem intestinorum non simpliciter ad siccitates consequitur, sed ad ingentes siccitates, & in naturis idpati idoneis.

XVII.

Αἱ δὲ καὶ ἡμέτεροι κατὰστάσεις, αἱ μὲν βόρειοι
 εἴτε σώματα στυγεῖται, καὶ δὲ τὸνα, καὶ δὲ κύνητα, &
 δὲ χροα, καὶ δὲ ημεώτερα ποιεῖται, & εἴτε καὶ λίαν ξη-
 ραίνονται, & εἴτε ὁρμηται δαίνονται, καὶ εἴτε τὸν τῶρηκα
 ἀλγήμεν, καὶ πᾶσι παρρη, μάλλον πονέσιν. αἱ δὲ
 νότοι δὲ γὰρ εἴτε σώματα καὶ ὑγραίνονται, καὶ βα-
 ρηκοῖα, καὶ ῥηθεῖα ποιεῖται, καὶ ἰλίχθες ἐν εἴσιν
 ὀφθαλμοῖσι, καὶ τοῖσι σώμασι δυσκίνησι, καὶ εἴτε
 καὶ λίαν ὑγραίνονται.

Constitutionum que quotidie fiunt, a qui-

Ionix quidem corpora cogunt, robustiora reddunt, facile mobilia, bene colorata, & rectius audientia. Aluos præterea exsiccant, oculos mordent: & si thoracis dolor aliquis præcedit, magis irritatur. Austrinæ verò, corpora languida efficiunt & humectant, difficilem auditum, capitis gravitatem & vertiginem afferunt, oculis atque corporibus difficilem motum præstant, & aluos humectant.

Constitutiones quotidiana, aquilonia quidem frigida sicca, corpora densant & firman suā frigiditate: eadem mobilia reddunt, quod superfluas corporis humiditates exhauriant: Coloratiora, quod actiones naturales, & probam sanguinis in iecore elaborationem adiuuent: melius audientia faciunt, facultate animali tum bene valent. Ceterum auditus nomine reliquos vult intelligi sensus, qui omnes hæc tempore vigent: Aluos exsiccant ut totum corpus: Oculos mordent, non erodendo, sed duellendo continuum. Pectoris dolores excitant, quia frigidum inimicum est pectori ut faucibus. Austrina verò constitutiones humide, calida, corpora dissolunt & humectant, auditum obtundunt, & caput aggrauant, ipsum opprimentes humiditate nimia, à qua & paucā caliditate vertigines sunt: Oculis

Et corporibus difficilem motum præstant, nimirum humectato nervorum principio, cerebro scilicet, circa voluntarios motus, pigritiam apparet, necesse est: Ab eadem humiditate, alios movent & lubricant: De vertiginibus autem quid dicere oportet? utrote quæ sunt proxima morbis comitialibus, & ijs quos apoplexias nominant. Vertigo enim est velut obtenebratio, quæ fit, humoribus, cum crasso vapore per caput moro: Et præcedit epilepsiam & apoplexiam.

XVIII.

Κατὰ δὲ τὰς ἄρτας, ἔρδ' ἡρεῖς καὶ ἀκροῦ ἔρδεσθαι, οἱ παῖδες, καὶ οἱ τετάρτοι ἐχρόμιοι τῆσιν ἡλικίῃσιν ἀριστά τε ἀφ' ἧς καὶ ὀφθαλμοὶ μέλιστα. ἔρδ' ἡρεῖς ἔρδ' φθινοπώρῃς μέλιστα καὶ ἡνῶ οἱ γέροντες. ἔρδ' λοιπὸν φθινοπώρῃς καὶ ἔρδ' ἡμερῶν, οἱ μέσσοι τῆσιν ἡλικίῃσιν.

Per tempora anni, Vere quidem, & principio Æstatis, pueri, & qui eos ætate mox sequuntur, optimè degunt, maximèq; valent: Æstate autem & Autumno aliquantisper senes: per reliquum autem Autumnum & Hyemem, qui mediam ætatem habent.

Naturis, ætatibus, & regionibus benè temperatis, optimum tempus quod optimam habet temperiem, cum non egeat habitus sui permuta-

tionem, sed conseruatione: Rerum enim unaquaq;
à similibus quidem conseruatur, à contrarijs au-
tem transmutatur. Quare pueri & adolescentes
Vere, & Æstatis principio optimè degunt. Senibus
verò utilissima est Æstas, à qua frigiditas eo-
rum contemperatur: Sicuti ijs qui in atatis vigo-
re consistunt, Hyems maximè confert, hac enim
contraria est biliose eorum intemperatura. Itaq;
naturarum biliosiores quidem, Hyeme optimè
degunt: Pituitosiores autem Æstate: benè autem
temperata, Vere.

X I X.

Νοσήματα ὅ πάντα, ἐν πάσῃσι τῇσιν ὥρῃσι γί-
νεται, μᾶλλον δ' ἐν ταύτῃ ἐν ἡμέρᾳ αὐτῶν καὶ γίνε-
ται παρὰ τὴν φύσιν.

Morbi quidem omnis generis in omnibus
temporibus fiunt, nonnulli tamen in qui-
busdam illorum magis & oriuntur & irri-
tantur.

Licet omnibus temporibus omnes morbi fieri
possint, ob errata quæ in viuendi ratione contin-
gunt, aut ob ambientis variam temperaturam,
cuius attrahione viuimus: Quibusdam tamen
temporibus quosdam morbos fieri magis accidit,
propter affinitatem quam cum illis temporibus
habent. Non parum autem ad hoc confert etiam
naturarum differentia, neque enim similiter ab
eadem

eadem causa calidum corpus & frigidum, humi-
dum & siccum offendi aptum est. Nam quamvis
aër pestilens agat in omnes absque discrimine,
non omnes tamenprehenduntur peste, quia agens
non agit, nisi in passum dispositum. Aër quidem
habet magnum momentum ad generationem
morborum, sed concurrunt alia multa, ut vicius
ratio, natura, dispositio, consuetudo, &c.

X X.

Τοῦ μὲν γὰρ ἥρετος τοῦ μανικῆς καὶ τοῦ μελαγχολικῆς,
καὶ τοῦ ἐπιληπτικῆς, καὶ αἱμορροϊκῆς, καὶ κινώδους,
καὶ κόρυζας, καὶ βρογχίτιδος, καὶ βήχους, καὶ λήπτης, καὶ
λειχῶδους, καὶ ἀλφειῶν, καὶ ἐξανθήσεων ἐλκώδους
παλῆων, καὶ φύμγων, καὶ δερματίτιδος.

Vere quidem furores, melancholiæ, mor-
bi comitiales, sanguinis profusiones, angine,
grauedines, raucedines, lepræ, tussis, impe-
tiginis, vitiliginis, pustulæ ulcerosæ pluri-
mæ, tubercula & articulorum dolores acci-
dunt.

Tempora constantia dicuntur, cum suam pro-
prium seruant temperaturam: hincq; annus con-
stans, cum tempora, in qua distributus est, à sua
propria temperatura non discedunt, & sunt qua-
tuor: Ver humidum & calidum dicitur, aut po-
tius temperatum & salubre, ac morbis
qui mortem afferant minime obnoxium, in quo

tamen morbi purissimi sunt, non ob eius temperaturam, quæ bona est, sed id quod in verno tempore corpora rara & laxa sunt, humoresque vitiosi, qui in profundo corporis latebant, veluti sopiti, excitantur, & ab intimis ad externa expelluntur, unde furor, atra bilis, impetigines, vitiligines, pustulae &c. Quos melius est apparere, quod est opus naturæ vincentis, quàm intus delitescere ad maiorem perniciem.

XXI.

Τοῦ δὲ ἡμέτερου ἐνιά τε τεταμένων, καὶ πυρετοὶ ξυνεχέες, καὶ καύσοι, καὶ τεταῖοι τοῦ ὕδατος, καὶ τεταῖοι, καὶ ἐμετοί, καὶ διάρροια, καὶ ὀφθαλμιαί, & ὡς πόντοι, καὶ σμύτων ἐλκώσιες, καὶ σπηδόνες αἰδοίων καὶ ἰδρώα.

Æstate autem aliqui ex iis, & febres continuæ, & ardentes, & tertianæ plurimæ, & quartanæ, & vomitiones, & alii profusiva, lippitudines, aurium dolores, oris exulcerationes, genitalium putredines, & sudores accidunt.

XXII.

Τοῦ δὲ φθινοπώρου, καὶ τοῦ χειμῶνος ἐπολλὰς, καὶ πυρετοὶ τεταῖοι, καὶ πλεονήτες, & πλεονήτες, καὶ ἰδρώπες, καὶ φθίσιες, καὶ τραχείαι, & λειντερίαι,

είας, καὶ δυσεντερίας, καὶ ἰσχυράδες, ἔκκρωσται, καὶ
ἀσθμαί, καὶ εἰλεοί, καὶ ἐπιληψία, ἔκκρισις, καὶ
τὸ μὲν αἵματι.

Autumno verò plurimi æstiuī morbi fiunt,
& febres quartanæ, atque erraticæ, lienes
magni, aquæ inter cutem, tabes, vrinæ stilli-
cidia, leuitates & difficultates intestinorum,
coxæ dolores, anginæ, asthmata, ilei, morbi
comitiales, furores & melancholiæ.

XXIII.

Τὸ δὲ χειμῶν, πλὴν εἰπιδες, πνευμονίαι,
λήθαργι, κέρυζαι, βρογχί, βήχες, πόνοι στήθεων, καὶ
πλευρίων, ἔκσφύ, καὶ κεφαλαλγία, ἑλκῆ, καὶ
ἀπὸ πλῆξις.

Hyeme, pleuritides, pulmonis inflamma-
tiones, lethargi, grauedines, raucedines,
tusses, dolores pectoris, laterum, lumbo-
rum, & capitis vertigines, & apoplexiæ.

Æstas autem, Autumnus & Hyems, ut Ver,
licet in multis communionem habeant, unicuique
tamen illorum temporum proprii morbi magis
excitantur, qui nimirum sunt illis temperatura
proximi.

XXIV.

Εν δὲ τῇσιν ἡλικίῃσι τριάδε συμβαίνει, τοῖσι μὲν
σμικροῖσι καὶ νεογνοῖσι παροῦσιν, ἄσθμα, ἔκκρισις

βήχες, ἀρρυθμίαι, φόβοι, ὀμφαλοὶ φλεγμοναί,
ὧτων ὕψότητες.

Per ætates hæc accidunt, paruis quidem
& recens natis puerulis, oris vlcera, vomi-
tiones, tusses, vigiliæ, pauores, vmbilici in-
flammationes, aurium humiditates.

Qui morbi sunt in ætatibus hîc ordine recen-
set. Paruis, inquit, & nuper natis, oris vlcera con-
tingunt ob instrumentorum molliem, quæ neq;
tactum, neque lactis sustinent qualitatem, quod
non parvam in se serosam continet partem: Hæc
autem pars vim habet abstergerendi. Quare non
mirum si in corporibus mollibus, quædam super-
ficiarias facit exulcerationes. Vomitus, ob lactis
abundantiam. Tusses autem facile, propter cere-
bri humiditatem, ad pulmonem, asperamq; arte-
riam defluentem accidunt. Vigiliæ verò haud-
quaquam ipsis sunt assuetæ, ut qui maiori parte
temporis dormiant, nisi fortè ob ipsum morbum
fieri infantibus vigiliæ opinetur, siquidem somni
abundantia ipsis maximè secundum naturam
inest. Pauores etiam per somnum infantibus ad-
sunt, ob alimenti in ventriculo corruptionem,
vnde nidor elatus terribilia somnia excitat. Ac-
cedit quòd nuper ex utero prodeuntes pueruli aë-
ris eos ambientis transmutationem reformidan-
tes, ad quemvis occursum facile perterrentur,
pre-

praeserim à somno. Umbilicis autem paulò antè
præcisus, inflammationes contingunt, non alia
ratione quàm alijs partibus abscissis. Aurium
quoque humiditates morbis annumerat, siqui-
dem à natura aliena est expurgatio per aures,
quæ tamen puerulis euenit, ob corporis totius, atq;
adeo capitis superfluum humiditatem.

XXV.

Περὶ δὲ τὸ ὀδοντοφυεῖν παροξύνουσιν, ἔλων
ἐδαξισμοί, πυρετοί, παασμοί, ἀγέροια, καὶ μέλι-
σι ὅταν ἀνάγῃσι τοὺς κινώδοντες, ἔ τοῖσι παχυτά-
τοισι τῶν παιδῶν, καὶ τοῖσι σκληροῖς τοῖς καλῶς ἔ-
χουσιν.

His qui ad dentitionis tempus accedunt,
gingivarum pruritus fiunt, febres, conuul-
siones, alui profluvia, maximè cùm caninos
edunt, & iis pueris qui crassissimi sunt, & al-
uos duras habent.

Pueris, cùm dentire incipiunt, gingivæ cum do-
lore pruriant, quòd dentes prodeant, & tanquam
stimuli perforati gingivis infigantur. Febres ac-
cidunt propter dolores, vigilias, & inflammatio-
nes. Conuulsiones autem cùm propter hæc, tum
propter crudum alimentum, & quia nervosæ
partes nondum satis validæ sunt. Ad hæc omnia
etiam ex necessitate ventris profluvia consequun-
tur, quoniam alimentum non benè coquitur, neq;

distribuiuntur: & maximè cum caninos edunt dentes, qui quoniam tardiùs exeunt, maiorem ob id inferunt dolorem, quòd gingiua facta sint sicciores & duriores, alioqui minùs laderent, quia cum sint acutiores, minorem faciunt solutionem continui: Qua etiam ratione incisores exeunt faciliùs, & minore cum dolore, licet sint latiores, propterea quòd cutis adhuc mollis est & obediens cum erumpunt: Sed maximè dolent gingiua subnascentibus molaribus. Pueris autem, (praesertim qui crassissimi sunt, & alios duras habent) saepius accidunt superiores morbi, & potissimum conpulsiones, ob plenitudinem & superfluitatum abundantiam.

XXVI.

Πρεσβυτέροις δὲ ῥωμδύοις παθήματα, σφονδύλες & τὸ ἰνίον εἶναι ὥστες, ἄσκαρτες, λιθάστες, ἑλμινθες, σπονδυλαί, ἀσκαρίδες, ἀκροχρόδονες, σατυριασμοί, τραχηλαί, χιρῆδες, καὶ τὰ ἄλλα φύματα, μέλιστα τὸ περὶ τὴν κνήμην.

Vbi ætate paulum processerint, tonsillæ, vertebræ (quæ in occipitio est) ad interiora luxationes, asthmata, calculi, lumbrici, rotundi, ascarides, verrucæ peniles, satyriasmus, strumæ, & alia tubercula, præcipue verò antedicta.

Pueris paulò aduolioribus sunt tonsillæ: tonsilla

silla verò seu paristhmia sunt inflammationes
 parvis quæ os & gulam interiacet: Vertebra eius
 luxatio quæ ad occipitium est, parit anginam.
 Asthma, seu creber anhelitus, fit propter angus-
 tiam asperæ arteriæ, oppletis respirationis instru-
 mentis ab his quæ desuper fiunt fluxionibus.
 Causa efficiens calculi est caliditas; causa mate-
 rialis, est multa pituita cum viarum angustia:
 in pueris utraque est causa, qui ob edacitatem
 non paucos crudos humores coaceruant, ex qui-
 bus pars crassior, unâ cum urinis ad vesicam per-
 ueniens, generandi lapidis fit materia, quæ re-
 tenta diu propter crassitiem, à caliditate tandem
 durefcit in formatum lapidem. Lumbrici teretes
 longi sunt, lati verò cucurbitini, ut semen cucur-
 bitæ, quos tamen Galenus dicit longissimos hoc
 sensu, i. longa serie & congerie sese complexos. A-
 scarides tenues ac breues, similes vermibus. Om-
 nium autem lumbricorū origo est ex cruda, cras-
 sa pituita, aq. materia, & putredini a comoda,
 qualis in pueris & voracibus colligitur maximè.
 Verruca & struma sunt seboles vitiosi sanguinis
 ad exteriora & cutem repentis, nam putres in
 corpore humores cum foras pelluntur (robusta
 existente potentia) verrucas excitant pensiles, aut
 myrmecias latentes, satyriasmos, stumas, scro-
 phulas, & alia phymata à materia frigida & pi-
 tuitosa.

Τοῖσι δ' ἐπὶ πρεσβυτέροισι καὶ πρὸς τὴν ἡλικίαν
πρεσβύτουσι, βυτέων τε καὶ πολλὰ, καὶ πυρετοὶ χρό-
νιοι μᾶλλον, ἢ ἐν ῥιναὶν αἵματος ῥύσεις.

Grandioribus autem, & ad pubertatem
accedentibus, præcedentium ætatum multi
accident morbi, & febres magis diuturnæ, &
sanguinis è naribus profluvia.

*Pubescentes superioribus etiam morbis obnoxij,
propter similitudinem temperaturæ: sæpius inci-
dunt in febres diuturnas, nam in hac ætate plus
est materia, unde febres procreari possunt, & quia
sanguis incipit superabundare in corpore durius-
culo, ex quo per cutim paucum quiddam dissipa-
tur, & minus quàm priore in augmentum absu-
mitur, profluvia sanguinis è naribus patiuntur.*

Τὰ δὲ πλεῖστα τοῖσι παιδοῖσι πάθηα κέινεται,
καὶ μὴ ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησι, καὶ δὲ ἐν ἐπὶ
μηνσὶ, καὶ δὲ ἐν ἐπὶ ἔτεσι, καὶ δὲ πρὸς τὴν ἡλικίαν
πρεσβύτουσιν. ὅσα δ' αὖ ἀφ' αἵματός τινος παιδοῖσι
καὶ μὴ ἀπολυθῇ πρὶν τὸ ἡβᾶσκειν, ἢ τῇσι θήλεσι
πρὶν τῇσὶ κατὰ μὲν ῥήξιας, χρόνιζεν εἶωθεν.

Plurimi verò morbi puerulis iudicantur,
hi quidem in quadraginta diebus, illi verò
in septem mensibus, aliqui in septem annis.
non.

nulli quum ad pubertatem accedunt. Quicunque autem puerulis perdurarint, nec prope pubertatem defierint, aut fœminis quum menstrua eruperint, hi consenescere consueuerunt.

Plurimi morbi diuturni ijs, qui in tribus aetatibus predictis, constituti sunt, iudicantur, & terminantur: (perfecta enim iudicatio est qua morbum soluerit) nonnulli quidem in 40. diebus, quadragesimus enim dies primus est iudicatorius morborum diuturnorum, & ultimus acutorum ex decidentia. Nonnulli in septem mensibus, ut asthmata, quartana febres: qui verò hunc transcendunt numerum, secundum septenarij quidem rationem habent iudicium, verum non diebus tantum enumeratis, sed mensibus primùm deinde annis iudicantur, ut manifestum sit alios ad septimum annum, alios autem ad decimum etiam quartum annum peruenire, cuiusmodi est morbus comitialis, qui multis in pubertate iudicatur, quo tempore magna sunt corporis mutationes, in fœminis maximè propter menstruorum eruptionem. Quare si qui morbi, ne hac quidem etate finiuntur, usque ad longum tempus perdurare consueuerunt.

XXIX.

Τοῖσι δὲ νεωτέροις, αἵ μὲν τὸς ἑπτά, φ. 2.

L 4

πυρετοὶ ὄξεις, ἐπιληψία, καὶ τ' ἄλλα νεότη-
τατε, μάλιστα ὅτε περὶ περιηδύα.

Iuuenibus autem sanguinis spuitiones,
tabes, febres acutæ, morbi comitiales, & alij
morbi, & præcipuè antè dicti, accidunt.

Ex alijs ætatibus de quibus meminit, licet
conijcere de adolescentia, quæ in multis quidem
communicat cum illis quæ ex utraque ipsam cir-
cunstant: quapropter eam hic prætermisi: iue-
nes autem non secundum naturam ætatis pa-
tiuntur sputum sanguinis, sed ob incontinen-
tiam. Ad sputum verò sanguinis tabes consequi-
tur. Corripiuntur & febribus biliosis, quia fluxa
bilis hac ipsa superabundat ætate. Comitialis
morbus non est huic ætati familiaris, quæ calida
est, morbus autem frigidus humidus, nisi dicatur
accidere ob victus errorem.

XXX.

Τοῖσι δὲ ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν ζώοντι ἀσθματε,
πλὴν ἐρίπιδες, πνευμονίαι, λήθαργοι, φρενίτι-
δες, καύσοι, ἀγέρροισι χρόνιαι, χολέραι, δυσεντε-
ρίαι, λευιεντερίαι, αἱμορροΐδες.

Qui hanc ætatem excefferint, his asth-
mata, pleuritides, pulmonis inflammatio-
nes, lethargi, phrenitides, ardentes febres,
diuturna alui profluvia, cholæræ, difficulta-
tes intestinorum, leuitatesque eorundem,
& hæmorrhoides accidunt.

Le-

Lethargi, hæmorrhoides, leuitates intestino-
rum à pituita, ut alij morbi frigidi & melan-
cholici, proprij quidem sunt ætatis declinantis.
Ceteri verò, aut ab immoderata victus ratione
proveniunt, aut magis à iuuentute differantur
ad ætatem declinantem: nam, ut dicitur à Tul-
lio, intemperanter acta iuuentus effœciat corpus
reddit senectuti.

XXXI.

Τοῖσι δὲ πρεσβύτησι, δύσπνοια, κατάρροι βη-
χίδες, πρᾶξις, δύσουρία, δόρπον πόνοι, νε-
φελίδες, ἰλιχοί, ἀποπληξία, καχεξία, ξυσμῆς
ἡ σπῆλαιος ὄλες, ἀρευνία, κριθίνης καὶ ὀφθαλμοῦ,
καὶ ῥινῶν ὑπερόχτες, ἀμβλυωπία, γλαυκασίς,
βαρυηχοία.

Senibus accidunt spirandi difficultates,
distillationes tussim afferentes, stillicidia v-
rinæ, difficultates urinae, articulorum dolo-
res, renum mala, vertigines, apoplexie, mali
habitus, pruritus vniuersi corporis, vigilie,
ventris, oculorum, & narium humiditates,
hebetudines oculorum, glaucedines, & gra-
ues auditus.

Senibus spirandi difficultates accidunt propter
humoris pituitosi in thoracem defluxum. Distil-
lationes tussim afferentes, quoniam partes ad ca-
put attinentes in ipsis facillimè refrigerantur: &

cum frigidam cerebri temperaturam habeant, ideo multa colliguntur pituitosa superfluitates, quæ renes & meatus urinarios obstruentes, aliquando difficultatem urinae, aliquando frigidam inducentes intemperiem (quam facultatis imbecillitas consequitur) stillicidium urinae generant. Articulorum autem dolores sunt, fluentibus ad hæc loca superfluitatibus: vertigines, propter spiritum vaporosum, qui in partibus cerebri inordinato cietur motu: Apoplexia, nullus est morbus adeo senili ætati familiaris, quoniam in ea cerebrum pituitosis repletur superfluitatibus, quæ ventriculos eius opplentes, faciunt morbum hunc inducunt. Mali habitus, nam alimentum non concoquitur, & quod distribuitur impurum est; unde etiam pruritus à superfluitatibus, quæ difficilem habent per cutem euacuationem. Vigilia, quia senectus plena curarum est, & senibus non planè morbosus siccum est natura corpus. Humiditates autem in ipsis oculorum & narium liquet fieri propter cerebri superfluitates, quibus ad aluum defluentibus ipsa etiam sapius humectatur. Hebetes autem visus & auditus graues accidunt, ob imbecillitatem potentie sensitivæ. Glaucedines verò, propter immodicam instrumentorum siccitatem, & quia speciem habent suffusionis à concretionem crystallini humoris in oculis.

APHOR.

APHORISMORVM

HIPPOCRATIS

Sectio IV.

APH. I.

TAς κύστας φαρμακεύειν ἐν τῷ ὄργῳ, περὶ μέλαινα καὶ ἄχρη ἐπὶ τὰ μέλαινα, ὅσον ὃ γυνῆς. καὶ ὃ νήπια, ὅτι περισσύτερον δὲ λαβέειν ἔχει.

Vtero gerentes sunt medicandæ, si materia turget, quarto mense, & usque ad septimum, sed hæc minus. A iunore autem foetu & seniore abstinere oportet.

Fœtus eandem proportionem habent cum vtero, quam fructus cum arboribus: hi siquidem in prima generatione debilioribus pediculis continentur, & ideo faciliè decidunt, quando vehementior ventus ipsos concusserit. postea verò adulti difficilem habent ab arboribus dissolutionem: sicuti rursus cùm perfecti sunt, sponte sua sine vi extrinseca decidunt. Eodem modo & conceptus: in primo quidem tempore quo semen nuper iniectum est, si aliquando saltare contigerit mulierem, aut in lubrico cadere, siue quovis alio modo, vel secundum animam, vel secundum corpus

moueri vehementius, facile dirumpuntur: sic & quando iam perfecti sunt: tempore verò intermedio ligamenta habent robustiora: quare mulier utero gerens, potest fortiores motus sustinere sine foetus offensione. Quae omnia Hippocrates noscens recte inquit: Vtero gerentes sunt medicanda, si materia turget, quarto mense & usque ad septimum, quod est tempus medium foetura, cum foetus utero firmiter alligatur. Non tamen omnes quae hoc tempore indigent purgatione, permittit purgari, sed si materia turget, inquit, hoc est, urget & cogit accelerare. Tractum enim vocabulum est ab animalibus ad coitum incitatis. Nam cum superabundantes humores mouentur, & per totum corpus feruntur, nondum in aliqua parte firmati, tunc ad eos expellendos natura incitatur, & aliquo indiget manu porrigente, & hunc humorum motum ad a'uum deducente. Eos verò qui aliqua in parte firmati sunt humores, non oportet mouere. Sic enim dictum est ab Hippocrate: Quicunque inflammationes, in morborum principio, medicamento conantur soluere, nihil de eo detrahunt quod acervatum est & inflammatum, (neque enim morbus, cum crudus sit, cedit:) quae verò sana sunt, & morbo resistunt, absument coxtabefaciuntq;. Quod autem dixit, à iuvene foetu & seniore oportet abstinere, eo voluit intelligi, quae quarium mensem im-
pragna-

prægnationis nondum attigerunt, aut ad septimum usque progressæ sunt, eas non esse medicandas medicinis purgantibus. Verum Hippocratus & Galeni sæculo, maiore purgabant religione, quia valentiora tantum medicamenta nouerant, cuius generis sunt Helleborus, Colocynthis, Scammonium, Turpetum, Hermodactylus, & alia huiusmodi. Nobis autem sunt clementissima medicamenta, quibus uti possumus ipsa re exigente, etiam ante quartum mensem, ut Cassia, Manna, Rhabarbarum, Tamarindum, confectio Catholici, &c. licet post quartum mensem tutius his utamur. Ut demus ante quartum mensem & post septimum, prægnantes acuto aliquo morbo correptas offendi à medicamento quod suadente necessitate datum est, tamen præstat ista ratione ladi utrunque, matrem scilicet & foetum. quàm ut nullo prorsus dato, & matrem & foetum de vita periclitari patiamur.

I I.

Εν τῇσι φαρμακείοις τὰ αὐτὰ ἄρχον ἐκ τοῦ σώματος ὁμοῖα καὶ αὐτὸν γὰρ ἰόντι χεῖρισται. τὰ δὲ ἐναντίας ἰόντι πῶς εἰν.

In medicationibus talia educere è corpore qualia sponte prodeunt, utile: Quæ verò contrario modo prodeunt, cohibere oportet.

Cum medicus in artis operibus ea, quæ benè à natura sunt imitari debeat, hoc unicè curabit, ut in singulis morbis tales vacuet humores, quales in vacuationibus spontinis utiliter euacuantur à natura. Quod uia fieri, factum ve esse, indicio est facilitas tolerantia. Si ve d fiat eorum euacuatio, quæ natura non utiliter educeret, ea maturè cohibenda est, utpote quæ non iuuet a-
grotum, sed offendat.

I I I.

Ἡν μὲν οἷα δ' εἰ καὶ ἴσμεν, καὶ ἴσμεν, ἔμπε-
φύει τε καὶ οὐ φέρει φέρει. Ἡ δ' ἐν αὐτῇ,
δύσκολος.

Si qualia oportet purgari, purgentur, confert & facile ferunt: si contra, difficul-
ter.

Hic Aphorismus est idem cum ultimo prime
sectionis.

I V.

Θάπτεται δ' ἐν. ἴσμεν ὅτι μὲν καὶ τὰς αὐτὰς κα-
τασκευάζει, καὶ τὰς κατὰ.

Medicari Æstate superiores magis, Hyeme verò inferiores.

Iubet tamen Hippocrates, lib. de ratione victus
privatorum, æstate reuelli bilem flauam ad infe-
riora: Et idem habet Galenus in commentario.

Dicen-

Dicendum, quod hic loquutus est de vniuersali purgatione totius corporis: nam si velit quis purgare totum corpus bile, & sit Aestas, conuenientius id fiet vomitu: bilis enim propter sui lenitatem, & propter ambientem caliditatem, ad superiora magis mouetur. Qualibet autem superfluitas eo quod vergit, ducenda, per loca conuenientia: Si verò opus est particulari purgatione ventris, & intestinorum tantum, commodius id fiet deiectione per inferiora, quam praesertim enemata perficiunt. In summa, quae in praesenti abundant, ijs medebris purgatione, ut tamen per loca quod vergunt purgationem instituas: at quibus ne augeantur velis obistere per opposita reuellere debes, Aestate & Hyeme naturas suas seruantibus: Aestate quidem bilis abundat, Hyeme verò pituita. Quapropter nemò Aestate per vomitum, Hyeme autem per aluum magis vacuandum est, cum bilis, ob tenuitatem suam, feratur sursum; pituita verò, ob grauitatem, deorsum deturbetur.

V.

Ἰνδὲ κύνεα καὶ ἀντὶ κύνος, ἐπιπλάττειται φαρμακείαι.

Sub Canem & ante Canem difficiles sunt medicationes.

Medicationes, hoc est, per medicamentum purgationes, & omnes alia magna, & insignes ena-

cuationes, quomodocunque fiant, molesta sunt, graues, & noxia omni astu magno: nam multi purgati hoc tempore incidunt in febres, & natura, ex astu imbecillis, magis ex purgatione dissoluitur: praua etiam hoc nomine est purgatio, quod calor ambientis in partem trahat extrinsecam, contrariam ei ad quam medicina ducit humores. Medicamentis tamen benignè & leniter purgantibus (qualia non fuerunt tempore Hippocratis) uti possumus, si visum ita fuerit, & res exigat.

V I.

Τὸς ἰσχυροῖς καὶ δυνατοῖς αἰὲν φαρμακεῖν, ὡς ἐκδορμῆς χειμῶνα.

Graciles & facile vomentes purgare superius, cauentes Hyemem.

Magna ex parte graciles sunt biliosi. Si igitur hoc accesserit, ut sint ad vomendum faciles, per superiora purgandi sunt, nisi obsistat Hyems: nam purgamus Hyeme saepius per inferiora.

V I I.

Τὸς δὲ δυνατοῖς καὶ μέσως σώματος καὶ τοῖς ὡς ἐκδορμῆς θέρος.

Vomentes verò difficulter, & mediocriter carnosos, per inferiora, cauentes Aestatem,

Qui

Qui mediocriter carnosī non faciliē vomunt,
non sunt cogendi ut vomant, ne vas aliquod
rumpatur in pulmonibus: sed purgandi sunt per
inferiora, nisi impediāt Aestas: hoc enim tempus
per superiora purgationem magis requirit.

VIII.

Τὰς ὃ φθινώδεις, ὑποσημοδύες τὰς αὐτ.

Tabidos, per inferiora, cauentes supe-
riora.

Phthisi obnoxios purgamus deiectione, nec ad
supernas per vomituum purgationes unquā dū-
cimur, veriti scilicet instrumentorum quae respi-
rationi inserviunt imbecillitatem: Et ne pulmo-
nis ulcera, propter commotionem illam quam vo-
mitus excitat, irriterentur.

IX.

Τὰς ὃ μολιχολικὸν ἀδρoπέρως τὰς κατὰ τὰ
αὐτὰ λογισμὰς τ' αὐτὰ πρὸς τὴν φύσιν.

Melancholicos verò plenius per inferiora,
eadem ratione contraria apponentes.

Bilis, quia repit sursum, purganda est vomitu.
Quia humor melancholicus grauis tendit deor-
sum, per inferiora, valentiore medicamento pur-
gandus est deiectione, ut quò vergit uterque hu-
mor, eò per loca conuenientia ducatur.

M

Φαρμακθεῖν ἐν τρίτῃ λήλῳ ὁξέσιν, καὶ ὀργᾷ,
αὐθιμερὲν· χρονίζειν δ' ἐν τρίτῃ τρίετοισι κακόν.

Medicari in valde acutis, si materia tur-
get, eadem die: tardare enim in talibus ma-
lum est.

In morbis peracutis, qui statim circa primos
dies in summo vigore sunt futuri, utendum est
initio medicamento purgante, si materia turget:
nam in eiusmodi morbis malum est cunctari, ne
scilicet robur dissolvatur, febris caliditas augea-
tur, aut ad aliquod membrum principale decum-
bant ij qui per corpus vagantur humores, &
mortem repentinam inducant.

X I.

Οκτώσσι σφόδροι καὶ περὶ τὸν ὀμφαλὸν πόνοι,
ἐστὶ φύσθ' ἀλγῆμα μὴ λυόμενον μήτε ὑπὸ φαρ-
μακείης, μητ' ἄλλως, εἰς ὕδρωπα ξηρὸν ἰσχύεται.

Quibus adsunt tormina, & circa umbili-
cum labores, & lumborum dolor, qui neq;
à medicamento, neque aliter soluitur, Hy-
drops siccus contrahitur.

Tormina fiunt & propter morsum vehemen-
tem, & spiritum flatuosum, qui non habet exi-
tum, sed in intestinorum inuolucris est interce-
ptus. Quod verò dolores ad tales dispositiones
confe-

consequantur, nemini dubium. At cum circa umbilicum ac lumbos se firmaverint, neque à medicamentis sumptis, admotis, iniectis, purgantibus, digerentibus, anodynis, neque alijs solvantur auxilijs, quadam est earum parium habitualis intemperies, qua magna ex parte perseverans in Hydropem transit qui tympanias appellatur, ab eo videlicet, quod imus venter percussus talem sonum edit qualem tympana. Hippocrates nominavit hoc morbi genus, Hydropem, à tumoris similitudine, non tamen humidi tumoris, ut ascitem. In tympania est tumor à flatulento spiritu, in ascite ab humoris aquosi copia. Videtur autem à maiori frigiditate generari aquosus Hydrops, quem ascitem vocant, quoniam velut in vitre quodam in peritonaio humor continetur: à minori autem tympanias. Neque enim humida substantia in flatuosum aërem sine calore aliquo potest transmutari.

XII.

Οἱ ὅσοισι καὶ λίαν λεῖν τε αἰώδεες, καὶ μάλιστὰ
φαρμακὸν εἰν αἰῶν, καὶ ἄν.

Quorum alui intestinorum leuitate laborant, hyberno tempore per superiora purgari, malum.

Lienteria causa, imbecillitas facultatis retin-

trici ventriculi aut intestinorum est, aut distillatio multa pituita, qua velut oblita sunt tunica ventriculi unde lubrica sunt. Fit interdum & leuitas intestinorum ex aliqua exulceratione cuius humor acris & tenuis est causa: hic, etsi per superiora purgari debet, quoniam huiusmodi humores magis fluere soleant, quam ad inferiora secedere, non tamen hoc Hyeme faciendum est, sicuti etiam superius est dictum. Pituitosus vero humor quando adhaerit intestinis, nunquam est per superiora purgandus, hoc est, per medicinam vomitoriam. Sola enim euoni natura apta sunt, quae in ventriculo continentur: eorum vero quae continentur in intestinis, nihil potest per vomitum euacuari.

XIII.

Ποῦς τοῦς ἐμμετέουσιν τοῖσι μὴ ῥηϊδίως αἰῶν
καταγεγνημένοι, ἀπὸ τῆς πόσις καὶ ἀπορροῆς τοῦ
σώματος πλεονεξοῦντες ἀσθενεῖ, καὶ ἀναπαύσθαι.

Qui non facile per superiora purgantur, ad veratrum admittendi sunt pleniore cibo & quiete corporibus ante potionem humectatis.

Qui non de facili per superiora purgari videatur, non oportet huiusmodi hominem ad helleborum ducere antequam praeparetur: hoc autem fiet, si per continuos vomitus assuescat is qui sumpturus est helleborum, ad promptè vomendum:

Quod

Quod melius procedet prius humectando corpora: humectabuntur autem plurimo alimento atque quæ etc. Nam hellebore sumptio periculum convulsionis afferret ijs quibus nervi sunt aliæque corporis partes exiccata.

XIV.

Ἐπὶ πῇ ἡς ἐκδέσθον πρὸς μὲν τὰς κινήσεις καὶ σωμάτων μᾶλλον ἄλλαν, πρὸς δὲ τὰς ὑπνους καὶ μὴ κινήσεις ἦσαν. Διότι δὲ καὶ ἡ νύκτις πλεονεχίη κινήσεως τὰ σώματα τὰ ῥαγίστα.

Cum biberit quis helleborum, ad motiones quidem corporum ducere magis, ad somnos verò atque quietem minus. Indicat autem nauigatio turbari motione corpus.

Non tantum post helleborum, sed & post omne medicamentum prodest ad descensum humorum exercitatio. Indicat nauigatio: non enim mare tantum prouocat ad vomitum, sed & in mari corporis agitatio. Ceterum in somno & quiete naturales facultates magis agunt, ac purgans medicamentum quantum in ipsis est concoquunt, eorumque actionem frangunt.

XV.

Ἐπὶ βέλῃ μᾶλλον ἄλλαν τὴν ἐκδέσθον, κίνησις τῶν σωμάτων. ἐπὶ δὲ πῶς ποιεῖ, ὑπνον ποιεῖ καὶ μὴ κίνησις.

Cum voles helleborum magis ducere, moue corpus: cum verò sistere, somnum inducito nec moueto.

Non est absque ratione, quod ea quae sistunt purgationem, sint contraria ijs quae cient vomitum. Si igitur motiones ciebant, sistent quietes, & multò magis somnus, in quo vires animales quiescunt, tum quae per sensus feruntur, tum etiam quae per musculos, in motibus voluntarijs.

XVI.

Ελλέβορος ἐπιλύει τὸν τοῦ σώματος ὕψος ἔχει, ἀποσπᾷ δ' ἐμποῖει.

Carnes sanas habentibus helleborus periculosus, facit enim conuulsionem.

Corpus sanum cognoscitur ex illa actionibus, quae sunt à quatuor humorum proba temperie. Hi si se habent secundum naturam, nec inuenit medicamentum, vllum humorem noxium in quem agat, partes sanas colliquat & depascitur, ut secretum succum familiarem sibi, quamuis probum, attrahat. Sed hac attractio violenta, quàm sit periculosa, demonstrat conuulsio quae ferè humiditatibus absumptis consequitur.

XVII.

Απύρετα εἶναι δύναται, καὶ καρδιακός, & σκολιὸν, καὶ τὸν ἐμπνεύματον, αὐτὰ φαρμακείας δεῖται σημεῖα.

Eum qui non febricitat, cibi fastidium, morsus oris ventriculi, vertigo, & oris amaritudo, purgatione indigere per superiora significat.

In eo

In eo qui febre vacat, appetentia deiecta, morsus oris ventriculi, vertigo, oris amaritudo, hic casus sunt communes humorum omnium mordacem habentium naturam, & qui alta petunt. Quare in huiusmodi dicit Hippocrates significari medico, quod purgare debeat per superiora, vomitione: iuxta id quod alibi dixerat: Quò natura vergit, eo ducere.

XVIII.

Τὰ ὑπὲρ τῆς φρενὸς ὀδυμήματα, ὅσοι κατὰ φύσιν δέονται, αὐτὸν φαρμακείης δ' εἶδος σημαίνει· ὅσοι δὲ κατὰ, κατὰ.

Dolores qui sunt supra præcordia, quicunque egent purgatione, medicari oportere per superiora significant: quicunque autem infra subsistunt, per inferiora.

Secundùm humorum infestantium motiones oportet etiam facere euacuationes, ita ut dolores qui superius sentiuntur, per vomitiones: qui verò inferius, per medicamenta subducentia curentur. In pleuritide tamen, peripneumonia, & dolore capitis, non est ciendus vomitus: quia materia committens illos morbos non est in ventriculo, nec in via per quam vomitione excernatur.

XIX.

Ὅσοι ἐν τῇσι φαρμακείοις μὴ διψῶσι, κατὰ φύσιν δέονται κατὰ τὴν φύσιν ἢ διψῶσιν.

M 4.

Qui medicamentis purgati non sitiunt, non cessant priusquam sistant.

Finis iusta purgationis est sitis, quando vacuatus ventriculus per medicamentum purgatorium siccatus est: Situ enim fit à siccitate ex inopia frigidi & humiditatis. Sufficiens autem est ea quae ex euacuatione provenit. siccitas hanc efficere, ac praeterea ea quae est medicamenti purgantis vis habentis aliquam, etsi non manifestam sensui, tamen latentem acrimoniam atque caliditatem.

X X.

Απυρέτοιςιν ἐστὶν ἡ ἀνάγκη πρὸς τὸ καὶ γενναίων βάρους, καὶ ὁ τὸ φύσις ἀλγύμενος, καὶ τὰ φάρμακα κείνης δεῖξις σημεῖον.

Non febricitantibus si tormina acciderint, & genuum grauitas, & lumborum dolor, purgari per inferiora oportere significatur.

Facienda sunt euacuationes pro impetu & motione humorum noxiorum, quò per naturam impelluntur.

X X I.

Υποχωρήματα μέλαινα, ὁμοῖον αἷμα μέλαν, ὡς αὐτομάτε ἰόνται καὶ ξυνὸν πυρετῷ, ἐν αὐτῷ πυρετῷ, καὶ κίττω. καὶ ὁμοῖον αὐτὸ πρὸς τὰ χρώματα ὑποχωρήματα πλεῖον πονηρότερα ἢ μέλαινα καὶ κίττω, ξυνὸν φάρμακα καὶ δὲ ἀμεινον, καὶ ὁμοῖον αὐτὸ πλεῖον χρώματα, ἐπὶ πονηρό.

Deie-

Deiectiones nigrae, sanguini atro similes & sponte procedentes, siue cum febre, siue sine febre, pessimae: & quanto colores prauifuerint plures, deterius. A medicamento vero procedentes, meliores sunt, idque quanto plures fuerint colores, non prauif.

Deiectio hominis sani subfulua est, mollis, cohaerens, & non valde graueolens: aliae qualitates quanto plures fuerint, tanto peiorem indicant deiectionem. Color adustionis & corruptionis est niger, siue albus similis assumptis cibis, crudis atis. Multi quidem deiectionum colores prauif, sponte natura procedentes, multarum atque malarum in corpore dispositionum sunt signa: ducti vero a medicamento vim habente plures humorum species euacuare, nihil absurdum significant, sed praua luisse naturam ostendunt, quae vitiosos humores una cum medicina superauit.

XXII.

Νοσημεῖα ὁρόσων δόχουδράων ἐν χολῇ μέλαινα ἢ αἷω ἢ κίτῳ ἐπέλθῃ, θανάσιμον.

Morbis quibuscumque incipientibus, si atrabilis vel supernè vel infernè exierit, lethale.

In morborum initijs nihil excernitur natura conatus, aut lege, quae superflua non consuevit

euacuare nisi cocta fuerint : Sed si quid tum excernitur, quum nulla adhuc apparent coctionis indicia, certum est id morbi vi fieri, & humoris malitia, à quo natura vehementer irritata cessit. Quo enim tempore à causis morbum facientibus natura grauatur, & adest cruditas humorum, tunc aliquid utiliter euacuari est impossibile. Siquidem oportet coctionem praeire subsequi verò discretionem, & postea euacuationem. Itaq; post morbi coctionem, cum aliquis humor vitiosus secretus excernitur, tunc corpus à natura expurgari, bonaq; fieri euacuatio rectè dicitur : Si verò aliter excernitur sine signis coctionis, exitialis est casus. Quare cum in morbi principio semper sint signa cruditatis, mala existimanda est humorum talium in principio euacuatio.

X X I I I.

Οἱ ὅσοι σιν ἐν νεσσημῶν ὀξείων, ἢ ἐν πολυρρο-
νίων, ἢ ἐν τραυματίων, ἢ ἄλλως πῶς λεπτομεροῖς
χολή μέλαινα, ἢ οἰσῖον αἷμα μέλαινα ἐπέλθῃ, τῇ
ὑπεραίῃ ἀποθνήσκουσι.

Quibuscunque per morbos acutos vel diuturnos, aut vulnera, aut quemuis alium modum extenuatis, nigra bilis aut veluti sanguis niger per inferiora subsederit, postmodum moriuntur.

Viribus ob aliquem morbum vehementer imminutis, si atra bilis, hoc est bilis non naturalis,
aut

aut humor melancholicus, hoc est, atra bilis naturalis exierit, mortem in proximo esse denuntiat huiusmodi euacuatio. Nam cum natura sit imbecillis, adeo ut non possit concoquere, neque discernere, neque, ut convenit excernere quae ita prava existunt, ea mortis molestiam in posterum non differunt, propter virium imbecillitatem, & morbi magnitudinem. Porro d. st. nct. o. inter humorem melancholicum & atram bilem facile deprehendi hinc potest.

XXIV.

Δυσεντερίη ἐστὶν ὡς ἀπὸ πολλῆς μολύνσεως δέξεται, ὥστε ἀσθενεῖν.

Difficultas intestinorum, si ab atra bile inceperit, lethalis est.

Dysenteria magna ex parte fit à bile flava, abrasis primùm propter humorum acrimoniam, intestinis, deinde etiam exesis, adeo ut exulcerentur. Hac intestinorum difficultas saepe quidem sanatur: sed quae ab atra bile fit, insanabilis est omnino, cum nihil differat à cancro exulcerato. Cancer autem internus occupans intestina, quia nihil imponi sibi quod adhaereat patitur, & quia semper ab alimenti superfluitatibus tangitur, est insanabilis.

XXV.

Αἷμα αἶμα μὴ ὀρθοῖον αὐτὸ ἢ κακόν. καὶ τὰ δὲ αἷμα ὄν μὴ αὐτὸ ὑποκαρπύον.

Sanguinem quidem ferri supra, qualiscunque sit, malum: infra autem, bonum, cum niger deicitur.

Sanguinis excretionem, quæ fit non per nares, sed per os, ait omnino esse malum, qualiscunque fuerit is qui excernitur sanguis, hoc est, siue spumosus, siue rubens, siue flavus, siue niger, siue aquosus, siue crassus: nam apertionem alicuius vasculi in superiori parte, aut rupturam significat, idque in viris præcipue. Potest enim salubriter reddi sanguis in mulieribus quibus purgationes menstrua constiterunt: ut patet lib. 5. Aphor. 32. Et in alijs etiam nonnunquam utiliter excernitur, ut in mutilatis & cacochymis. Infra vero sanguinem aurum ferri per hæmorrhoidas, quando hominis natura multum talem accumulaverit sanguinem, bonum: ut manifestum esse potest ex Aphorismo 11. lib. 6. Cum vero dixerit ante deiectiones nigras esse pessimas, hæc autem nigras deiectiones per hæmorrhoidas, utiles, hinc planum fit à nigris deiectionibus distinguendas esse hæmorrhoidas.

XXVI.

Ἡν ὑπὸ δυσεντερίης ἐχούσῃς ὀγκώας αὐτὸ σάρκες ὑποχωρήσωσι, θανάσιμον.

Difficultatem intestinorum habenti, si veluti carunculæ deiciantur, lethale est.

Quando

Quando magna partes intestinorum excernuntur in dysenteria, ut possimus eas carnes nominare, lethalem ait esse morbum, cum neque caro concrefcere, neque cicatrix obduci in tali possit exulceratione.

XXVII.

Οκρόσιον ἐν τῷ πυρετῷ αἱμαρρῶδες πολὺν ὀκρῶν ὄντων, ἐν τῇ αἰσθησει τοῦτέστιν αἱ κηλίδες κηρὺς αἰνῶνται.

Quibus febricitantibus sanguinis fluxerit multitudo quacunque ex parte, cum reficiuntur, iis alui humectantur.

Propterea quod cum sanguine multo multum caloris nativi, & spirituum exhalavit, & quod remansit, conficiendo alimento non sufficit: ob id ex cruditate sequitur humiditas & lubricitas alui, durans donec vires suae natura recuperaverit.

XXVIII.

Οκρόσιον χολώδες ἐν ἀσχωρήματι, καὶ φώσινον ὀκρῶν πῶς τε, καὶ ὀκρόσιον καὶ φώσινον, χολώδων ὀκρῶν πῶς τε.

Quibus biliosae sunt deiectiones, hae superueniente surditate cessant, & quibus surditas adest, superuenientibus biliosis deiectionibus, cessat.

Non de ea surditate qua ex habitu difficulter soluitur, sed de ea qua repenti in febris vel.

aliter fit, accurrente ad cerebrum bile, sermo ipsi est. Ipsa siquidem bilis cum meatus auditorios occupauerit, efficit surditatem: Cum verò hinc ipsa natura expellente, ad excretionem peruenerit, soluit surditatem, & aluum deijcit, materia videlicet surditatis è supernis ad inferiora translata. vide aphor. 60. lib. 4.

X X I X.

Οκτόσσις ἐν ἑῷσι πυρετοῖσιν ἐκταροῖσιν ἐοῦσι
ρίγηα γίνεται, δύσκειται.

Quibus in febribus sexto die rigores fiunt, ij difficile iudicium afferunt.

Quicunque ad febres, & præcipuè ardentes, rigores superueniunt, iudicium habere solent bonum atque perfectum, ubi in die iudicatorio fiunt, & cum signis coctionis: non bonum autem, neque perfectum, quando vel diei, vel coctionis signa fuerint imperfecta. Quapropter cum iudicationes in dies intercidentes translata suspecta esse debeant, quòd non natura motu, sed morbi malitia fiant, certè diei sexti iudicatio suspecta sit oportet, in quo nullus indicatur morbus, nisi cum difficilibus symptomatis, & maximo periculo.

X X X.

Οκτόσσις παρξυσμοὶ γίνονται, καὶ αὐτὸν ὥρην
ἀφῇ ὁ πυρετός, ἐς πλὴν αὐτὸν πλὴν αὐτὸν ὥρην
καὶ λάβη, δύσκειται.

Qui-

Quibus accessiones fiunt, si febris quacunque hora dimiserit, postero die eadem inuaserit, iis difficulter soluitur.

Februm interpellantium accessiones, quacunque hora obseruata, febris dimiserit, si eadem cras hora & postero die, ac deinceps occupauerit, iudicium habent difficile, ob causam quæ accessionem facit fixam, firmatam, & stabilitam: nam quæ firmata sunt agrè soluantur, & in longum tempus durant.

XXXI.

Τοῖσι κρηπιδέσιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν, ἐς ἃς ὁ πυρετός ἐστὶν ἐν τῇ γνάθῳ μέλιστα αἱ ἀποσάσεις γίνονται.

In febribus in quibus lassitudinis sensus est, in articulis & circa maxillas potissimum abscessus fiunt.

Qui quomodocunque in febribus lassitudinem habent, ijs ad articulos & circa maxillas præcipuè fiunt abscessus. Hoc verò contingit propter eam quæ est in febribus caliditatem, sublata plenitudine ad caput, & postea eam suscipientibus articulis, & illis qui circa maxillas adenes existunt: sicuti qui circa inguina & alas sunt, quando ad illas partes multitudo peruenierit.

XXXII.

Ὅσοις δὲ αἰνισαμένοισιν ἐν τῇ νύκτι ἡ παύσις, ἐν ταῦτα αἱ ἀποσάσεις γίνονται.

Quibus conualescentibus e morbis pars aliqua laborauerit, illic abscessus fiunt.

XXXIII.

Ατοῦρ ὡς καὶ ἀγροπενονίας ἢ ἡ ἀπὸ τῆς νοσέειν,
ἐν τῷ σώματι καὶ ἡ νόσος.

Quin & si priusquam aliquis ægroter, pars quædam doluerit, aut labore fatigata fuerit, in ea morbus firmatur.

Si cui ex morbo reualescenti, aut antequam ægroter, pars aliqua corporis doleat, aut labore lassata sit, in eam morbus decumbit, hoc est, in ea futurus est abscessus per quem morbus ipse indicabitur, labore quidem rationem causa obinente, dolore verò signi. Doler enim signum est abscessus qui fit, caliditas autem atque imbecillitas ad locum affectum prouehit superfluitates. Nam ubi aliqua pars affectus cuiuspiam occasione imbecillior est reddita, ex omnibus in illam confluere que superuacua sunt, est necesse, que tandem per abscessum expurgantur, nisi foriè per aliam viam deriuata, natura eduxerit, antequàm firmetur abscessus.

XXXIV.

Ἡν ὑπὸ πυρετοῦ ἐχούσαν, οἰδήματος μὴ ὄντος
ἐν τῇ φάρυγγι πρὶν ἐξ αἰφνης ἐπιγένηται, τα-
νάσιμον.

Si fe-

Si febricitanti, nullo existente in faucibus tumore, strangulatio subito accidit, lethale.

Cum vehemens febris indigeat, pro refrigerio cordis plus quam par est calfacti, abundantius inspiratione, fit ut in presentaneum vita discrimen adducantur febricitantes, qui repente suffocantur, ob eum defectum inspirationis, qui fit vel à convulsione musculorum laryngis, vel ab inflammatione in faucibus aut gutture facta, vel quia siccitate tenduntur ipsi muscoli: praesertim cum nullus tumor existit in faucibus. Tumorem enim & ruborem apparere, aut in externas partes conuerti, id quidem significat cynanchen minus periculosam esse, & humores noxios à partibus nobilibus ad ignobiles transferri à natura.

X X X V.

Ην ὑπὸ τῆς πυρετοῦ ἐχομένη ὁ τε ἀρχὴ καὶ ἐξαι-
φνης ἐπισταφῆ, καὶ μέγας καταπίνων δυνάτω, οἱ
δήματος μὴ ἔόντος, θανάσιμον.

Si febricitanti collum repente peruertitur, & vix potest deglutire, tumore nullo apparente, lethale.

Cum neq; ore aperto in faucibus, neq; extrinsecus apparuerit tumor, hominem verò febrientem contigerit non posse deuorare, vertebri ad anteriorem regionem cervicis luxatis, symptoma

N

est lethale, proueniens ex inflammatione musculorum gulam munientium, aut gula ipsius. Est enim communio quadam partibus istis per ligamenta & nervos cum spinali medulla & membranis ipsam ambientibus, ac praterea ossibus vertebrarum, que his extrinsecus adiacent. Existentis itaque ad partes inflammatas ligamentis & nervis, trahi vertebrae, vel intro, vel ad latus, est necessarium.

XXXVI.

Ἰδρωτές πυρεταίνουσιν ἐν δριξάνται, ἀγαθοὶ
τεταῖοι, καὶ πεμπταῖοι, & ἑβδόμηται, καὶ ὀκταταῖοι,
καὶ ἐνδεκαταῖοι, καὶ τεσσαρεσκαίδεκαταῖοι, καὶ ἑ-
πτακαίδεκαταῖοι, καὶ μὴ καὶ εἰκοστῇ, & ἑβδόμῃ καὶ
εἰκοστῇ, καὶ τετρακαστῇ πρώτῃ, καὶ τετρακαστῇ τε-
τάρτῃ. ἔτι οἱ ἰδρωτές νόσους κέρνουσιν οἱ ὅ-
τε ἔτις γινώσκουσιν, πόνον σημεῖναι, καὶ μήκος νό-
σου, καὶ ὑποτροπασμός.

Sudores febricitantibus si euenerint ter-
tio die, & quinto, & septimo, & nono, & vn-
decimo, & decimoquarto, & decimosеп-
timo, & vigesimo primo, & vigesimo septimo,
& trigesimo primo, & trigesimo quarto, bo-
ni sunt: ij enim sudores iudicant morbos.
Qui autem secus eueniunt, laborem signifi-
cant longitudinemque morbi, & recidi-
uam.

Sude-

Sudores saluberrimi censentur in omnibus a-
cutis morbis, si diebus indicatorijs oriantur fe-
bremq; finiant: contra, inutiles, qui id efficere
non possunt, quiq; diebus accidunt non indica-
torijs.

XXXVII.

Οἱ ψυχροὶ ἰδρωτές ξυν μὲν ὁξείᾳ πυρετῇ θ-
νῶσιν, θάνατον. ξυν πρῶτῳ δὲ, μῆκος νόσου
σημαίνει.

Sudores frigidi cum acuta febre facti,
mortem significant: cum mitiore autem lon-
gitudinem morbi.

Frigidi sudores sic è corpore manantes cum a-
cuta febre facti, mortem significant: quippe tan-
tam humorum frigidorum in corpore copiam esse
monstrant, ut neque à nativo calore, neque à fe-
brili possint cal fieri, unde natura (qua secundum
Hippocratem est calor naturalis) extrema imbe-
cillitas, vel eiusdem extinctio, atque adeò mors in
propinquo esse intelligitur. Sudor verò frigidus si
fiat, remissis existentibus febribus, contingit sal-
uari hominem, concessa in tempore multitudine
humorum, atque evicta à natura.

XXXVIII.

Καὶ ὅπου ἐν τῷ σώματι ἰδρῶς, ἐν ταύτῃ φέρει
τὴν νόσον.

Qua parte corporis sudor est, ibi mor-
bum esse ostendit.

Sudores à natura ipsa propellente facti, non à causa externa, membrorum patientium humiditatem euacuant.

XXXIX.

Καὶ ὅκῃ ἐν τῷ σώματι θερμὸν ἢ ψυχρὸν, ἐνταῦθα ἢ νόσος.

Et qua in parte calor aut frigus est, ibi morbus est.

Si in parte aliqua, aut etiam in toto corpore caliditas insignis fuerit, aut frigiditas sponte prodiens & perseverans, hinc necessarium est esse morbum: hoc enim recedit à temperie naturali, quæ sanitas est: sanitas autem commoderatio, calidi, frigidi, humidi, sicci.

XL.

Καὶ ὅκῃ ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαί, καὶ ὡς τὸ σῶμα καταψύχεται ἢ αὐδίζεται θερμαίνεται, ἢ χεῖρμα ἔπειρον ἐξ ἑτέρου γίνεται, μήκος νέος σημαίνει.

Et ubi in toto corpore mutationes fiunt, & modò corpus frigescit, modò calescit, aut color alius ab alio fit, morbi longitudinem significant.

Mutationes qualitatuum atque colorum, humores morbum efficientes ostendunt, qui cùm diversi sunt, ad eos concoquendos natura ipsa longo indiget tempore. Pro dominante verò humore diversi fiunt, & apparent in cute colores: ceterum

omnia

omnia varia sunt periculosa in alimentis, in de-
iectionibus, urinis, sputis, &c.

X L I.

Ιδρῶς πολὺς ἐξ ὕπνου αὐτῷ φανερῆς αἰτίας γι-
νόμενος τῷ σώματι, σημαίνει ὅτι πλεῖονι τροφῇ
χρεῖται. καὶ δὲ τροφὴν μὴ λαμβάνοντι τοῦτο γί-
νηται, σημαίνει ὅτι κενώσι. ὁ δέεται.

Sudor multus ex somno factus absque
causa manifesta, corpus uti pluri cibo signi-
ficat: Si verò cibum non accipienti hoc acci-
dat, scire oportet quòd euacuatione indi-
get.

Sudoris multitudo absque causa manifesta,
altera duarum causarum fit, vel propter ciborum
qui sunt recenter assumpti immoderantiam, vel
illorum qui antea. Quod si propter recenter as-
sumptos, prohibere oportet ne plures assumant.
Quod si propter prius assumptos, euacuare.

X L I I.

Ιδρῶς πολὺς ψυχρὸς ἢ θερμὸς αἰεὶ ῥέων, ὁ
ψυχρὸς μείζων, ὁ δὲ θερμὸς ἐλάσσων νόσον ση-
μαίνει.

Sudor multus frigidus vel calidus assi-
duè fluens, frigidus quidem longiorem,
calidus autem breviorē morbum signifi-
cat.

Sudor frigidus crassam & multam materiam ostendit, quæ non facile discuti, aut à calore vinci queat, ideoq; longitudinem etiam morbi significat: calidus verò materiam tenuem, & quam promptè concoquere ac discutere natura possit, ac ideo breviorum morbum portendit: hic autem agit de sudore qui erumpit, non in die iudicatorio, sed in toto morbi tempore.

XLIII.

Οἱ πυρετοὶ οὗτοι μὴ ἀφ' αὐτῶν λείποντες ἀλλ' ἐκ τῆς ἰσχυρότερι γίνονται, μάλιστα ἐπικίνδυνοι. ὅτι αὐτὸς τὸ πρῶτον ἀφ' αὐτῶν λείπτωσι, σιμῶν δ' ὅτι ἀκίνδυνοι.

Quæcunque febres non intermittentes tertio die validiores redduntur, periculosæ existunt: quoquomodo autem intermiserint, periculum abesse significant.

Continue febres quæ ad infebrecitationem non desinunt, si tertio quoque die exacerbentur, ut semitertianæ, periculosiores sunt intermittētib;: quocunque enim modo intermiserint, periculum abesse significatur, hoc est, siue vehemens, siue longa fuerit accessio, eo enim tempore quo vacant febre, virtus se recolligere potest.

XLIV.

Οὗτοι πυρετοὶ μακροὶ, τετέοισι φύματα ἐς τὰ δόξα ἢ πόνοι ἐγίνονται.

Quos

Quos diuturnæ febres exercent, iis vel tubercula, vel dolores in articulis fiunt.

Propter multitudinem, vel crassitiem, vel frigiditatem humorum efficientium febres, plerumque morbi in longum extenduntur, cum longum exigant tempus ad coctionem. Par igitur est ob hæc & abscessus fieri, & ad articulos superfuitatem decumbere. Non autem semper hoc fit, sicuti neque quicquam aliud huiusmodi, sed magna ex parte videlicet contingere videtur.

X L V.

Οιόσοισι φύονται ἐς τὰ ἄρ' ἰσθ' ἢ πόνοι ἐν πυρετῷ γίνονται, ὅτοι σιτίοισι πλείοσι χερόνται.

Quibus tubercula, vel dolores in articulis fiunt post diuturnas febres, ij pluribus cibis utuntur.

Convalescentibus repletis rationabile est hæc advenire symptomata: nam cum post febres longas cibos ingerant supra mediocritatem aut vitium mensuram, fieri non potest ut recte concoquant. Igitur ut multa excrementa coaceruent necesse est, quæ si ad cutem protruduntur, tubercula, sin ad articulos, dolores excitant.

X L V I.

Ἦν ῥιζὸς ἐμπίπτη πυρετῷ μὴ ἀφ' αὐτοῦ, ἢ δὴ αὐτὸ ἐν εἰ ἰόντι γινώσκουσιν.

Si rigor incidat febre non intermittente, ægro iam debili, lethale est.

Frigus, minima: horror, maior: rigor est totius corporis concussatio maxima, qua si sit irrita, & quam nulla sequatur euacuatio, qua faciat intermissionem ægro iam debili, in hoc ultimo natura conatu lethale signum est, indicans summam imbecillitatem natura, qua solita in rigoribus noxios humores euacuare, nunc id efficere non possit, quod victa ceciderit, & extinctioni proxima sit.

XLVII.

Αἱ ἀποχρῆμας, αἱ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι μὴ ἀφαιρῶσιν πελιδνὰς, καὶ αἱμοτῶδες, & δυσώδες, καὶ χολώδες, πᾶσαι κακῆς. ἀποχωρῶσαι δὲ καλὰς, ἀχαιαί. καὶ καὶ τοῖς ἀφχωρήσιαι, καὶ καὶ τὰ ἔργα. ὡς δὲ μή τι τῶν συμφερόντων ἐκκρίνηται, ἀλλὰ τῶν ἐπὶ τῶν τέτων, κακόν.

Excretiones in febribus non intermittentibus, liuidæ, cruentæ, foetidæ & biliosæ, omnes malæ. Sed si prosperè excernuntur, siue per aluum, siue per vrinas, bonæ. Si verò aliquid eorum quæ non confert excerni, per hæc loca excernitur, malum.

Indicia quòd aliqua benè excernantur, maxima sunt, & coctio, & bona tolerantia: cum ipsis verò & morbi species, & cum his tempus anni, & regio,

& regio, & ætas, & natura agrotantis. Quæ omnia concurrunt ad hoc, ut faciliè ferat ager, & leuetur morbus. Liuida deiectiones, parium unde excernuntur, mortificationem: Cruentæ, vasorum apertionem, aut erosionem à biliosis humoribus factam significant: fœtida putrefactionem: biliosa, abundantiam bilis in continuis febrib. ostendunt. excretionem autem, etiam per se prava si bene exeant, bona: nam partem malè affectam expurgant, quæ fieri solent peracta iam coctione & agro faciliè tolerante. Siquidem indicia laudabilium excretionum maxima, sunt coctio, & bona tolerantia. Sed si aliquid eorum, quæ non iuvant, hoc est, quæ non leuant morbum excreta, excernitur, non bonum.

XLVIII.

Εν τῷσι μὴ ἀγ. λείπουσι πυρετοῖσιν, τὸ τὰ μὲν ἔξω ψυχρὰ ἢ, τὸ δὲ ἔνδον κατὰ τὴν ἰσθμὸν ἔχει, θανάσιμον.

In febribus non intermittentibus, si partes exteriores sint frigidae, & interiores urantur & sitim habeant, lethale est.

Quando aliqua fortis inflammatio in parte corporis profundiori, vel erysipelas euenerit, totus ex toto corpore sanguis ad locum trahitur patientem, atque ideo uruntur profunda, sed cutis refrigeratur, ut fit in principijs accessionum, quod signum est exitiale.

Εν μὴ ἀγαλείποντι πυρετῷ, καὶ χεῖλος, καὶ ὄφρυς,
καὶ ὄφθαλμός, καὶ ρίς ἀσπασθῇ, καὶ μὴ βλέπη, καὶ μὴ
ἀκέη, καὶ δὴ ἀσθενέσθω ὅντος ὁ σώματος, ὅτι αὐτῶν
τέων γίνηται, ἐξ ὧν ὁ θάνατος.

Si in febre non intermittente, labrum aut
supercilium, aut oculus, aut nasus peruertat-
tur, si non videat nec audiat, imbecillo iam
existente corpore, quicquid horum accide-
rit, mors in propinquo est.

Partium sunt peruersiones tensis atq; ad sua
principia contractis ijs nervis qui ad eas perti-
nunt. Quod cum acciderit febre existente continua
& agro debili, non absque ratione mortem esse
vicinam est existimandum: multò autem magis
quando non audiat aliquis, vel non videat, pro-
pter virtutis animalis imbecillitatem.

L.

Οὐκ αὖ ἐν τῷ πυρετῷ μὴ ἀγαλείποντι δύσπνοια
γίνηται καὶ ἀσπασθῇ, θανάσιμον.

Quando in febre non intermittente dif-
ficultas spirandi & delirium accidit, lethale
est.

Fit interdum ex eadem causa utrunque ho-
rum, & difficultas spirandi & delirium, patien-
te videlicet cerebro, & tunc apparet spiritus ma-
gnus & rarus. Contingit etiam spirandi difficul-
tas ob

tas ob aliquam earum partium, qua respirationi
obseruiunt passionem. Nam & morbus lateralis,
& pulmonis inflammationes, & reliqua thoracis
atque pulmonis passiones spirandi faciunt diffi-
cultatem. Hac verò omnia periculosa sunt, præ-
sertim febre continua adiuncta: Nam semper
cum tali fieri consueuerunt, quæ & ipsa per se sa-
tis est efficax sola, ut vires deiciat atque proster-
nat.

L I.

Εν τῷσι πυρετοῖσιν ἀποσήμεται μὴ λυόμενα
πρὸς τοὺς πρὸς τὰς κείσας, μῆκος νόσος σημαίνει.

In febribus, abscessus qui in primis iudi-
cationibus non soluunt morbum, eiusdem
longitudinem significant.

Liquet hoc ipso sermone, quod quæ ad primas
iudicationes non soluuntur ægrotudines, vel quia
natura est imbecilla, vel quia materia est contu-
max, diu sint duratura, nisi mortem anticipent.

L I I.

Οἷόςσιν ἐν τῷσι πυρετοῖσιν ἢ ἐν τῇσιν ἄλλῃ-
σιν ἀρρώσει καὶ πρὸς αἵρεσιν ὀφθαλμοὶ διακρύβ-
σιν, ὅθεν αὐτοπον. οἷόςσιν ἢ μὴ καὶ πρὸς αἵρεσιν, αὐ-
τοπώτερον.

Qui in febribus aut in aliis morbis vo-
luntariè illacrymant, nihil absurdi est: Qui
verò non voluntariè absurdus.

Lacrymæ non sponte exeuntes ostendunt magnam imbecillitatem facultatis naturalis retentricis. Idem est iudicium de excrementis, urinis, quæ ne in lecto quidem retinentur. Habendum tamen hoc in animo, quod signa à facultate naturali singula sunt valde imbecilla, nisi consensu aliorum firmentur, in turba valere possunt.

L I I I.

Οἷοις δὲ ἐπὶ τῶν ὀδόντων ἐν ζῶσι πυρετοῖσι
πρὶν λιχρῶν γίνεσθαι, ἰχυρῶτεροι γίνονται οἱ πυ-
ρετοί.

Quibus in febribus iuxta dentes lentores nascuntur, iis febres vehementiores fiunt.

Neque enim nasci possunt huiusmodi lentores sine caloris multitudinis pituitosioris humiditatem exsiccante.

L I V.

Οἷοις ἐπὶ πολὺ βῆχες ξηρὰ βραχέα ἐρε-
θίζουσι ἐν πυρετοῖσι καυσώδεσιν, ἢ πάνυ τι δι-
ψώδεες εἰσίν.

Quibus tussis sicca modicè irritantes in ardentibus febribus diu durant, ij non admodum siticulosi sunt.

Siccas tussis illas nominat in quibus nihil expuitur, quæ si leniter irritantes in febribus ardentibus acciderint, ob motum in ipsis factum ex locis vicinis aliquis trahitur humor, quo madescent loca quæ ad asperam arteriam pertinent,
ἀδεδ,

adeò , ut hoc nomine minus siticulosi agri fiant,
non quòd careant siti , sed quòd non admodum,
nec ut febris magnitudo exigit, sitiant.

L V.

Οἱ ἐπὶ βροχοῖσι πυρετοὶ, πάντες καὶ πάλιν τῇ
ἐφημέρῳ.

Febres ex inguinum bubonibus ortæ,
omnes malæ, præter diarias.

Ex inguinum tumoribus orta febres, mala:
nam viscera ipsa atque adeo partes principes ma-
le esse affectas significant, utpote quæ superuacua
à se repellant in adenas, promptè hac eadem su-
scipientes. Excipit ipse diarias, quarum proprium
est, ut à causa aliqua externa incipiant, & unica
die durent quantum est ex ipsarum natura.

L V I.

Πυρέσσοντι ἰσθρὺς ἐπιχρῶμεν, μὴ ἐκλείπον-
τος τῷ πυρετοῦ, καὶ μὴ μνηκῶς γὰρ ἡ νόσος, καὶ ὑ-
περσίου πάλιν σημεῖον.

Febricitanti si sudor crebrò accidit febre
non deficiente, malum: Prorogatur enim
morbus, & multam significat humidita-
tem.

Sudor hic malus est, quia præter id quod mor-
bum non soluit, etiam ipsum prorogari ostendit.
Causam verò prorogationis multam aut esse h-

miditatem, quam natura brevi tempore conco-
quere non potest. Econtrariò, sudor est bonus, qui
sponte prodiens in die iudicatorio morbum sol-
uit, alio quippe die factus verius symptomaticus
dicetur quàm crivicius.

LVII.

Υπὸ πάσῃς ἢ τεταίνῃς ἐνοχλησάμῃ πυρετὸς
ἐπιχρῶμεν, λυσιγύσῃ.

Qui à convulsione aut distentione tene-
tur nervorum, febre superueniente libera-
tur.

Cùm morbi ex repletione, curentur euacuatio-
ne, rectè superuenit convulsioni febris, quæ suo ca-
lore digerat aut absumat materiam illam cras-
sam convulsioni ex repletione facta: Nam bona
ratione dictum est superius, convulsiones quæ fe-
bres antecedunt non esse leihales, eas autem quæ
sequuntur, ut quæ sunt à siccitate, valde perni-
ciosas esse. Porro convulsiones sunt numero tres,
Opisthotonus, tensio ad posteriora: Emprosthoton-
us, tensio ad anteriora: Tetanus, æqualis tensio.

LVIII.

Υπὸ καύσῃ ἐχρῶμεν ἐπιχρῶμεν ῥίγι, λυσιγύσῃ.

Qui ardente febre correptus est à morbo,
liberatur si rigor successerit.

Quum febris ardens non fiat nisi à bile in ve-
nis putrescente, rigor autem non accidat nisi ubi
per

per sensiles corporis partes bilis veloci motu defertur, post quem alui solvuntur, & sudores, & vomitus biliosi superveniunt, rationabile est ut ipsa bile (ex qua febris ardens habuit ortum) expurgata, solvatur febris.

L I X.

Τερτiana ἀκρεβής κείνεται ἐν ἐπλά τοιοῦτοι, ὅ μακρότατον.

Tertiana exquisita in septem circuitibus quam tardissime iudicatur.

Tertiana febris ab ea qua ardens nominatur, humore faciente, non differt: utraque enim à flava bile fit. Differens autem, quoniam febris ardens habet in venis unà cum sanguine flavam bilem plurimam ebullientem: Tertiana verò eandem bilem habet in toto corpore fusam. Exquisita dicitur quòd ex syncero simpliciq; humore bilioso procreetur, ut differat à notha tertiana, qua non à simplici, sed misto humore generatur. Quando enim bilis maxima ex parte pituita miscetur, spuria fit tertiana & notha. Simplex itaq; tertiana exquisita septenos circuitus non excedit: Circuitus autem dicitur similis ad idem reditus. Quo fit ut tertiana febris septima ab initio accessio in decimum tertium diem incidit, & saepius in ipso morbus iudicatur, non expectato decimo quarto die. Sicuti igitur in morbis continuis acutorum quidem morborum terminus est decimus

quartus, peracutorum verò septimus, sic in intermittentibus longissima tertiana febris terminum habet circuitum septimum. Rursus autem sicuti in peracutis, morbus poterat indicari tertio, & quarto, & quinto die, sic & in tertiana eisdem circuitibus fieri solutio potest, non expectante natura septimum. Quod enim in continuis una dies valet, hoc in intermittentibus accessio.

L X.

Οἱ ὅσοι σιν αὖ ἐν ζῆσι πυρετοῖσι τὰ ὥτι καὶ φωνῇ, αἶμα ἐκ ῥινῶν ῥυέν, ἢ κελὶν ἐκ πυρραχθεῖσι λυέ τὸ νύσσημα.

Quibus in febribus aures obsurduerint, iis sanguis è naribus profluens, aut alius turbata morbum soluit.

Nihil mirum est, si euacuatis aut transmutatis noxijs humoribus, cessent passionēs, sublati nimirum causis, si tollantur effectus.

L X I.

Πυρέσσοντι μὲν ἐν περὶ αὐτῶν ἡμέρησιν ἀφ' ἧς ὁ πυρετός, ὑποτρύπτειν εἶθ' ἔω.

Febricitantem, nisi diebus imparibus febris reliquerit, reuerti solet.

Nisi febris soluatur bona crisi, per insignem euacuationem humoris noxiij iam concocti, quo tramite magis conueniat, reliquias morbi superesse argumento est residua. Porro concoctionis & euacua-

evacuacionis tempus idoneum solis imparibus assignare diebus superstitiosum arbitror, necnon alienum ab Hippocratis & Galeni doctrina, qui suadeo criticos appellat quartum, decimum-quartum, vigesimum, trigesimumquartum, quadragesimum. Quare cum pares sint etiam critici, melius legatur: criticis, quàm imparibus. Vbi maxima fit exacerbatio, ibi fit crisis, qua ut incipiat ab impari, saepe tamen finitur pari. Quare febris ea recidiva periculo vacat, qua non impari, sed critico die soluta est.

LXII.

Οἱ σφοδρῶς ἐν τῇ περὶ τοῦ ἡπατος ἐπιζήσαν-
ται, καὶ τῇ ἐπὶ τῇ ἡπατος, ἡγούμενοι.

Quibus in febribus morbus regius ante septimum diem accidit, malum.

Icterus aliquando fit in morborum iudicationibus iecore nequaquam malè affecto, quando natura flauam bilem ad uniuersum corpus, & ad cutem effundit. aliquando etiam fit hepate malè se habente: nam hepatis vitia, ex quibus icterus solet aduenire, tria sunt, scirrhus, inflammatio, & obstructio. Verùm scirrhus quidem diutinus morbus existit: inflammatio vò & obstructio etiam repentè fieri possunt: & ij qui regij morbi ante septimum diem accidunt, hoc habent mali, quòd hepar inflammatione aut obstru-

○

Etione laborare portendant. Neque enim iſterus ex indicatione tam citò naſci potuit, quòd hæc ipſa ante ſeptimum diem fieri non poſſit.

LXIII.

Οἱ ὅσοι σιν ἐν ζῷσι πυρετοῖσι καὶ ἡμέρῳ ῥίχα γίνεται, καὶ ἡμέρῳ οἱ πυρετοὶ λύονται.

Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres ſoluuntur.

Cum rigores accidunt, bile per omnem corporis habitum mota, cumq; ſingulis acceſſionibus expurgetur ipſa atque euacuetur, non abſque ratione talium febrium intermiſſio ad infebricitationem peruenit, hoc eſt, quotidie ſine febre ſunt ipſi egroti: ſed reſoluto in prima acceſſione putri humore, remanet veſtigium, & putredinis aliquod veluti ſeminarium, in quo poſtero vel alio deinceps die ſequenter rursus putreſcit humor, unde noua fit acceſſio. fiet q; dum putridorum in corpore humorum ſoboles aliqua manebit.

LXIV.

Οἱ ὅσοι σιν ἐν ζῷσι πυρετοῖσι τῇ ἐξόδῳ, ἢ τῇ ἐννάτῃ, ἢ τῇ ὑνδεκάτῃ, ἢ πενταρεκαδεκάτῃ ἰκτερι ἐπιγίνονται, ἀγαθόν, ὡς μὴ τὸ δεξίον ὑποχόνδριον ſκληρὸν ᾖ, ὡς δὲ μὴ, ὅτε ἀγαθόν.

Quibus in febribus morbus regius ſeptimo, vel nono, vel vndecimo, vel quarto decimo

cimo successerit, bonum: nisi dextrum hypochondrium durum fuerit: si verò non, non bonum.

Ante septimum diem morbum regium accideret, malum omnino: Post septimum verò, quia bene potest fieri in die iudicatorio, natura scilicet bilem flavam, unde procreata est febris, ad cutem iudicatorie reponente, bonum: nisi dextrum hypochondrium obduruerit, id est, nisi aliquis malus affectus, ex ijs quos antea diximus, hepati acciderit. Non expurgato enim qui in ipso est sanguine, neque translata bile ex venis ad meatus bilem excipientes, siue obstructio fuerit in locis per qua transfertur, siue inflammatio aliqua, vel scirrhus, necessarium est omnino non expurgari sanguinem, & una cum ipso bilem per totum corpus deferri: unde morbus regius generatur.

L X V.

Εν τῷσι πυρετοῖσι δεῖ πλὴν καὶ λήθω καὶ μὲν ἰσχυρὸν καὶ καρδιαγμὸς καὶ ὄν.

In febribus circa ventriculum vehemens æstus, & cordis morsus, malum.

Fortis ventriculi æstus in acutis febribus à flava bile in ipsius tunicis ebulliente generatur. Rationabiliter autem ijs qui ita affecti sunt, & os ventriculi (quod antiqui cardiacam, & eius dolorem cardialgiam, sicut eiusdem morsum car-

diognon appellauerunt) mordetur, atque ob id malus est casus. Si quis verò per cardiognon, crebrum & velocem cordis motum, & præcipuè similem palpitatiōi intellexerit, extremum ex eo malum significatur, vim scilicet vitalem maximo incendio teneri.

LXVI.

Εν τῷσι πυρετοῖσι τῷσιν ὀξείσιν οἱ πᾶσι καὶ οἱ πλείους τῶν λαλῶντων πόνοι ἰσχυροὶ καὶ κῆρυ.

In febribus acutis conuulsiones, & circa viscera vehementes dolores, malum portendunt.

Febres vehementes veluti ignis nervos exsicantes, eos extendunt atque conuellunt, atque ita malas afferunt conuulsiones, nimirum ex inanitione & siccitate. Nonnunquam verò propter incendiū vehementiam ac siccitatem dolores circa viscera sentiuntur: viscera quidem, renes, pulmones, hepar, lien, cerebrum, habent venas & arterias; sed quia nervosa non sunt, propriè non dolent, circa ipsa verò dolores sunt.

LXVII.

Εν τῷσι πυρετοῖσιν οἱ ἐν τῷ ὕπνῳ φόβοι καὶ πᾶσι καὶ οἱ πλείους τῶν λαλῶντων πόνοι ἰσχυροὶ καὶ κῆρυ.

In febribus à somno pauidiores, vel conuulsiones, malum.

Passio-

Pauores in febribus à somno, melancholicorum humorum copiam caput per somnum replentium & aggrauantium significant: Conuulsiones autem pituitosorum humorum multitudinem ostendunt. Porro somnus hic accipiendus est, qui fit in declinatione febris & tempore conuenienti, in quo si noceat cum deberet tum iuuare, malus est.

LXVIII.

Εν ζῷσι πυρετοῖσι τὸ πνέειν ἀεὶ σκοπὸν, καὶ κέν. ἀπασμὸν γὰρ σημαίνει.

In febribus spiratio quasi interrupta subsistens, malum: Conuulsiones enim significat.

Spiratio subsistens & interrupta conuulsionem significat, eamque ex siccitate ortam, quam quidem acuta febris, musculos & nervos thoracem mouentes plus in se exsiccans, procreauit.

LXIX.

Ουόσοισιν ἔρα παχέα, τρομβάδεα, ὀλίγα σκῆ ἀπυρέτοις, πλῆθος ἐπελθὼν ἐκ τέων λεπτόν, ἀφελεί. μέλιστα ὅ τὰ ζῷα ἔρχεται οἷσιν ἐξ δόξης ἢ ἀπὸ ζέων ὑπόστασιν ἔχει.

Quibus adhuc febricitantibus vrinae sunt crassae, grumosae, paucae, multitudo earum tenuis superueniens iuuat: praecipue vero tales veniunt, quibus ab initio, vel non ita multo post, sedimentum inest.

Non simpliciter urinas crassas dixit, sed & grumosas adiecit, duorum alterum ostendens, vel crassitudinis quantitatem, vel consistentiam inaequalitatem ac diuulsionem, ita ut plures veluti grumi ipsarum consistentia circumscripta appareant. Porro non absque ratione, crassa vel grumosa urinae sunt multitudine paucae, ut quae vix pertranseant renes per angustias, veluti per colum defacatorium emunctae. Cum itaque maior pars talium humorum malorum fuerit euacuata, & reliquum simul concoctum, tunc excernuntur multo tenuiores prioribus: Tenuiores dico, non tenues absolute: Nam quae secundum naturam sunt, neque tenues existunt, neque crassa, cum haec natura laborem in segregando & expellendo humorum copiam significant, illa vero morbi & succorum in venis cruditatem. Sed laudabiles medium tenent inter utrumque excessum, & cum mediocritatem habeant, crassiores sunt tenuibus aut aquosis, tenuiores autem grumosis. Verum ideo multa excernuntur, quia prius fuere retenta, quo tempore crassa existentes difficulter exhibant. Fiunt autem & sine febre tales urinae, natura expurgante per renes totius corporis superfluitates: sunt etiam in febre quae à multitudine & crassitie humorum ortum habet, quorum ratione sedimentum in fundo matula apparet initio morbi, non lege natura, quae coctionem ini-

tio

tio non perficit, sed ratione gravitatis materiae descendenti ad imum. Quo fit ut tale sedimentum boni nihil portendat. Urina dijudicantur laudabiles substantia inter tenuem & crassam, colore subaureo, quantitate respondente potui, contentis albis, leuibus, & aequalibus. Contenta trifariam diuisa. Quae in fundum matula descendunt, hypostases dicuntur: Quae ad medium concesserunt, eneoremata id est, sublationes: Quae vero ad superficiem peruenerunt, nubes. Porro in hoc differunt, quod hypostasis si bona sit, primum obtineat bonitatis locum, eneorema secundum, & nebula tertium. Praeterea eneoremata materiam tetigisse hypochondria, viscera, & pectus arguunt: Nubes affectum in capite esse. In biliosis autem morbis cum nulla ferè habeatur hypostasis, aut prorsus minima, satis est si eneorema appareat, aut nubes.

L X X.

Οχρόσοισι δὲ ἐν πυρετοῖσι τὸ ἔργον αὐαπετρα-
γυρῶα οἷον ὑποζυγία, τέττοισι κεφαλαλγία ἢ
παίρεισιν, ἢ παρῶσονται.

Quibus febricitantibus urinae perturbatae sunt veluti iumentorum, iis dolores capitis vel adsunt, vel aderunt.

Urina perturbata, quales sunt iumentorum

aut boum, dolores capitis presentes, aut paulò pòst
futuros esse denotant. Tales enim sunt materia
crassa ac densa, qua à calore agitata in spiritum
soluitur, spiritus autem flatuosus unà cum calo-
re promptè fertur ad caput. Non tamen si cui do-
let caput, aut dolebit, hic statim tales habebit u-
rinas: sunt enim dolores capitis etiam ex calore
solo, nonnunquam verò à flaua bile, qua vel in
capite vel in ventriculo continetur, interdum ex
humorum abundantia caput opprimente, vel ex
aliqua loci obstructione, vel ex spiritu flatuoso in
parte ipsa generato: quorum nullum perturba-
tam urinam efficere natum est. Ceterum urina
crassa & perturbata, cum sit à succorum multi-
tudine frigidorum & crudorum cum flatuoso
spiritu turbationem ciente, non mirum si ob agi-
tationem & euaporationem humorum, dolorem
capitis adesse aut breui pòst adfuturum esse de-
monstret. Turbidarum autem urinarum om-
nium generalis hac nota esto, conatus natura co-
ctionem aggredientis, crassi à liquidiore separa-
tio, aut properè, aut tardè facta, aut prorsus nul-
la: Tardè quidem vel citò, cum quod subsidit
discretum citò vel tardè apparet album, leue, &
aquale: Si verò nulla omnino separatio fiat, vel
id quod subsidit malum est, significatur imbecil-
litas natura ope aliqua egentis ad succos perco-
quendos, alioqui subacta à materia copia suc-
cumbit.

cumbit. Sed turbida urina tribus considera-
tur modis, nam vel turbida mixta paulò post re-
sidet, vel semper turbida manet: vel pura min-
gitur: & postea conturbatur. Prima parum a-
liquid turbulentia inaequalis superesse ostendit:
Secunda vigere eam adhuc quæ in sanguine est
agitationem, & crudorum humorum crasse-
tiam ultra fluctuosam turbationem: Tertia cru-
di succi coctionem aggredi naturam, aut paulò
post aggressuram. Sic igitur urina cum sit san-
guinis colatura, aut serosa pars sanguinis à re-
nibus attracta, succorum qui in vasis sunt qua-
litatem prodit, hoc est, cuiusmodi sit sanguis o-
stendit, quando si is biliosus sit, serum quoque
eius biliosum esse necesse est, idque pro utriusque
bilis ratione: Simili modo pituitosum, si is sit pi-
tuitosus. Ergo ubi crudus planè est sanguis, uti-
que tenuis aquosaque urina cernitur, nihil nec
quod sidat, nec quod pendeat in se habens. At
ubi is concoctus est, laudabilis in urina est hypo-
stasis: atque etiam mehercule quedam tennes
superstant, veluti quod in summo lacte colligi-
tur, & quod in summo refrigerati iusculi con-
crevit. Sed si turbida sit, qualis in hoc Aphori-
mo describitur, crudis refertas venas indicat, non
tamen cessare naturam, sed eos valenter conco-
quere, donec superet, aut præ multitudine humo-
rum ipsa superetur.

Οἷοις ἐξδομάσι κείνεται, τέτοιαις ἐπινέ-
φελον ἔχει τὸ ὄρον τῇ τετάρτῃ ἐρυθρὸν, καὶ τ' ἄλλα
καὶ λόγον.

Quibus septimo die iudicatur morbus,
iis quarto die nubeculam habet vrina rubi-
cundam, & alia signa pro portione.

Cum quarta dies sit index, & qualis sit futu-
ra septima nuntiet, quodcunque signum conco-
ctionis in ipsa manifestum apparuerit, futuram
septima die iudicationem ostendit. Itaque non
solum rubra aliqua nubes apparens, antea non
visa, iudicationem significat, sed & alba multo
magis quam ipsa, adhuc autem magis & subli-
mamentum album, leue, aequale & consistens:
aut id quod subsidit (si tale apparcat) sufficiens
est signum futura iudicationis. Verum ut alba
nubecula vel rubra bonam, sic nigra in quarta
apparens, malam iudicationem in septima die
futuram esse demonstrat. Solis enim coctionis si-
gnis in diebus contemplabilibus apparentibus,
bona iudicationes indicantur.

Οἷοις ἐρεῖ ἀφανέα λευκὰ, πονηρά. μά-
λιστα δ' ἐν τοῖς φρενιπυθῖσι ἐπιφαίνεται.

Quibus vrinae perspicuae sunt & albae,
malae:

malæ: præsertim vbi in phreneticis appa-
ruerint.

*Urina quæ tincta non sunt, a'ba dicuntur, quæ
si sint etiam in febrientibus transparentes & a-
quosa, magnam cruditatem significant. Nam
cum febris sit biliosa, si natura coqueret, coquen-
do ringeret multa bile deiectiones, quæ tota cum
rapitur in cerebrum, febrim auget & phreniti-
dem excitat. Melius est semper, cum morbus bi-
liosus est, urinas apparere biliosas, ac in alijs suo-
rum morborum qualitatem aliquam represen-
tare.*

LXXIII.

*Οκτόσιον ὑποχόνδρια μετέωρα διαβορβοεί-
ζοντα, ὅσφύϊ αλγημάτων ἐπιληνομήνις αἱ καί-
ναι τέτοιαι κατὰ γαστήρ, καὶ μὴ φέσαι καί-
παράγασιν ἢ ἔργον πλῆθος ἐπέλθῃ. ἐν πυρετοῖσι
δὲ ζῶνται.*

Quibus hypochondria inflata murmu-
rant, lumborum dolore succedente, iis alui
humectantur, nisi flatus erumpant, aut vri-
næ copia prodeat: hæc verò in febribus ac-
cidunt.

*Si hypochondria à flatuoso spiritu inflentur,
atque adeo murmurent, lumborumq; dolor suc-
cedat, alui paulò post humectantur: quippe cum
spiritu commixta est modica humiditas, quam
spiritus mobilis secum ad aluum deducit, nisi*

fortè humiditas & spiritus ab inuicem separen-
tur, & humiditas quidem per urinam, spiritus
autem per intestina vacuetur. Idq; in febribus
accidit, quæ ipsa morbi sunt, non aliorum morbo-
rum symptomata. In febribus enim, cum imbe-
cillus sit calor natiuus, fit ut minus rectè cocti cibi
in flatu maximè resoluantur.

LXXIV.

Οἱ ὅσοι σιν ἐλπίς ἐς τὰ δ' ἔθρα αἰφίσα αἵ, ῥύεται
τ' ἀποταίσι & ἔθρα πολὺ καὶ παχὺ, & λαυθὸν γινό-
μενον, οἷον ἐν τῷ σιν ἡρώδεσι πυρετοῖσι τεταρτάτοι-
σιν δ' ἔχεται ἐνίοισι γινέα. καὶ δὲ καὶ ἐν τῷ ῥινῶν
αἰμορρῶα γήση, καὶ πᾶν λύεται.

Quibus spes est ad articulos futurum ab-
cessum, liberat ab abscessu vrina multa,
crassa, & alba prodiens, ut in laboriosis fe-
bribus quarto die nonnullis exire incipit: Si
verò sanguis quoque à naribus profluxerit,
breui admodum leuatur æger.

Morbi longi finiuntur abscessu, vel paulatim
natura coquente materiam & expurgante. Quod
si derepente fiat aliqua euacuatio multa vrinae,
illa liberat ab abscessu, humore, qui decubiturus
erat in laborantes articulos, unà cum vrinis eua-
cuato. In laboriosis etiam febribus, è multitudi-
ne crassorum humorum natis, vrina multa cras-
sa & alba prodiens in die decretorio, liberat ab
abscessu.

SECTIO IV.

151

abscessu. Quod si è naribus quoque sanguis eruperit, tum citissima fit morbi solutio sine abscessu ullo.

LXXV.

Ην αἷμα ἢ πῦον ἐρέη, τῷ νεφρῶν, ἢ τῆς κύστις ἐλκωσιν σημεῖον.

Si sanguinem aut pus mingat, renum aut vesicæ exulcerationem significat.

Sive in renibus, sive in vesica ulcus sit, siquidem in vase aliquo magno ac rupto constiterit, & præcipue cum aliqua exesione, sanguinis aut puris excretio per urinas sequitur. Vreteres autem, qui renes ac vesicam interiacent, oportet unà cum illis intelligere: exulcerantur enim sæpe ipsi qui in renibus lapidem habent, quando à lapide aliquo acuto, aut admodum aspero, in ipsis intersepto excoriantur. Contingit etiam exulcerari penem, unde absque urina pus exit & sanguis. Exit & simul cum urinis aliquando pus, disrupto abscessu in aliquo superiorum locorum, ut pulmonum, membrana succingentis costas, & hepatis, cum abscessus materia ad urina instrumenta deferatur. Præterea mulieribus est aliquando cruenta urina, quibus menses suppressi sunt, sed sine pure, ut non statim & temerè pronuntian- dum sit de locis unde fiat fluxus, quando sanguis aut pus cum urina excernitur. Verum dolor qui

in differentibus accidit locis, & exeuntia cum vrinis ostendunt maximè quæ pars affecta sit.

LXXVI.

Οἷοισιν ἐν τῷ ἔργῳ παχέϊ εἶναι καρυῖα μικρά, ἢ ὡς τοῖς τρίχας συνιζέρονται, τέτοιαισιν δὲ πρὸς νεφρῶν ἐκκρίνεται.

Quibus cum vrina crassa, carunculæ parvæ, aut veluti capilli vnâ exeunt, iis à renibus excernuntur.

Caruncula, cum vrina mediocriter crassis exeuntes, renum quidem partes sunt, quas ob vehementem ulceris erosionem auulsas esse constat. Qui verò veluti capilli exeunt à renibus cum vrinis, nullo modo renum partes esse possunt, neque enim fieri potest, ut ad talem substantiæ formam renes, quanuis exulcerati, dissoluantur. Ex renibus autem ipsos excerni dicimus, non quòd pars sit substantiæ eorum, sed quoniam in ipsis suam habuerunt consistentiam: nam ex humore crasso in renibus quodammodo vsto, substantia capillis similes generata cum vrina simul egeri possunt.

LXXVII.

Οἷοισιν ἐν τῷ ἔργῳ παχέϊ εἶναι πιτυράδεα συνιζέρονται, τέτοιαισιν ἢ κύστις ψάλλεται.

Quibus cum vrina crassa, furfurea quædam simul prodeunt, iis vesica scabie laborat.

Quando vrina tenuis & aquosa fuerit, non
secun-

secundum naturam venæ se habent: Cum verò non tenuem, sed mediocrem habuerit substantiam (in quo significato crassam accipere oportet hoc loco) ea quæ simul cum tali urina excernuntur, circa renes, aut vesicam, passionem ostendunt. Cum enim ex venis urina veniat, in renibus autem percoletur, in vesica verò aggregetur: quicquid in ea præter naturam apparuerit, aut venas, aut renes, aut vesicam male se habere indicabit: sicuti & nunc fursurea vesicam scabie laborare, quando vena nullum affectum habent, feruntur enim & ex ipsis aliquando fursurea, cum earum tunica patitur, quemadmodum & vesica. Non enim alia ratione vena ipsa quàm vesica scabie laborantes, fursureos corrices urina cum urinis emittunt: sed distinctio fiet ex tenuitate ac crassitudine urina. Tenuis enim urina venas & totum corpus, non tenuis autem vesicam pati, quoties huiusmodi fursurea cum urinis exhibunt, indicabit.

LXXVIII.

Οἱ ὅσοι ἀπὸ τοῦ τομῆος αἵματι ὀρέσσι, τὰ τέοισιν ἀπὸ τῆς νεφρῶν φλεβὸς ῥῆξιν σημεῖον.

Quicumque sanguinem repente mingunt, iis à renibus venula rupta significatur.

Cum diuersis ex causis renes cruentam urinam excernant, (nam aut propter imbecillitatem

renum urinam subinde secernere nequeuntium,
aut propter amplitudinem osculorum ex vena-
cava urinam ad renes excolantium, aut propter
erosionem ab acribus humoribus factam, aut
propter vena alicuius in renibus ruptionem, mi-
ctio sanguinis accidit. nunquam tamen sence-
ris, copiosus, & repente cum urina sanguis ex-
cernetur, nisi vena ruptio facta sit in renibus:
veluti contingit ijs qui graue onus leuauerunt, aut
valde saltarunt, aut ex alto ceciderunt, aut aliud
quippiam tale violentum pertulerunt.

LXXIX.

Οἱ ὅσοι σιν ἐν τῇ ἔρῳ ψαμμοειδὲς ὑφίσταται,
τῶτέοι σιν ἡ κύστις λίθινα.

Quibus in urina velut arenulae subsistunt,
iis vesica laborat calculo.

Sive in renibus, sive in vesica calculi generan-
tur, in urinis subsident arenosa. Ideo manens esse
videtur aphorismus, qui de vesica tantum men-
tionem fecit.

LXXX.

Ὡς αἵματι ἔρῃ, καὶ θρόμβοις, καὶ σπασμῶδιν ἔχη,
καὶ ὁ δυνάμει ἐμπιπῇ ἐς τὸ ὑπογάστριον, καὶ ἐς τὸ πε-
λναιον, καὶ πρὸς τὴν κύστιν πορεύεται.

Si quis sanguinem mingat & grumos, &
urinæ stillicidium habeat, dolorq; ad innum
ventrem, pectinem, & femem incidat, ea quæ
circa vesicam sunt laborant.

Ea qua

Ea qua memorat symptomata, si accidant una aut seorsum, communia sunt affectibus omnium, qua urina seruiunt, instrumentorum, vesicae, renum, urinariorum meatuum. Porro ubi legitur semen, intellige locum inter anum & pudendum, interfemineum dictum, Graecis Perinaeum.

LXXXI.

Ην αἷμα καὶ πῦον ἐρεῖν, καὶ λεπίδες, ἔστι μὲν βαρεῖν ἢ τὸ κύστις ἢ ἐλκωσὶν σημεῖον.

Si sanguinem & pus minxerit, aut squamulas, & grauis odor adfit, vesicae exulcerationem significat.

Sanguinem quidem & pus meiere, omnium instrumentorum, qua urina obseruiunt, sunt signa communia. Odor autem grauis & insuauis, adhuc autem magis squamulae sunt propria vesicae male affectae signa.

LXXXII.

Οἱ ὁστίσιν ἐν τῇ ἐρήρῃ φύμα φύεται, τὰ τέσσιν ἀπὸ πύσωντος καὶ ἐκρογέντος, λύσις.

Quibus in urinaria fistula tubercula nascuntur, iis, suppuratione facta & eruptione, solutio accidit.

Ob sermonis breuitatem nihil magni hoc haberi aphorismo suspicabitur quispiam : facile

P

enim est unicuique intelligere, quod in meatu urinario, qui in pene est, (hunc etenim meatum fistulam urinariam nominant) si consistant tubercula, & mox rumpantur fieri solutionem. Verum, si diligentius animaduertimus, maius aliquid ex eo ostenditur. Contingit enim urinam aliquando retineri ob tale tuberculum, ex cuius disruptione sanitas proculdubio sequetur, doloris & suppressionis urina solutio.

LXXXIII.

Ὅσους νύκτωρ ποιεῖν ζυνειδήν, σπειρώ τὴν
ὑπερβολὴν ἀνέχουσιν.

Mictio noctu plurima contingens, parvam significat deiectionem.

Docet nos, & alui fluentis, & astricta remedia. In quibus enim supra modum aluus humida deprehenditur, ijs potum minorem exhibebimus, ac praterea viam ad vesicam parabimus: In quibus vero siccior, plus debimus potus, & distributionem eius, quantum fieri poterit, prohibebimus ne ad vias urina transmittatur. Vnius enim solutis, alterius est astrictio, & contraria.

APHOR.

APHORISMORVM

HIPPOCRATIS

Sectio V.

APH. I.

Σ Πασμὸς ἐξ ἐμεσόρου, θανάσιμος.
 Convulsio à veratro, lethalis est.

Convulsio passio est inuoluntaria, nervosis partibus ad similem dispositionem venientibus, quam etiam in motibus voluntarijs assumunt. Hæc primaria ratione dicta, duas habet causas, plenitudinem, & inanitionem seu exsiccationem. Sicut enim foris videmus lora & chordas tendi, ubi multa turgent humiditate, aut ubi exsiccantur vehementius æquo (nam propter hanc causam sæpe rumpuntur) sic in corporibus nervosis par est fieri non raro convulsionem. Verum præter hanc, alia est convulsio, quæ per consensum partis alicuius accidit, non ob materiam quæ implere possit nervosas partes, neque ob inanitionem, sed à qualitate quadam, partibus videlicet, quæ communicationem habent, alteratis & compa-
 patientibus. Iis itaque qui helleboro purgati sunt, ista convulsio videtur accidere posse, utpote per ipsam vomitus vehementiam nervis laborantibus.

P 2

bers, ob consensum quem habent cum ore ventriculi: quæ conuulsio per consensum lethalis non est. Cum verò sit ob immodicam vacuationem, aut pharmaci efficaciam ex nervis etiam humiditates attrahentis, ac ipsorum substantiam violentius exsiccantis, hæc una sanari vix unquam potest, quòd sicca intemperiei consummata remedium nullum sit in agris, non magis quàm senij in sanis.

I I.

Επὶ τραύματι σπασμὸς ἐπιγινώσκειτο, θανάσιμος.

Conuulsio ex vulnere lethalis est.

Conuulsiones ex vulneribus factæ, ratione sequentis ipsa inflammationis, ubi partes nervosas attigerit, magna ex parte lethales sunt.

I I I.

Αἷματος πολλοῦ ῥυέντος σπασμὸς, ἢ λυγμὸς ἐπιγινώσκειτο, κακόν.

Vbi sanguis plurimus fluxerit, singultus aut conuulsio superueniens, malum.

Singultus ventriculi, conuulsio articulorum etiam est, cum sanguinis multa profusione multi caloris nativi & spiritus sit exhalatio: unde vires deiectæ, vix reparantur ex conuulsione.

Επὶ ὅ-

Ἐπὶ ὑπερκαθάρσει σπασμὸς ἢ λυγμὸς ἐπιγλυό-
μενος, κακόν.

Ex nimia purgatione conuulsio aut sin-
gultus superueniens, malum.

Ex repletione conuulsio sanabilis est per ena-
cuationem: ea verò quæ fit ex immodica inanitione,
quam partium nervosarum siccitas insequi-
tur, non facillè admittit curationem: quoniam
siccitatis remedium est difficillimum, & morbi a-
cuties non patitur moram, sed subitum exitium
affert. Conuelluntur autem qui ultra modum
purgantur, non alia ratione, quàm qui sano exi-
stentes corpore helleborum assumpserunt.

Ἦν μεθύων ἐξαίφνης ἄφωνός τις γίνεται,
σπασμοὶς δὲ πρὸς θνήσκει, καὶ μὴ πυρετὸς ἐπιλάβῃ,
ἢ ἐς πλεονάζον ἐλθεῖν καὶ καὶ αἱ κραυγαὶ λυόν-
ται, φθόνος ἔστι.

Si ebrius quispiam repenti obmutuerit,
conuulsus moritur, nisi febre corripiatur,
aut ubi ad horam peruenerit qua crapulæ
soluuntur, vocem recuperet.

Vinum generosum omnes partes nervosas re-
plet facit, corripit & cerebrum (nervorum prin-
cipium) unde conuulsio & totius corporis, vapor

accidit. Convulsioni vero succedit mors, nisi febris supervenerit, qua suo calore coquat, absumat, & dissipet illud humidum: aut nisi hora qua crapula solvuntur, illo stupore liberatus iterum loquatur: Nam solutio lingua argumentum est quod victrix natura totam materiam frigidam, vel extenuarit, vel discussit.

V I.

Οἱ ὅσοι ἀπὸ τετάνε ἀλείσκονται, ἐν τέσσεσιν ἡμέρησιν ἀποκίωται, ὡς δὲ ζωὴς ἀφ' ὧσιν, ὅμοιες γίνονται.

Quicumque Tetano corripuntur, in quatuor diebus pereunt: Si verò hos effugerint, sani fiunt.

Fieri non potest ut in morbis peracutis, cuiusmodi est distentio, indicatio differatur in longum tempus. In primo igitur circuitu dierum indicatorum hac passio indicatur ad mortem vel ad salutem, non tolerante natura diutius tensionis laborem: sed si ultra diem quartum progrediuntur, certissima spes est naturam superasse morbum.

V I I.

Τὰ ἐπιληπτικὰ ὅσοισι πρὸ τῆς ἡβῆς γίνεσθαι, μεταβαίνειν ἔχει. ὅσοισι δὲ πέντε καὶ εἴκοσιν ἐτέων γίνεσθαι, τῶν τοιούτων ὅσοι καὶ ζωὴ ἀποδίδωκε.

Quibuscunque morbi comitiales fiunt ante pubertatem, mutationem accipiunt: qui-

quibuscunque autem anno vigesimo quinto, ferè commoriuntur.

Nunc solum eius mutationis meminit qua ex aetate accidit, à qua docti, & formam victus, regionum, & temporum rationem unà cum alijs remedijs inueniemus. Quippe morbo comitiali non liberantur omnes ex aetatis commutatione, in eam qua calida est & sicca, nisi & in alijs rectè se gesserint. Sed si omnibus alijs magna diligentia adhibitis praesidijs, mutatione aetatis morbus hic sanetur, cerè is maximè sanabitur, quem tempore pubertatis sanari contigerit. Qui verò vitra pubertatem processerit, aut post vigesimum quintum annum acciderit in iuuentute, aetate calida sicca, is profectò durat magna ex parte ad finem usque vitae. Nam iuuentus contraria quum eum non profligarit, quomodo sequens aetas similis, nempe frigida humida, ad exitum adducet, quem veluti similem sibi, conservare natura est?

VIII.

Οἱ ὅσοι πλὴν δὲ ἐπιπλὴν ἡ νόσος οὐκ ἀνὰ πρῶτον ἔρχεται ἐν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραις, τέτοιον ἐστὶν ἐμπύημα μετέσται.

Quicunque morbo laterali laborantes in quatuordecim diebus non repurgantur, ij ad suppurationem vertuntur.

Nominat purgationem ac repurgationem eam

quæ fit per sputa, euacuationē humorum facien-
tium morbum lateralem. Tempus autem præfi-
nit, in quo, si non fiat huiusmodi purgatio per spu-
ta, morbus lateralis in suppurationē conuertitur,
pure scilicet inter pulmones & thoracem effuso,
atque ita morbi fit in alium morbum conuersio.

I X.

Θάσις γίνεται μάλιστα ἡλικίῃσι τῇσιν ἀπὸ
ὀκτῶ καὶ δεκά ἑτέων, μέχρι πέντε καὶ τετράκοντα.

Tabes fiunt præcipuè ætatibus à decimo
octauo vsque ad trigessimum quintum.

Victus errore magis morbofi sunt iuuenes
quàm senes: Ab ætate ergo non est hoc malum,
sed ab intemperantia.

X.

Οἱ ὅσοισι κυψάχην ἀφ' οὗ γινονται ἐν πνεύ-
μονα πέπεται, ἐν ἑπτὰ ἡμέρῃσιν ἀπὸ θνήσκουσιν.
Ὡς δὲ ταύτας ἀφ' οὗ γινονται, ἔμπυοι γίνονται.

Qui ab angina liberantur, his ad pulmo-
nem malum transit, & intra septem dies mo-
riuntur: Si verò hos euaserint, suppurantur.

Si humor angina transferatur ad pulmones,
id exitio esse plerunque ante septimum diem in-
dicat, agro videlicet suffocato ab humoribus eò
delatis: Si verò id tempus effluxerit absque alio
malo fluxione in pus conuersa, suppurari, & non
mori. Quibus autem ipsum pus non, ut decet, sub-
inde repurgatur, hos tabidos fieri contingit.

Τοῖσιν

Τοῖσιν ὑπὸ τῆς φθίσεως ἐνοχλεμύοισιν, ὡς τὸ
πύσμα ὅπως αὐτὸ ἀποβήσεται βαρὺ ὄζει πρὸς τὰς
αὐθρακας ἐπιχεομένην, καὶ αἱ τριχες ἀπὸ τῆς κεφα-
λῆς ῥέωσι, θανάσιμον.

Qui tabe molestantur, si sputum quod ex-
tussunt graue olet iniectum carbonibus, &
capilli à capite defluunt, lethale.

Tabidorum sputum, quòd per tussim excrea-
tur, carbonibus impositum si grauius olet osten-
dit extremam humorum qui sunt in pulmone
putrefactionem: Si verò ex capite capilli de-
fluant ita affectis, lethalis etiam nota est, quæ ul-
timi alimenti defectum ostendit, ac virtutis na-
turalis magnam imbecillitatem, atq; aliquando
humoris corruptionem.

Οἱ ὅσοισιν αὐτὸ φθισιασιν αἱ τριχες ἀπὸ τῆς κε-
φαλῆς ῥέωσιν, ἔτοιμα ἀγρότης ἐπιχεομένης ἀπο-
δνήσκουσιν.

Quibuscunque tabe laborantibus capilli
à capite defluunt, ij alui profluuiio superue-
niente moriuntur.

Defluuiio capillorum superueniens alui fluxus
tabe ab ulcere pulmonis laborantibus, is proster-
nit vires, quæ ex ipso basia sunt valdè imbecilles,
unde coniiciendum mortem imminentem esse.

XIII.

Οἱ ὅσοι αἷμα ἀφροδὲς ἀναπλῶσι, τετέοντι
ἐν τῷ στήθεϊ τοῦ αὐτοῦ αἵμα γινέσθαι.

Qui sanguinem excreant spumofum, iis
de pulmone educitur.

Sanguis qui è pulmone educitur spumofus est
similis visceri, quod leue est, rarum, aërium, spiri-
tuosum, & valut ex spuma quadam sanguinis
concreta confluit. Qui verò sanguis è ventre
aut thorace effluit, ne tali quidam similis est, adeò
ut hoc verè dici possit, sanguis spumofus solius
pulmonis ulcera indicat: non autem verè, leso
pulmone ex necessitate spumofus expuitur.

XIV.

Υπὸ φθίσει ἐκχυρῶ ἀγέρροια ἐπιρροαίη,
θανάτωδες.

Tabæ laboranti profluuium alui super-
ueniens, lethale.

Hic simpliciter dicit esse lethale alui proflu-
uium in tabe, tanquam illud solum sufficiat mor-
tem significare non tamen ita è propinquo, neque
tam cūd futuram, sicuti cūd defluuium capil-
lorum adiungitur.

XV.

Οἱ ὅσοι ἐν πολλῇ εἰπιδὲς ἔμπυοι γίνονται, καὶ
αἷμα κατὰ τῶσιν ἐν πτοσάρεθοντα ἡμέρησιν ἀφ' ἧς
αὐτὸ ἡρῆξαι γίνονται, παύονται. καὶ δὲ μὴ, εἰς φθίσιν
μεδίστανται.

Qui

Quicumque ex morbo laterali suppuratur, si in quadraginta diebus purgantur à die qua fit ruptio, liberantur: si verò non, ad tabem transeunt.

Pleuritidis si per spua non purgetur ante quartumdecimum diem, fit cedit suppuratio, suppurationi ve. ò tabes, nisi in quadraginta diebus à ruptione. Et per is effusione purgatio fiat per spuitiones, quam solutio morbi consequitur. Sed si non purgetur per spua intra dies quadraginta, qui terminus est indicationis acutorum ex decidentia, transiit ad tabem, nam pure processu temporis putrescente, ne cessarium est pulmonem exedi exulcerari ve. Porro vice a pulmonis comitatur macies ea corporis quæ tabes appellatur.

XVI.

Τὸ θερμὸν βλάπτει πᾶσι τοῖσι πλεονακίαις
χειρομύραισι, σαρκῶν ἐκδήλησιν, νεύρων ἀκρό-
τεσι, γνάθῃς νάρκωσιν, αἱμορροαγίας, λειποθυ-
μίας, τοῦτοι οἱσι θάνατος.

Calidum, ubi quis sæpius eo vtatur, hæc mala affert, carniū effœminationem, nervorum incontinentiam, mentis torporem, profluvia sanguinis, animi defectiones, quibus succedit mors.

Vsus immodicus aquæ calidæ in balneo, carniū effœminationem affert, hoc est, molliem aut laxitatem, nervorum imbecillitatem: calig-

dum enim externum dissolvit & irahit ad cutem calorem internum, unde imbecillitas succedit nervorum pariter & cerebri, substantia videlicet ipsius dissoluta. Excitat & sanguinis profusiones, à calore laxatis & dilatatis venis: Sanguinis autem profusiones immodicas, in quibus multi spiritus dissipantur, animi defectiones sequuntur: has subsequi solet mors, nonnullas quidem citius, alias verò tardius. Proinde monemur in omnibus rebus quantumvis bonis videndum esse quatenus: et si enim suus cuique modus est, tamen magis offendit nimium quàm parum.

XVII.

Τὸ δὲ ψυχρὸν πρᾶσμεν, τεταίνεσ, μῦθασμεν, & ῥίγεα πυρετώδεα.

Frigidum convulsiones, distentiones, liuores & rigores febriles efficit.

Frigidum indurat ex concretione, siccat etiam (ut apparet in gelu) unde spasmus accidit refrigeratis & induratis nervis. Sicut enim non oportet ipsorum substantiam ab immodico calore dissolvi, sic neque ultra modum convenientem refrigerari & in unum cogi ac cohiberi. Ad hoc ex refrigeratione fit cutis liuore & nigrore decolorata: fiunt & rigores, qui prohibita transpiratione, dum corpus externo frigore obregescit, febres excitant.

Τὸ ψυ-

XVIII.

Τὸ ψυχρὸν πολέμιον ὁτέοισιν, ὁδοῖσι, νοσήσιν,
ἐγκεφάλῳ, νωτιαίῳ μυελῳ. Ἐδὲ θερμὸν ὠφέ-
λινον.

Frigida inimica ossibus, dentibus, nervis,
cerebro, spinali medullæ: Calida verò vri-
lia.

*Omnes hæ partes frigida sunt, quia exangues:
iuvantur tamen modico contrariorum usu: Quo-
fit ut calidum sit ijs convenientius.*

XIX.

Οὐόσαι κατ'ἑψυχται, ἐκ θερμαίνευν δεῖ, πολλὰ
ὁύσαι αἱμορροαί γέει, ἢ μέλας.

Quæ refrigerata sunt, ea excalfacere o-
portet, exceptis iis unde fluit sanguis copio-
sus, aut profluxurus est.

Refrigerata partes ab immodico frigida usu ad
suum temperamentum reducuntur per calidi con-
trarij appositionem, nisi cum fluit sanguis: nam
tum intemperie frigida posthabito sanguinis eru-
ptioni succurrendum, à qua maioris aegrotanti pe-
riculum imminet. Relictis itaq; calfacientib. fri-
gidis ἔσ' astringentibus utendū, ad copiosum san-
guinis profluvium reprimendum. Quanto tamen
Methodi, adhibetur cauterium calidum ad par-
tem unde sanguis plus a quo defluit: dicendum,
quòd cauterium, non quatenus calidum, sistit
sanguinem, sed quia resis os occludit utendo.

XX.

Ελκεσις ὅ μὲν ψυχρὸν δακνῶδες, δέρμιν παρ-
σκληρῶς, ὁ δ' αὖτε ἀνεκπύητον ποιεῖ, μύσας,
ρίγας πυρετώδεις, σπασμούς, καὶ τετάνους.

Ulceribus frigidum mordax, cutem ob-
durat, dolorem insuppurabilem facit, deni-
grat: rigores febriles, conuulsiones & disten-
siones creat.

*Frigida aqua mordax est, non cum in cutem
simpliciter incidit, sed cum in ulceratam: nam
integram cutem mordicare non potest, cum ipsa
sit densior quam ut eius substantiam perua-
queat, quam etiam duriores reddit, ipsam con-
stringens ac densans. Ad hoc dolorem efficit in-
suppurabilem, refrigerando naturalem calorem qui
ulcera ad suppurationem perducit, & ea dissipare
prohibet quæ dolorem efficiunt: liuores inducit,
refrigerata cute: rigores, demorsis videlicet parti-
bus nervosis à frigido.*

XXI.

Επὶ ὅ κ' ἐπὶ τετάνει αὐτὸ ἔλκεθ' νέω δ' ὁ σάρ-
κειος θέρει μέσον, ψυχροῦ πολλοῦ, κατὰ χροὺς
ἐπανόκλησιν θερμῆς ποιεῖται. Θερμὴ δ' ἐξ ὧται
ρύεται.

Nonnunquam in Tetano sine ulcere, iu-
uene bene carnosio, Æstate media, frigida
aquæ multa perfusio caloris reuocationem
facit. Calor autem hæc sanat.

Iuueni-

Iuuenibus temperatis in Æstate media, aspersio frigida cutem refrigerat & constringit, quæ constricta calorem colligit & augeat: calor autem per antiperistasin auctus conuulsioni remedio est, si fuerit ager iuuenis, ac mediocri corporis habitus peditus in aëre calido: Nam aqua frigida occursus, ut vincit & extinguit calorem imminutum, ita colligit, cum fortis est, ipsum diffuari prohibens. Calor ergo per se passionem hanc sanat: Aqua verò per accidens. Porro non hinc intelliguntur ea quæ cum ulcere sunt conuulsiones, ut quæ nunquam ab aqua frigida sanari queant. Quod manifestum est ex eo aphorismo: Frigidum ulceribus mordax dolorem facit insupparabilem.

Κ Κ Ι Ι.

Τὸ θερμὸν ἐκπυητικὸν ὅτι ἐπὶ παντὶ ἔλκει, μέγιστον σημεῖον ἐς ἀσφαλείαν, δέρμα μαλακῶς, ἰσχυραίνε, αἰσώδιον, ριζέων, ἀσπασμῶν, τεταμένων παρηγεσθέν. πλὴν δὲ ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ ῥαχίδι λυφ. πλείστον δὲ ἀλγ. φέρει ὅστων κατὰ γμάσι, μόλις δὲ τοῖσιν ἐπιλωρῶσι. τεταμένων δὲ μόλις τοῖσιν ἐν κεφαλῇ ἔλκεια ἔχουσιν, καὶ ὁρῶσι ὑπὸ φύξι. ὁ θνήσκει ἢ ἐλκεῖται. καὶ ἐρπησιν ἐσθιορῶσιν, ἑορῇ, αἰδοῖω, ἰσέρη, κύσφ, τετέοισι δὲ θερμὸν φίλιον καὶ κελῶν. δὲ δὲ ψυχρὸν πολέμιον καὶ κτεῖνον.

Calida ubi suppurationem facit, non ta-

men in omni vlcere, maximum securitatis indicium existit, cutem emollit, extenuat, dolorem lenit, rigores, conuulsiones, & distentiones mitigat: Grauitatem capitis soluit, plurimum confert ossium fracturis, sed iis præcipue quæ denudatæ sunt: præterea iis maxime quæ in capite vlcera habent, & iis quæ à frigore moriuntur aut vlcerantur, & herpetibus exedentibus, sedi, pudendis, vtero, vesicæ, his calidum amicum & iudicans: frigidum inimicum & perimens.

Quemadmodum frigidum conuulsiones & Tetanos facere apium, sanat tamen aliquando: sic & calidum quanquam ad suppurationem efficax, eam tamen aliquando fieri prohibet. Siquidem vlcera putrida, & ea quæ fluxiones habent, tantum abest ut aqua calida foris promoueantur ad suppurationem, ut etiam eo peiora reddantur. Similiter & quacunque vlcera sunt putredini obnoxia, & quæ partes circumstantes exesas habent, & quæ difficulter ad cicatricem perducuntur, vniuersa minime suppurantur, & quacunque ex malis vlceribus proprijs insigniuntur nominibus, veluti quæ cancrofa, chironia, telephia, phagedenica: id est, carnem comedentia: hæc omnia non suppurantur: nec ea quæ conuulsionem afferunt. Contrà verò si calidum prodest, & ad suppuratio-

purationem ducit, maximum est ulceri signum
ad securitatem: Nihil enim male potest adueni-
re ulceri pus generanti. Cognosces autem cali-
dum prodesse aut obesse ulceribus, ex eo quod illa
suppurentur à calidi usu, hac insuppurabilia per-
durent. Deinceps calidi usum multiplicem com-
memorat: etenim cuem induratum mollior, &
crassatam extenuat, dolorem sedat, convulsiones
ac Tetanos mitigat, dolorem suppurabilem effi-
cit, calorem nostrum nativum, cui est amicus,
adaugens, cum quo nonnulla concoquens, & ad
melius alterans, quaedam verò discutiens, atque
evacuans, si non extoto sanat, ceriè doloris par-
tem retundit: & ex his quæ in capite sunt malis
gravitatem solvit, concoquens atque dissolvens
quacunque à vaporosa materia in caput tracta
molestant: fracturis ossium utilissimum, ijs preci-
pue quæ carne sunt exuta, adhuc autem magis
ijs quæ in capite fiunt, nam ijs, ut cerebro frigi-
dum est vehementer inimicum, atque ideo cali-
dum amicum: Et quacunque à frigido lesa sunt,
ijs remedium est calidum. Item herpetibus, sedi,
pudendis, & similibus confert calidum: frigidum
autem nocet.

Κ Χ Ι Ι Ι.

Εν τέτοιαις ἢ δὲ τῶν ψυχρῶν χρεῶν, ὁ ὅθεν
αἰμορραγίαι ἢ μέλαινα, καὶ ἐπὶ αὐταῖς, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ αὐ-
τῶν ὁ ὅθεν ἐπιρρεῖ. Ἐ ὁ ὅθεν φλεγμαίνοντι καὶ ἐπιφλε-

Q

ρίσματα ἐς τὸ ἐρυθρὸν καὶ ὑφαίμονι ῥέποντα νε-
κρὰ αἵματος ἐπὶ ταῦτα. ἐπεὶ ἔχει παλαιὰ ρηγαίνε
καὶ ἐρυσιπέλας τὸ μὴ ἐλκέρηδρον ἀφελέει· ἐπεὶ
ἔχει ἐλκέρηδρον βλάπτει.

In his frigida vti oportet vnde sanguis
copiosè profluit, aut profluxurus est, non
tamen suprâ ipsas partes vnde profluit, sed
iuxta eas adhibita. Quinetiam vbi inflam-
mationes aut velut incendia quædam ad
rubrum & subcruentum tendentia, recenti
sanguine sunt, iis frigidum admouere con-
uenit: quippe veteribus inflammationibus
nigrorem inducit. Erysipelas quoque non
vulneratum curat, vlcera verò lædit.

*Quibus intempestivè aut immodicè fluit san-
guis, aut fluxurus est, frigida confert, non ipsis
partibus fundentibus sanguinem admota. (ulce-
ribus enim frigidum mordax) sed circumstanti-
bus, illis præcipuè vnde aliquid ad vlcera pro-
fluit. frigida enim constringit, sanguinemq; cras-
siorem, adeeque ad profluendum minus idoneum
reddit. Inflammatas etiam partes, & velut à
flamma quadam deustas frigida iuuat, propter
horum a quibus fiunt caliditatem: sed ha-
benda ratio est totius corporis, ut non nisi eva-
cuato eo (si euacuatione indigeat) adhibeatur.
Adde frigidam non debere adhiberi ubi metus
est, ne*

est, ne ad principes corporis partes noxios humores propellat. Suo itaq; tempore adhibita frigida recentibus inflammationibus auxilio est, nam & calorem temperat & fluxionem repellit: Veteribus autem liuorem inducit & nigredinem, quod à crasso fiant sanguine, quem adhuc crassiore frigida efficit, & in grumos conuertit, quos nigredo comitatur. Eodem modo & erysipelas non ulceratum iuuatur à frigida, quippe feruorem sanguinis & bilis acrimoniam, è quibus procreatur erysipelas (quod ignem sacrum nominant) extinguit. Ulcerato verò erysipelati mordax est frigida, & dolorem infert, & hac ratione nocet, quia partes dolentes ad se semper alliciunt ipsas fluxiones.

XXIV.

Τὰ ψυχρὰ οἷον χιὼν, κρύσταλλος, καὶ τῆς γῆς πο-
λέμια, θηχέων κινητικὰ, αἰμὲρροικὰ, κατὰρροικὰ.

Frigida, qualis nix & glacies, pectori inimica, tusses mouent, sanguinis profluuium & destillationes.

Immodicè frigida omnia, sicut nix & glacies, thoracis partibus sunt inimicissima, cum & tusses moueant, & vasis disruptis sanguinem sapius manare faciant: & ex capite destillationibus thoracem offendant atq; pulmonem, quas etiam excitant nix & glacies cerebrum refrigerantes.

Q 2

Τὰ δὲ ἐν δὲ θροισιν οἰδήματα καὶ ἀλγύματα
ἅπερ ἔλκεθ, καὶ ποδαγρίαι, καὶ σπασμοί, τρι-
πέων τὸ πλεῖστον τὸ ψυχρὸν πολλὸν καταχρόμιον
ρήϊζει τε καὶ ἱχναίνει, καὶ ὁδυνὴν λύει. Νάρκη γὰρ
μετρίη ὁδυνὴν λυπνὴν.

Tumores articulorum & dolores sine vl-
cere, podagricos quoque dolores & conuul-
siones, horum quidem plurima frigida aqua
superfusa copiosè, leuat, doloremque mi-
nuit ac soluit: Stupor enim mediocris dolo-
rem leuat.

Quacunque inflammationes vel tumores ar-
dentes, absque ulcere ad rubrum & floridum re-
centi sanguine tendunt, à frigida aut aqua sa-
nari, quæ influxum cohibet, & hac ratione dolo-
rem in talib. soluit, quia & eius causam abscin-
dit. Et refrigeratio etiam largior partium affert
torporem medicrem, qui & ipse dolorem soluit,
ut remedium narcoticum sensum hebetando.

Υδὼρ τὸ ταχέως θερμαντόμιον, καὶ ταχέως ψυ-
χρόμιον, καὶ φρόπιτον.

Aqua quæ citò calefcit, & citò frigescit,
leuissima.

Aquam non pondere leuem dijudicat, verum
quæ tenuium partium existens facilè altera-
tur, citò calefcit & citò refrigeratur, in gustu ac
odo-

odoratu nullam exoticam referens qualitatem,
non turbida, non coenosa, sed veluti exquisitè co-
lata, frustillorumq; innatantium expers. Talis
concoctus & distributus facilis ventrem non gra-
uat, sed celeriter permeat. Sicuti enim cibi laus est
facillimè posse alterari, ita & aqua: siquidem fa-
cile transmutari volumus quicquid probè conco-
qui debeat ab instrumentis quibus est coctionis
munus demandatum à natura.

XXVII.

Οκθόσοις ὃ πικρὸν ὀρέξιος νόκτωρ, ἔϊσι πικρὸν
διψῶσιν ὡς ἐπιχειρηῶσιν, ἀγαθόν.

Qui bibere appetunt, iis admodum si-
tientibus si superdormierint, bonum.

Noctu valde sitientibus, siue ex potatione vini
meracioris, siue ex penuria humidi & frigidi si-
dis aduenerit, potus est dandus: Nam & defectui
succurrere confert, & illam qua facta ex vino est
caliditatem, aqua restinguere theorema est medi-
cum. Si verò non biberint parum sitientes, & su-
perdormierint, bonum, quia per somnum fit hu-
meclatio, & id quod sitim efficit eoquitur calore
ad interna recepto, subdescenditq;.

XXVIII.

Γυναικείων ἀγωγὴν ἢ ἐν δρώμασι πύλην. πολ-
λαχρὸς δὲ καὶ εἰς ἄλλα χρησίμη αὐτῷ, εἰ μὴ καὶ ἡ-
βαρίας ἐνέποιε.

Q 3

Suffitus aromatum muliebria ducit, sæpius verò & ad alia utilis esset, nisi capitis faceret grauitatem.

Muliebria dicit purgationes quæ ex utero singulis mensibus, & à partu fieri solent. Vbi mulier est matura viro, plus ei natura conficit sanguinis quàm sit ipsi nutrienda ex usu, qui cum incipit esse molestus venis & arterijs, foras erumpit per uterum. Ea tamen, quæ propter inflammationem ipsius uteri, vel euersionem, aut aliam similem causam non purgantur statis temporibus, non aliter rectè curabuntur, quàm eam passionem uteri remouendo, quæ suppressionis mensium est causa. Verùm quibus absque hac passione parcius fluunt menses, aut propter sanguinis crassitiem, aut acetabulorum obstructionem, vel propter horum obserationem, totiusve substantia densationem, ijs prouocantur suffitu Casia, Costi, Amomi, Cinamomi, & similium calidorum aromatum, quorum vapor in vasa uteri receptus, obstructiones soluit, extenuat, incidit suo calore lentos humores, & ad fluxum apparat. Sed quia vapor calidus est & tenuis, qualitatem malam materialium uteri secum rapit & tollit in caput: unde grauitas.

XXIX.

Τὰς κυστικὰς φαρμακείας ἐν τῷ ὀργᾷ τετράμηνον.

μηνά. καὶ ἄλλαι ἐπὶ τὰ μὲν ἀνέκγονον. καὶ δὲ νήπια ἔ
περὶ οὐ πέρα δὲ λαβείναι.

Prægnantes purgabis, si materia ad sui
excretionem inuitet, quadrimestres, & vsq;
ad septimum mensem, sed has minus. Mino-
re verò aut grandiore fœtu, abstinabis.

*Hic aphorismus copiosissimè expositus est in
primo aphorismo sectionis quartæ.*

X X X.

Γυνὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσα φλεβοτομηθεῖσα ἐκπι-
πτεῖ αἷμα, καὶ μᾶλλον εἰ μείζον εἴη τὸ ἔμβρυον.

Mulier vtero gerens sanguine missio ex
vena abortit, & præcipuè si fœtus sit gran-
dior.

*Grauidis non temerè secanda vena est, pro-
pter periculum abortus quod sanguinis missio-
nem immodicam aut intempestiuam comitatur,
presertim cum fœtus grandior indigeat alimen-
to copiosiore, & subtrahatur illud ex quo nutri-
tur per sanguinis eanctionem. Verùm in acutis
morbis, in quibus mater & fœtus unà pericli-
tantur, incidere potest necessitas venam secandi,
& pharmacum exhibendi, modò virtus, ætas,
corporis habitus, victus ratio qua præcessit, tem-
pus, Ceteriq; status hoc ipsum permittant, ne si re-
medio destituantur, pereant.*

Q 4

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσῃ ὑπὸ πνέοντι ὀξείῳ
νεύρῳ ληθῶς θανάσιμον.

Mulierem vtero gerentem capi ab aliquo morbo acuto, lethale est.

Non absque ratione lethale est. Si enim sit cum febre morbus acutus, necesse est esse continuam febrem, talis enim est morbus acutus: & in hoc duplex periculum, unum quidem in febre ipsa, alterum ex alimenti defectu. Nam acutus morbus tenuissimum victum exigit, qui periculum abortus adfert, foetui ipso inedia pereunne. Si vero ut seruemus hunc non verebimur crebro cibum exhibere, febrem continuam victu intempestivo augentes, matrem necabimus. Sed si absque febre morbus aliquis acutus alius gravidam mulierem inuadat, veluti morbus comitialis, morbus attonitus, convulsio, tetanus, propter magnitudinem morbi & vehementiam fieri vix potest ut laborans euadat. Ergo illi, aut foetui, aut utriq; cadendum saltem ingens periculum impendet ab aliquo morbo acuto.

Γυναικὶ αἷμα ἐμείσῃ, καὶ περιμελώων ῥαγέντων λύσις γίνεται.

Mulieri sanguinem euoment, menstruis erumpentibus, solutio aduenit.

Re-

Reuulsio in contrarium molienda, sursum scilicet, repentibus humoribus deorsum: deorsum, sursum: intro, foras: Quod ex natura manifestum est operibus.

XXXIII.

Γυναικὶ ἢ καταμύωσιν ἐκλιπόντων, αἵματι ἐκ τοῦ ῥινός ἐκλύειν, ἀγαθόν.

Menstruis deficientibus sanguis ex naribus fluens, bonum.

Eadem ex causa, profluvium sanguinis è naribus auxilio est ei malo, quod ex suppressis contra naturam mensibus ortum est.

XXXIV.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσσει ὡς ἢ μεγάλῃ ποσὶ ῥυῖ, κίνδυνος ἐκτεῖσθαι.

Mulieri in vtero gerenti, si aluus plurimum profluat, periculum est ne abortiat.

Si mulieri gravida fluat aluus supra modum, periculum est ne defectu alimenti pereat infans: non enim tum fit proba coctio, nec cibi distributio, cum immodicè fluit aluus.

XXXV.

Γυναικὶ ὑπὸ ὑστερικῶν ἐνοχλημάτων ἢ δυσχερῶς παρμὸς ἐπιγινώσκουσα, ἀγαθόν.

Mulieri quæ ab vteri strangulationibus infestatur, aut quæ difficulter partum edit, sternutamentum superueniens, bonum.

Sternutatione significatur, quod natura, quae prius erat sopita & obruta, iam collectis viribus expergiscitur & redit ad se. Signum ergo bonum sternutatio, & causa etiam iuuaminis est, quia vehementiore concussu partim quidem naturam excitat, partim verò excernit quae partibus corporis firmiter infixae haerent.

XXXVI.

Γυναικὶ τὰ μηνιαία ὀχρεὰ, καὶ μὴ καὶ τὰ αὐτὰ αἰεὶ χροῦντα, καὶ τοῖσι δὲ αἵματι συνεγείνηται.

Mulieri menses decolores, nec per idem semper tempus venientes, purgationem indicant esse necessariam.

Mulieri temperata menses debent esse rubicundi: biliosa, flauicantes: melancholica, nigricantes: Pituitosa, albi. Pro diuersitate coloris alieni à solito & laudabili, purganda est medicamento ducente nunc bilem, nunc melancholiam, nunc verò pituitam: id autem indicabit mutatio ipsa coloris consueti.

XXXVII.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθῃ καὶ οἱ μαστοὶ ἐξαιφνης ἰσχυροὶ γίνονται, ἐν τῇ γαστρὶ.

Mulieri grauidæ si mammae repente extenuentur, abortit.

Gracilitas mammarum abortum futurum portendit, ob defectum alimenti: Communes enim quaedam vena sunt mammis ac utero, quae
ubi

ubi parum habuerint sanguinis, foetu inde alimentum rapiente, graciles mammas relinquunt, & inedia foetum nonnunquam perire sinunt, nonnunquam verò eundem ad excretionem excitant: nam foetus, indigentiam nutrimenti non ferens, voluendo sese & calcitrando rumpit membranas quibus in utero continetur, & sibi ad natiuitatem viam parat, ac intempestiuè foras exit. Succursurus medicus debet ea dare qua cito sanguinem generent & augeant.

XXXVIII.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσῃ ὡς ὁ ἑτερος μαιεύσας ἰχθὺς ῥύηται διδυμὰ ἐχέσῃ, γάστρῳ ἐπιτεσσάσκει. καὶ ὡς ὁ δεξιὸς ἰχθὺς ῥύηται, & ὁ ἄλλος, ὡς δὲ ὁ αἰετὸς, & ἡ λυ.

Mulieri gravidæ geminos ferenti si altera mamma extenuatur, alterum abortit: Et si quidem dextra extenuatur, marem: sin sinistra, foeminam.

Existentibus in utero geminis, altero mare, altero foemina: si dextra quidem mamma areseat ac extenuetur, mas in periculo est, ob eam quæ prius dicebatur causam, nimirum ob alimenti inopiam: si verò sinistra gracilis fiat, foemina. Nam foetus fame excruciat, appendices & ligamenta dilacerant, atque hac ratione mulier abortit.

Ην γυνή μὴ κύεσσι, μηδὲ τετοκῆα γάλα ἔχη,
 τὴν οὕτω καὶ παρὰ μῆνα ἐκλέλοιπε.

Si mulier quæ neque grauida est, neque
 peperit, lac habet, huic menstrua defecerunt.

Alimentum trifariam dicitur Hippocrati: est enim quod exquisitè adsimilatum alit, est veluti alimentum, est & quod alere debet, aut quod aliquando alet. Derelictus autem similis quidem natura partis humor aliquis existit, ut in ossibus, medulla: in hepate, sanguis: spumeus humor, in carne pulmonis: & in articularum compagibus, glutinosus humor: & in testibus & assistentibus anfractibus, semen: & in lingua, salua: sunt etiam quidam in mammis adenes, vim habentes id quod influit alterandi: cum autem sint exangues & albi, proprium efficiunt humorem talem quale est lac, atque huius plus faciunt. Quanto plus alimenti deferitur ad ipsos, plus autem deferitur octauo & nono mense conceptionis. Fit etiam tale quandoque, licet admodum raro, cum mulier grauida non est, nec peperit, quando ad similem peruenerint communes vena mammarum & vteri repletionem, ex menstruum retentione: id verò tum accidere potest, cum sanguis, qui euacuabatur per menses, regurgitauit in mammis.

Γωαν

Γυναιξὶν ὁκόσῃσιν ἐς τὰς ὑπὲρ αἰμῶν συ-
σπρέφεται, μανίαν σημεῖν.

Si mulieri coaceruatur sanguis in mam-
mis, furorem indicat.

Eorum adenum qui sunt in mammis exan-
guis est natura, & frigida, omne enim exangue
frigidum: Quinetiam eum qui ad ipsos defertur
sanguinem, in lac frigidius sanguine transmu-
tant. Sed si transmutari non potest sanguis eò de-
latus, aut propter abundantiam, aut propter fer-
uorem eius & prauitatem, furorem indicat: labi-
tur enim biliosissimus per totum corpus, caput q̄
potissimum petit, ut minimè sit mirum eas mu-
lieres, quibus hoc accidit, in furorem agi, sit enim
furor & mania à sanguine bilioso in caput de-
lato.

Γυναιξὶς ὡς γέλης εἰδέναι εἰ κύει, ἐπὶ κα-
θ' ὅσον μέλι μύκητον δίδοναι πίνειν, καὶ μὴ
πρόφον ἔχει πρὸς τὴν γαστέρα, κύει· ὡς δὲ μὴ, εἰ
κύει.

Si nosse velis num mulier conceperit,
quum dormitura est à cœna ei aquam mul-
tā bibendam dabis: Et si cruciatus hanc
circa ventrem corripuerit, concepit: sin mi-
nus, non concepit.

Mellicratum crudum ventrem & intestina flatibus implet, qui facilem non habentes exitum in muliere qua concepit, ob uteri compressionem, tormina generant: in ea verò qua non concepit, flatus quidem à mellicrato fieri possunt, sed hi exhalantur absque torminibus. hoc tamen signum conceptus certum non est, nec perpetuum.

X L I I.

Γυνή ἔγκυ & εἰ μὴ ἄρρεν κύει, δὲ χροὺς εἰν, ὡς δὲ θήλυ, δὲ χροὺς.

Mulier si marem concepit, benè colorata est: si verò fœminam, malè colorata.

Qua marem concepit, melius est seipsa colorata, nimirum à calore, quia mas est calidior fœmina. Nec est hoc signum certum: sunt enim & fœmina viragines, & viri effœminati.

X L I I I.

Ἡ γυναικὶ κυῖσσι ἐρυσιπέλας ἐν τῇ ὑτέρῃ γύνηται, θάνατος.

Si mulieri gravidæ in vtero fiat erysipelas, lethale.

Si febris acuta sola fœtum interimere potest, non mirum si erysipelas in vtero ex sanguine fervido & bile natum, quod febris acuta consequitur, hoc ipsum efficiat.

X L I V.

Ὅσας δὲ φύσιν λεπταὶ ἐῖσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσιν, ἐκτετρώσκει πρὶν ἢ παχυνθῶσαι.

Qua-

Quæcunque præter naturam tenues existentes vtero gerunt, abortiunt priusquam crassescant.

Quandò magis accedit mulier ad mediocritatem, tandò est aptior concipiendo, & in tempore pariendo. Quæ fit ut supra modum extenuata, fœtum portare non possit ad tempus legitimum, ob alimenti inopiam: si verò vehementer emaciata post conceptionem crassescat, signum est quòd alimentum totum absumitur in mulierem, & sanguis ad conceptus alimentum deputatus, ad eius quæ concepit nutritionem recipiatur. Quare non absque ratione, fœtus sufficienti indigens alimento, corrumpitur.

X L V.

Οκτώσιν ἢ μετρίως ὁ σῶμα ἔχουσα ἐκπιτρώ-
κεται διμῶνα καὶ τριμῶνα ἄτερ παρρησίας φα-
ερῆς, ζωῆσιν αἱ κατὰ ληδόνες μύξης μετὰ εἰσι,
καὶ δ' οὐκ αὐτὰ κατὰ εἶν ὑπὸ τῷ βάρους ὁ ἐμ-
βρυον, ἀλλ' ἀπορρήγνυται.

Quæcunque mediocri corporis habitu præditæ, secundo & tertio mensibus sine causa manifesta abortiunt, iis acetabula vter-
i plena mucoris sunt, neque præ pondere
fœtum continere possunt, sed rumpuntur.

Mulier ante quartum mensem plus obnoxia
est abortioni. Quare temperata vitam que facit,

si secundo aut tertio impragnationis mense abortiat, idq; fiat non ab alimentis penuria, non a febre vehemente, euacuatione immodica, erysipelate, aut alia quapiam occasione manifesta, ei sunt acetabula plena mucoris. Nam si puritas intercedat mucosa inter orificia illa (Græcè dicuntur cotyledones, quæ sunt ora velut oribus iuncta) faciet ut amplius non hæreant sibi: unde soluta, ut ita dicam, contiguitate, sequitur abortio.

XLVI.

Οἷοςται δὲ φύσιν παχέαι ἐοῦσαι μὴ ἐυλαμβανέσιν ἐν τῇ γαστρὶ, τῶν τε ἐπὶ πλοῶν ἐπὶ τῶν ὑπερίων ἀποπείσσει, καὶ πρὶν ἢ λεπταῖς ὄναι ἐκύσιν.

Quæ immodicè crassæ concipere nequeunt, iis omentum os uteri comprimit, & priusquam extenuentur non concipiunt.

Supra modum tennes concipiunt quidem, sed abortiunt ob alimentis defectum: crassæ verò nimium non concipiunt. Nam omentum cum adipem multo tegens intestina, os internum uteri tantum comprimit, ut genituram non excipiat. Quare nisi ad mediocritatem redeant, concipere non possunt.

XLVII.

Ἡν ὑπερὶ ἐν τῇ ἰσχύϊ ἐγκυρῶν ἀπαύση, αὐτὰς καὶ ἐμμετρον γυνάσκει.

Si uter-

Si uterus, ea parte qua coxæ incumbit adiacétve, suppuratur, necesse est emmotum fieri.

In uteri suppuratione ad exteriora, necesse est per emmotum fieri curationem, hoc est, linteolum carptum cum idoneis remedijs applicari parti necesse est, ne si absque linamentis medicamentum imponatur, effluat ipsum, & ex eo nulla percipiatur utilitas.

XLVIII.

Εμβρυα, τὰ μὲν ἄρσενα ἐν τοῖσι δεξιόσι, τὰ δὲ θήλεια ἐν τοῖσιν ἀριστεροῖσι μᾶλλον.

Fœtus qui mares sunt, in dextra uteri parte: qui foeminae, in sinistra magis continentur.

Par est ut qui calidior est fœtus, in calidiori uteri parte consistat. Calidior autem uteri pars est dextra, eo quod iocinori è directo subditâ sit. Quo fit ut in dextra parte magis consistent mares, foemina in sinistra.

XLIX.

Ες ὑστερίων ἐκπλώσις τῶν ἀρμυγῶν ἐπιπθεῖς ἐπιλαμβάνειν τοῦς μυκτῆρας καὶ τὸ σῶμα.

Vt secundæ procidant, sternutatorio apposito nares & os comprime.

Secunda seu secundina corium est fœtum involuens: hac si post partum remaneret in utero, odoris gravitate caput repleret, & Stomachum

R

putrefacta euerteret. Quare maturè excutiendam esse docet, appposito sternutatorio ex pipere, piperithro, helleboro, vel castorio confecto, vel ex similibus: Sternutamenti enim violentia & concussione, secundina deorsum fertur, ore praesertim & naribus occlusis, ut spiritus ad infernas partes descendens, expultricem vim adiuvet in educendis locis.

L.

Γυναικὶ τὰς κατὰ μῆτρα ὑὸ βάλαν ἐπιχρῆν, σκόλον ὡς μέγιστον πρὸς τοὺς ὑἱοὺς ἀπὸς ἑαυτῆς.

Si mulieri menstrua sistere volueris, cucurbitulam quam maximam sub mammis defige.

Sunt communes utero & mammis vena: per revulsionem ergo retrahitur sanguis sursum, affixa sub mammis ingenti cucurbitula. Sed non est fidendum ubi remedio, tentanda quoque sunt & alia, repellentia, astringentia, emplastica, &c.

L I.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθῃ τενασμός ἐπιχρῶμεν, ὅς ἐστιν ὡσπερ ποιεῖται.

Mulieri utero gerenti, si tenesmus superuenerit, facit abortum.

Hic aphorismus est idem cum aphor. 27. septima sectionis, ubi vide commentarium.

Οὐ γὰρ

LII.

Ὁ ὅσων ἐν γαστρὶ ἔχουσιν, ταύτων ὁ σῶμα τῶν ὑπερ-
ρίων συμμεινκεν.

Quæ vtero gerunt, iis vteri os coarctatum est.

Post conceptionem tam arctè clauditur vteri os, ut ne acicula quidem pateat, ne calor natiuus foetum ipsum fouens expiret, aut ne frigus offendens subintret. Adueniente tamen in coitis nouo semine, aperitur interdum, unde superfœtatio: quæ, licet admodum rarò fiat, fieri tamen aliquando potest.

LIII.

Ἡν γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ γάλα πολὺ εἴη
τῶν μαστῶν ῥυή, αἰσθενὲς ὁ ἔμβρυον σημεῖον. ὡς ὅ
περὶ οἱ μαστοὶ ἔωσιν, ὑγεινότερον ὁ ἔμβρυον
σημεῖον.

Mulierì vtero gerenti si lac è mammis plurimum effluat, imbecillum esse foetum significat: si verò solidæ mammæ fuerint, san-
norem esse foetum indicant.

Si multus sanguis fertur ad mammæ per uenas communes vtero ὁ mammis, paucius ad v-
terum feretur: Vnde cognoscetur imbecillitas fœ-
tus, qui parum sanguinis absumat. Præterea est mala causa, quia omnis immodica vacuatio no-
xia est vtero gerenti. Liquet autem quòd mulie-
ris gràuida mammæ neque tenues oportet appa-

rere, sicut in muliere non grauidā, (hoc enim signum inopiam sanguinis ostendit, & hac ratione foetus in ipsis corrumpitur) neque adeo plenas ut lac effluat, sed tantum intumescere, ut solida tangentibus videantur. Media enim hac consistentia inter renitentes, propter nimiam repletionem, & molles ac laxas, propter defectum sanguinis, est laudabilis: mediocriter enim impleta, ipsi foetui satis esse alimenti demonstrant, reliquum verò sanguinis, quo non eget, ad mammās deferri, ut illic in lac mutatum presto sit infanti, ubi primum in lucem editus fuerit, ut inde alatur.

L I V.

Οὐδὲν ἄλλο φθίρειν μέλλουσι τὰ ἔμβρυα, τῶν τε οἱ κατὰ τοὺς ἰσχυροὺς γίνονται. ἢ δὲ πάλιν σκληροῖς γίνονται, ὁ δὲ ὡς ἔστιν ἢ ἐν τοῖσι κατὰ τοὺς ἰσχυροὺς, ἢ ἐν τοῖσι ἰσχυροῖσι, ἢ ἐν τοῖσι ὀφθαλμοῖσι, ἢ ἐν τοῖσι πρῶτοις, καὶ ἐν τοῖσι φθίρουσι.

Quæ abortum facturæ sunt, iis mammæ extenuantur: Si verò contrā duræ fiant, dolor erit vel in mammis, vel coxis, vel oculis, vel genibus, & non abortient.

Mammae tenues omnino præcedunt foetus corruptionem. Extenuantur autem vel penuria sanguinis, vel eius transmissione ad uterum dolentem, à causa aliqua abortus. Natura siquidem ad afflictam uteri partem transmittit sanguinem,
quo

quo destitutas mammas contingit arestere ac extenuari. Si verò extenuata, rursus dura fiant propter materiam superuacua[m] quæ illuc ab utero deferitur, dolor mammas infestabit, aut coxas, aut oculos, aut genua, si in has partes natura reposerit inutilem materiam, & non abortient, utero scilicet ea materia liberato.

L V.

Οἷος ὅστις ὁ σῶμα τῆς ὑπερέων σκληρόν ἐστι, ζω-
τησιν αὐτοῦ κη ὁ σῶμα τῆς ὑπερέων ξυμμεύειν.

Quibus os uteri durum est, iis coarctari id ipsum necesse est.

Os uteri coarctari commune est signum & tumoris alicuius in eo existentis, & conceptionis in muliere, id quod oportet ex duritie distinguere: Nam gravidis molle est, & secundum naturam: in quibus autem est tumor præter naturam, siue phlegmonæ similis, siue scirrhi, durum.

L V I.

Οἷος ὅστις ἐν γαστρὶ ἔχουσιν ὑπὸ πυρετῆς λοιμ-
βαίνοντα, καὶ ἰσχυρῶς ἰχναίνοντα αὐτοὺς ποσὶ
σι & φωνῆς, καὶ τοῦ σιγαλεπῶς ὁ ἐπιτενέωσας,
ἢ ὅστις ὅστις καὶ κινδυνεύειν.

Quæcunque mulieres gravidæ à febris capiantur, & vehementer sine causa manifesta extenuantur, difficulter pariunt, & cum periculo, aut abortientes periclitantur.

Mulier gravida febre aliqua laborans ex vitiosis humoribus antequam conciperet acervatis oria si plus quam ratio postulat exienuetur affligatur, ve diutius, non audentibus medicis aliquod auxilium gravida exhibere, neque exactam vitus rationem imperare, ne foetui necessarium alimentum auferatur, non est mirum si periclitetur ipsa, aut difficulter pariat, aut etiam abortiat: foetus enim cum aliquando nequit obistere malo, ex febre & vitio humorum corrumpitur: nonnunquam vero perdurat quidem usque ad tempus partus, sed cum & ipse valetudinarius sit (ut qui longo tempore laboraverit) & matrem habeat imbecilem, non sine periculo paritur. Nam ad bonum partum, duorum corporum vigore est opus, & gravida mulieris & infantis.

L V I I.

Ἐπὶ ῥῶν γυναικῶν πᾶσιν ἐ λειποθυμῖν
 ἢ ἐπιληπτικῶν.

In fluxu muliebri si convulsio & animi defectus aduenerit, malum.

Animi defectio commune quidem est omnis immodice evacuationis symptoma, convulsio vero, etsi non communis existat, ad plurimas tamen consequitur evacuationes, & precipue si pars que paritur nervosa fuerit. Porro utrumque à purgatione muliebri malum est, nam animi defectio summam virium imbecilitatem ostendit:

Con-

Convulsio verò ex siccitate aut inanitione magna ex parte lethalis est.

LVIII.

Καταμηνίων γινομένων πλειόνων νοσοῖ ξυμβάινει, καὶ μὴ γινομένων ἀπὸ τῆς ὑστέρας ξυμβάινει νοσοῖ.

Menstruis largius fluentibus morbi eueniunt, non fluentibus autem ex utero morbi contingunt.

Conuenit quidem inter medicos ex immodico fluxu sanguinis menstrui generari subinde morbos, ut refrigerato totius corporis habitu. cachexiam, hydropem, fædum colorem, tumorem pedum, ac virium omnium imbecillitatem. Verùm Hippocrates hoc loco dicit etiam fieri morbos ex eiusdem fluxus menstrui retentione: menses enim supprimi contingit, vel quia vena ferentes ad vterum menstruam purgationem, comprimuntur, vel obstruuntur propter crassitiem sanguinis & lentorem, vel ob robur vasorum uteri, adeo ut quod influit non admittant. Quodcunque autem horum fuerit, necesse est processu temporis ipsum uterum pati aut similem inflammationi dispositionem, aut erysipelati, aut scyrrho, aut cancro. Quibus denuò totum corpus compatitur, ut vel decoloratio, vel artuum grauitas, vel febres errabunda, vel alius aliquis subsequatur affectus, pro natura excrementorum in corpore acervatorum.

R iij

Ἐπὶ δὲ χαλὰ φλεγμοναῖνοντι, καὶ ἐπὶ ὑστέρῃ φλεγμονῇ, καὶ ἐπὶ νεφροῖσιν ἐμπύοισι στραγγεῖν ἐπιγίνεται. ἐπὶ δὲ ἥπατι φλεγμοναῖνοντι λυγρὸς ἐπιγίνεται.

Recto intestino & vtero inflammatione affectis, renibusq; purulentis, urinae stillicidium accidit. Iecoris verò inflammationem singultus sequitur.

Stranguria Græcis, Latinis urine stillicidium dicitur, non est aliud quàm ubi guttatim distillat urina, atque assiduam ad mingendum irritationem inducit. Recto igitur intestino & vtero inflammatione laborantibus, non mirum si urine stillicidium accidat: nam per compatiendirationem vesica etiam unà cum ijs male afficitur, adeo ut ceruice eius compressa, & vi retentrice dissoluta non possit urinam retinere: ijs siquidem patientibus, vicinitatis ratione pati vesicam est necessarium, ut quæ & intemperiei particeps sit & inflammationis, & prematur à tumoribus præter naturam qui vicinis partibus insunt. In purulentis autem renibus, prius ad vesicam delatum eam sua acrimonia mordicat, atque facultatem expultricem irritans excitat ad excretionem. Ob ventriculi consensum cum hepate, & nervorum utriusque partis communicationem,
hepate

hepate inflammationem patiente, singultus acci-
dit ventriculo, non quidem semper, sed cum ad
maximam inflammationem hepar attollitur.

L X.

Γυνή μὲν μὴ λαμβάνη ἐν γαστρὶ, βέλη δὲ εἰδέναι
εἰλήσεται, πεινῶν δὲ ἡσυχία καὶ ἡσυχία καὶ ἡσυχία
κὴν μὲν πορεύσεται σιδομένη ἢ ὁδὸν ἀλγὺν ὅτι
μακρὸς ἐς τὰς ῥίνας καὶ ἐς τὸ στόμα, γίνωσκε ὅτι αὐτὴ
ἐστὶ ἐκ τῆς αἰτίας ἐστίν.

Si mulier non concipit, scire autem vis an
conceptura sit, pannis circumtectam inferne
suffias, & si odor videatur per corpus ire ad
nares & os, scito, quod ipsa non ex seipsa ste-
rilis est.

Suffius aromatum collo uteri per infundibu-
lum immissus si non permeet ad nares, scito cor-
pus uteri frigidum esse nimis, & densum, ac ideo
ad concipiendum ineptum.

L X I.

Ἡν γυναῖκα ἐν γαστρὶ ἐχέσῃ αἱ καθαίρειες πο-
ρεύονται, αἰδύατον δὲ ἐμβρυον ὑπαικνύν.

Si mulieri utero gerenti purgationes pro-
cedant, impossibile est foetum esse sanum.

Foetus nec alimentum trahit, nec probè nutri-
tur, si copiosè fluant purgationes singulis mensi-
bus: Siquidem ex menstruo sanguine foetus ali-
tur.

Η γυναικὶ καὶ θέρσεις μὴ πορεύονται, μήτε
φείκης, μήτε πυρετοῦ ἐπιθυμίας, αἴσαι δ' αὐτῇ
παραπλήωσιν, λογίζεσθαι τούτων ἐν γαστρὶ ἔχειν.

Si purgationes mulieri cessent, neque fe-
bre, neque rigore superueniente, & fastidia
cibi incidant, iudica ipsam in utero habere.

*Supprimuntur grauidis menses à natura, ut
sint alimentum foeti ui. Suppressi ergo sine causa
manifesta significant impregnationem, quod plu-
rima mulieres ipsa experientia duce didicerunt:
Cum enim fastidium cibi patiuntur, menstruis
suppressis, tunc se concepisse conijciunt. Fit autem
fastidium cibi eadem qua pica ratione, laeso ore
ventriculi in grauidis. Contingit & nonnullis a-
liquid tale propter humores vitiosos totum cor-
pus occupantes, verum hoc cum horrore & febre
patiuntur, atque his signis distinguuntur morbo-
sa à grauidis.*

LXIII.

Οκρόσαι ψυχρὰς καὶ πυκνὰς τὰς μήτρας ἔχουσι,
καὶ κύϊσκεισι. καὶ οκρόσαι καὶ θερμὰς ἔχουσι τὰς μή-
τρας, καὶ κύϊσκεισιν ἀποσβέννυνται καὶ αὐταῖς ὁ γόνι-
μος. καὶ οκρόσαι ξηρὰς μάλλον καὶ περικαεῖς ἐν-
δείη καὶ τῆς τροφῆς φθείρεται το σπέρμα. οκρόσαι δ'
ἐξ ἀμφοτέρων τῶν κατ' οὐτὸν ἔχουσι σύμμετρον, καὶ
βιοῦνται ἐπίτεκνοι γίνονται.

Mulie-

Mulieres quæ frigidos & densos habent uteros, non concipiunt, quæ etiam præhumidos habent, haud concipiunt: (extinguitur enim in eis genitura:) & quæ siccos & immodicè calidos habent, inopia enim alimenti corrumpitur genitale semen. Quæ verò in vtrisque oppositionibus medicriter temperatum habent uterum, hæ fecundæ sunt.

Mulieris uterus rectè conferetur cum terra, quæ nisi temperata in qualitatibus primis, fecunda non est: Siquidem in ea quæ supra modum frigida est, semen refrigeratum extinguitur: in humida, quasi in palustri & cœnoso loco, superfluo humore delibutum summergeitur, nec habet cui radicibus innixum hereat: in sicca, sabulosa, argillacea, aut petrosa, semen alimenti defectu arefcit: In ea verò quæ immodicè calida est, torretur. Quo fit ut uteri benè temperati in iisdem qualitatibus sint ad conceptionem idonei, malè autem temperati, si parum à bonitate recedunt, difficulter concipiunt: Si verò nimium, mulieres steriles fiunt. Omnium autem uteri intemperatarum quas sequitur sterilitas, indicia sumuntur à vapore & suffitu aromaticum, de quo superius dictum est.

LXIV.

Παρολυσίως ἢ καὶ ἐπὶ τῷ ἀρρένῳ. ἢ γὰρ δὲ

ἀραιότητα ὁ σπέρματος ὁ πύρμα ἔξω φέρεται,
 πρὸς ὅ μὴ ἀσπέρμα πειν ὁ σπέρμα, ἢ ἀλλὰ πλὴν πυ-
 κνότητι ὁ ὑγρὸν ὁ ἀλγυρὸν ἔξω, ἢ ἀλλὰ πλὴν πυ-
 κνότητι ὁ σπέρμα ἐκπυρρῶται, ὥστε ἀσπέρμα πρὸς
 ὁ τὸ πύρμα πύρμα, ἢ ἀλλὰ πλὴν πυρρῶται ὁ αὐτὸ τὸ
 ὁ γίνετο.

Similiter autem & in maribus euenit: aut enim propter corporis raritatem spiritus extra fertur, vt semen transmitti non possit, aut ob densitatem humor non excernitur, aut propter frigiditatem non excalescit, vt eo in loco coaceruari possit, aut propter calorem hoc idem euenit.

Hic Aphorismus non censetur Hippocratis, quod omni ferè ex parte sit falsus. poterat autem sic verius efferrì: Similiter & in viris, vel caliditas, vel frigiditas, vel humiditas, vel siccitas immodica causa est sterilitatis. Nam ob excedentem calorem semen fit tosto simile: Ob frigiditatem non benè concoquitur, atque ideo si mediocris sit intemperatura in ipso, indiget utero calido multum: si verò immodica sit, sterile est: Ob siccitatem verò, quod, ubi primum excidit, extendi non potest, quod maximè sit necessarium si mulier debet concipere. Ob humiditatem rursus non concoquitur, ac ideo, si modica sit intemperatura, utero calidiori indiget & sicciori; si verò immodica sterile est: Immodica ergo intemperatura sterilitatis

litalis sunt causa, modica verò si sint, & contrarijs coniungantur, tunc concipient mulieres: Si verò similibus, non concipient. Neque enim fieri potest, ut frigidum semen in utero frigidior sit fertile, neque siccum in sicciore, & aliorum utrunque eodem modo: sed indiget semen quidem frigidius utero tantò calidior, quaniò deficit ab optima temperatura: & humidius, sicciore: & in alijs eodem modo.

LXV.

Γάλα διδόναι κεφαλαλγέσι, κακόν. Κακόν ὅ καὶ πυρεταίνουσι, καὶ οἷσιν ὑποχόνδρια μετέωρα ἀφ' ὁρδορίζονται, καὶ τοῖσι διψώδεσι. Κακόν ὅ καὶ οἷσι χολώδεις καὶ ἀσχωρήσιες, καὶ ἐν τοῖσιν ὀξέσι πυρετοῖσιν ἐοῦσι, καὶ οἷσιν αἷματος πολλοῦ ἀσχωρήσιες γέρονεν. Ἀρμόζει δὲ τοῖσι φθινώδεσι μὴ λίαν πολλὰ πυρέσσει διδόναι γάλα, καὶ ἐν πυρετοῖσι μικροῖσι καὶ βληχροῖσι μηδενὸς τῶν περὶ ρημάτων σημείων παρέοντος, ὡς λόγον ὅ ἐκτεταχέσι.

Lac dare caput dolentibus, malum: malum verò & febricitantibus, & quibus hypochondria suspensa murmurant, & siticulosi: malum autem & quibus in febribus acutis biliosæ sunt deiectiones, & quibus sanguinis multi deiectione facta est. Convenit autem tabidis qui non multum febricitant, & in febribus longis & parvis, si nullum

ex supradictis signis affuerit, & prater rationem consumptis.

Quando in ijs qui integra sanitate fruuntur videmus lac capiti dolorem afferre, & ilium inflare: nihil mirum quod ijs qui iam caput dolent, vel suspensa habent, hoc est inflata & flatuosa ilia, sit inimicissimum, ventrem siquidem flatibus implere consuevit, & quia facile euaporat, caput petit ac dolorem auget. Hac ratione quidem bonum est febricitantibus, quia frigidum humidum: Sed hac ratione malum, quia facile acescit & corrumpitur in ventriculo, prompteq; vertitur in bilem, & quia flatulentum, generat vapores, qui elati in caput, ipsum replent & tendunt. Si ibundis etiam est inimicum, & ijs quibus biliosa deiciuntur, & acutè febricitantibus: nam in uniuersum didicimus, quod celerrimè ab omnibus causis calidu lac ad fumosum alteratur. Rationabiliter itaque dicitur hu passionibus lac plurimum aduersari. Conuenit autem tabidis quia pus quod in pulmone est coaceruatum, abstergit, ulcera eiusdem conglutinat, ac agros nutrit: Conuenit autem dummodo non adsit magna febris: conuenit & in febribus longis & paruis: ut & ijs qui alia ex causa supra modum sunt extenuati, quibus est necessarius cibus bonum generans succum, & qui citò per venas distribuatur, si nullum ex supradictis signis, ut capitis dolor,

dolor, febres acuta, tumida hypochondria, &c. ob-
stitit.

LXVI.

Οι ὁποῖοι οἰδήματα ἐφ' ἑλκεσι φαίνετα, οὐ
μάλα σπάνια, ἐδὲ μόνοντα. τετέων δ' ἀφανι-
θέντων ἐξαιφνης, ζῖσι μὲν ὅπιδεν πασμοῖ, τέ-
πανοι, ζῖσι δὲ ἐμπεσθεν μανία, ὁδύνα, πλδρρδ
ὁξεία, ἢ ἐμπύησις, ἢ δυσεντερία μὲν ἐρυθρὰ ἢ ζᾶ
οἰδήματα.

Quibus tumores in vlceribus apparent, ij
rarò conuellantur, neque insaniunt: si verò
repentè euanescent, iis quidem quibus à
tergo vlcera fuerint, conuulsiones & disten-
siones accidunt: quibus verò in anteriori-
bus partibus vlcera fuerint, mania, aut lateri-
s dolor acutus, aut suppuratio, aut dysen-
teria si rubri fuerint tumores:

Quibus tumores in vlceribus apparent, ἢ rarò
conuellantur, neq; insaniunt, quia materia con-
uulsionis circa vlcera ipsa haeret, nec ad neruosas
partes aut cerebrum transmittitur. Si verò tu-
mores repentè euanescent qui prius apparebant
in dorso, conuulsiones excitabunt in neruosis par-
tibus maximè: posteriora siquidem neruosa sunt,
anteriora venosa atque arteriosa. Qui autem in
anterioribus partibus euanescent, insaniam, si
humor feratur ad caput, inducent: aut lateris do-
lorem, si idem ad thoracem conuertatur. Sed si

non dissoluatur humor, intra thoracem & pulmonem se recipiente puris materia, suppurationem facient. Caterum ad intestina translatis humoribus noxijs dysenteria accidet cruenta, si tumores rubri fuerint.

LXVII.

Ἡν τραυμάτων ἰχυρὰν ἐόντων καὶ πονηρὰν οὐδὲν φαίνεται, μέγα κακόν.

Si in vulneribus pravis & magnis tumores non apparent, ingens est malum.

In vulneribus effatu dignam magnitudinem habentibus, si tumor non apparet, malum est, quia suspicio est humorem noxium ad partes principes transmitti, qui ad vulnera ipsa confluere deberet propter dolorem ibi existentem, quippe dolor attrahit, & fluxiones concitat. Hinc intelligitur quod deicta natura vincitur.

LXVIII.

Τὰ μαλακὰ καὶ τὰ ἄκρα κακὰ.

Molles tumores, boni: crudi verò, mali.

Molles tumores significant materiam minimè rebellem: duri verò, & qui digitis non cedunt, significant materiam crudam, crassam, valenter impactam. Non enim fieri potest ut sit tumor renitens, bene concoquente membri natura humores ad ipsum confluentes.

Τὰ ὀντι-

Τὰ ὁποῖα ἐν τῇ κεφαλῇ ὁδονομεῖται, ἢ ἐν
μετώπῳ ὁρῶν δὲ εἰς τὴν δεξιάν, ὡς ἐπεί.

Dolenti posteriorem capitis partem, re-
cta in fronte vena secta prodest.

Non solum studet Hippocrates, ubi sit opus e-
vacuare, sed etiam cum auersione. Auersio autem
ad contraria sit: secundum longitudinem qui-
dem, infra supra: secundum latitudinem vero,
ad dextram & sinistram: secundum profundita-
tem, ad anteriora & posteriora. In dolore itaque
partis capitis posterioris, quando humor affligens
in capite continetur, vena recta in fronte secta
prodest, hoc est, ex vena qua secundum rectitudi-
nem filamentorum respondet ei qua partem af-
fectam alit: Sicuti & in anteriori dolore capitis
vena in occipite secta iuuat. Sic enim diuturna
ocularum fluxiones saepius sanatae sunt ex occipi-
te sanguine misso, una cum cucurbitula v. m. Por-
ro si plethoricum esset corpus, non esset huic re-
medio locus, nisi prius liberatis obstructionibus,
& purgato corpore universo.

Πῶς δὲ γίνεται γυναιξὶ μὲν ἐξ ὁσφύος, ἢ ἐκ
λουρῆς, ἢ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, αὐθιγὰς ἢ μακρὰς
ὁποῖα ἐν ἡμέρᾳ ἢ ἐν σάματι, οἷον ἀπὸ τε πρ-
χέων ἢ μερῶν. ἅταρ ἐπὶ τὸ δέριον δραστικόν. ἢ λοιπὸν
τοῦ ὁρῶν.

Refrigerationes incipiunt mulieribus quidem à lumbis magis, & per dorsum ad caput percurrunt, sed & viris in parte posteriore potius quam anteriore corporis, veluti cubitis & femoribus: Sed & cutis rara: indicio autem est pilus.

Partes posteriores non in foeminis tantum, sed & in viris paratiores sunt recipere frigiditatem, quae celerrimè facta per spinalem medullam, compassione recurrit ad caput, principium nervorum. Partes autem anteriores non ita frigori sunt obnoxiae, quoniam calidiorem habent temperaturam: Cuius rei argumentum sumit ex cutis raritate, huius verò ipsius rursus ex pilorum multitudine.

LXXI.

Οἱ γὰρ τεπερταίων ἀλίσκομενοι ὑπὸ πασμῶδ' ἔπεινυσι ἀλίσκονται. ὡς δὲ ἀλίσκονται πρὸς τεργον, εἴτοι ἐπιλήνται τεπερταῖ ὁ παύονται.

Qui quartana laborant, convulsionibus omnino non capiuntur: Si verò antea capiuntur, & subinde quartana succedat, cessant.

Quae quidem fit ex evacuatione convulsio acutissima est & perniciosissima. Quae verò ex repletionem partium nervosarum, qualis in morbo comitiali fit, neque acutissima, neque similiter periculosa est. Hanc itaque convulsionem quartana non

solum prohibet fieri, verum si prius facta est soluit. Fit autem ab humoribus lentis ac pituitosis, qui partibus nervosis inserti sunt. Cum verò horum humorum duplex sanatio sit, excretio scilicet, & coctio, utranque quartana habet, excretionem quidem ex rigore (hec enim sola agitatio sufficiens est crassum excernere humorem) coctionem autem caloris febrilis ratione, qui rigorem consequitur.

LXXII.

Ὅσοισι δὲ ῥεῖται τὸ ἐκτείνετα κερφαλέα καὶ σκληρά, αὐτοὶ ἰδρώτων τελευτῶσιν. ὅσοισι δὲ χαλαρά, καὶ ῥοαία, αὐτοὶ ἰδρώτι τελευτῶσιν.

Quibus cutis obtenditur arida & sicca, sine sudore moriuntur: Quibus verò laxa & rara, cum sudore intereunt.

Morituri, qui quidem squalidas, duras, & siccas habent cutes & extensas, sine sudore moriuntur, quòd scilicet ob febris vehementiam humiditas omnis exhausta sit: Quibus contra laxa & rara est cutis, cum sudore moriuntur, quòd videlicet cuti illi insit adhuc aliqua humiditas, quæ iam propter extremam retentricis facultatis imbecillitatem exit.

LXXIII.

Οἱ ἐκτεράδες ἔπαινν. πνδρμγ. τῶδε εἰσι.

Qui regio morbo laborant non admodum flatuosi fiunt.

Flatuosos dicit, qui colligunt in ventre multitudinem venti flatuosi, qui vel per ructus vel flatus excernitur, vel remanet & extendit quæ inibi sunt. Fit autem hoc nonnunquam ob debilitatem, & partium ad ventriculum attinentium imbecillitatem, nonnunquam verò ex pituitoso & frigido humore. Hi itaque qui propter pituitosum humorem flatuosi sunt, contrarij sunt regio morbo laborantibus, utpote biliosis: nam icterus fit à bile flava calida sicca, flatus sunt à materia frigida humida: Quò fit ut icterici ex humoris exuperantis natura non fiant flatuosi, nisi forte id accadat ob imbecillitatem partium.

APHORISMORVM

HIPPOCRATIS

Sectio VI.

APH. I.

ΕΝ τῇσι χρονίῃσι λευεντέλεισιν ὁ ξυρετικὸν ἐπιχρῶμεν μὴ χρῶμεν αἰτέρον, σημεῖον ἀγαθόν.

In longis leuitatibus intestinorum, si ructus acidus superueniat qui prius non erat, signum bonum.

Liente.

Lienteria, seu leuitas intestinorum, est passio per quam cibi celerrimè, priusquam permutacionem accipiant, dilabuntur. Hæc si ab imbecillitate est facultatis retentricis & concoctricis ventriculi & intestinorum, ob aliquam eorum intemperiem, deiectiones habet absque dolore. Si verò ab humorum acrimonia superficiem intestinorum abradente, cum dolore permeat cibus & potus. Hic autem ipsi sermo est de ea leuitate, quæ ex intemperie orta, retentricis facultatis imbecillitatem sequitur: Cui si succedit ructus acidus, significat calorem natium augeri, & cibum assumptum tantisper in ventriculo retineri, donec mutationis coctionisve principium accipiat, & naturam sui tandem officij reminisci.

II.

Οἱσι πῖνες ὑπερτέρεαι φύσιν, καὶ ἡ γυνὴ ὑπερτέρεη, ὑπαινοῦσι νοσητέον. οἱσι δ' αὖτις, ὑπερτέρεον.

Quibus nares natura humidiores, & genitura humidior, minus integra sanitate fruuntur: Quibus verò contra accidit, salubrius degunt.

Qui laborant humida intemperie pluribus morbis sunt obnoxij: nam distillationibus ex parua occasione capiuntur: & si superfluitas eis ad inferiora descendat, partes subiectæ facile offen-

duntur, fauces, guttur, aspera arteria pulmo, gula, ventriculus. Tussis itaque in ipsis fieri, & difficiles anhelitus, & anginas cruditatesq; & ventris profluvia, est necessarium. Præterea corporis uniuersi humiditas febribus putridis, & alijs morbis à putredine natis obnoxia est, nec non grauitati capitis, qua subinde comitiales morbum inuehit. Qui verò sicci sunt, ij dolent minus sæpe quidem, sed periculosius. Porro nares humida vel sicca cerebri dispositionem indicant. Semen autem genitale cum decidat ex omnibus corporis partibus, fidele testimonium habet de temperatūra totius corporis. Alioqui ex temperatūra partis unius, frustra aut non nisi dubiè pronuntiaremus de totius corporis temperamento, ut Phidias statuarius ex ungue leonem totum aestimantes: ut docetur in libro de temperamentis.

III.

Εν τῇ μακρῇ δυσεντερίᾳ αἱ δυνάμεις
καὶ οὐκ ἐπὶ τῇ ῥέσει.

In longis difficultatibus intestinorum cibi fastidium, malum: & cum febre, peius.

In dysenterijs longis difficultatibus intestinorum, si ventriculus, ipsis compatiens, nec appetit, nec probè concoquit, id significat partem eorum humorum acrium à quibus exulcerantur intestina, ad os ventriculi efferri, qui mortificationem ipsi ventriculo ac nutriti facultati comminantur: Si

tur: Si verò una cum fastidio febris adueniat difficultati intestinorum, duorum alterum est, vel putredo aliqua est circa ulcera, vel magna inflammatio, atque ita agri se habent exitialiter.

I V.

Τὰ ἐν μέσθῳ ἐλκεα, κακὰ ἴσθια.

Vulnera undique glabra, maligna sunt.

Quum videris pilos à circumiacentibus ulceri locis defluentes, vel cutem squamulas è summa parte dimittere, scito ijs qui ita se habent, prauos humores ad partem confluere, qui ulcus erodunt, & pilorum radices depascuntur, nec permittunt ulceratum locum ad cicatricem peruenire.

V.

Τὸν ὀδυνῶν καὶ ἐν πλάτῃσι, καὶ ἐν στήθεσι ἐν τοῖσιν ἄλλοισιν, τὸ μέγα διαφορῶσι, κατὰ μέρος.

Dolores laterum & pectoris, aliarumque partium num multum praeualeant differente, considerandum.

Hoc aphorismo admonemur ne temerè precipitemus sententiam de aliquo affectu assignando curandove, priusquam eius causa cognita sit, eius differentia, & natura partis affecta, ne cum capiti sit medendum, reduitiam curare videamur. Non enim simpliciter partium dolores considerare oportet, neque arbitrandum eandem esse tempo-

rum rationem, aut similem in omnibus hominibus dispositionem: veluti si prius quidem Dion, postea vero Theon costam doluerit, non eodem modo se utrumque habere existimandum, sed considerare oportet, nunquid maxime inuicem in dolore differant, an quodammodo similes existant: Fit autem hoc ex duobus perspicuum, ex doloris specie, & ex vehementia: ex specie quidem, si pungenti similis, vel tendenti, vel torporem inducenti, vel grauanti, vel lancinanti, aut rodenti, vulneranti, vel continuis, vel cum intermissione, vel aequalis, vel inaequalis. Secundum autem vehementiam, quis sit maior aut minor, aduerendum.

V I.

Τὰ νεφροῦ καὶ ἐνδοῦ καὶ τῆς νύκτις ἀλγύμενα,
ἐργασθῶς ὑγιαινεῖται τοῖς πρεσβύτοις.

Renum & vesicæ vitia in senioribus difficulter sanantur.

Vix sanantur in quibusvis, quoniam renum opus & vesicæ indefinens est, quietem autem requirit sanatio: & quia excrementum acre exacerbare natum est, siue vlcus, siue inflammatio, siue aliqua alia passio in ipsis constiterit. Verum in senibus, non tantum renum & vesicæ vitia difficulter sanantur, sed & omnes alij morbi, præcipue longi, qui maxima ex parte comitantur eos.

SECTIO VI.

211

ad mortem: Concoqui enim non possunt ob virtutis imbecillitatem & nativi caloris inopiam.

VII.

Τὰ ἀλγέμενα τὰ κατὰ τὴν κοιλίαν γινόμενα, τὰ μὲν μετέωρα, καὶ φρότερα. τὰ δὲ μὴ μετέωρα, ἰσχυρότερα.

Dolores ventris sublimes, leniores: qui verò non sublimes, fortiores,

Sublimes hic dolores appellat, qui supra peritoneum quasi in superficie sunt; qui verò infra, hoc est in ipsis intestinis atque ventriculo, & in profundo, non sublimes. Porro dabitur non est, quia affectus interni multò periculosiores sint externis, nec tam facile partibus principatum aliquem obtinentibus adhibentur remedia.

VIII.

Τοῖσιν ὑδρωπικοῖσι τὰ γινόμενα ἔλκεα ἐν τῇ σάρκει, ὁ πρὸς τὴν ὑγίαν ὁμαλίζεται.

Aqua inter cutem laborantibus, ulcera quæ in corpore fiunt, non facile sanantur.

Docuit ipse in libro de ulceribus, non prius ad cicatricem ulcera perducì, quàm omnino exsiccantur: hoc autem non facile fit in Hydropibus, ob humiditatis immoderantiam, necnon ob sanguinis boni penuriam.

IX.

Τὰ πλατῆα ἐξαιθήματα ἔπαιντι κνησμά-
δεα.

Pustulæ latæ non valdè pruriunt.

*Lata pustula non admodum pruriunt ob du-
plicem causam: diffiantur enim in latitudinem
extensa, & facientem ipsas humorem minus a-
crem habent.*

X.

Κεφαλὴ πονέοντι καὶ πρῶτον πόνον ἢ
ὕδωρ ἢ αἷμα ῥυέν καὶ τοῖς ῥίνας, ἢ καὶ τὸ στόμα, ἢ καὶ
ἐκ τῶν ὠνέων ἐκέρχεται.

*Caput dolenti, & vehementer laboranti,
pus vel aqua, vel sanguis effluens per nares,
aut os, aut aures, morbum soluit.*

*Quando contigerit dolorem capitis fieri, vel
propter inflammationem, vel humorum crudo-
rum multitudinem in capite acervatorum, tunc
inflammatione suppurata, & humore excreto, so-
lutio fit morbi. Si verò propter spiritum flatuo-
sum, aut bilem mordacem, aut omnino ex in-
temperatura dolor acciderit, per alia curabitur:
Quippe flatus extenuantibus & discutientibus,
bilis, medicamento eam purgante, & intempera-
tura remedijs eam alterantibus, sanabitur.*

XI.

Τοῖσι μυαλχολικῶσι καὶ τοῖσι νεφροπικῶσι αἰ-
μορροϊδὲς ἐπιγινόμενα, αἰσθάνονται.

Me-

Melancholia & nephritide laborantibus hæmorrhoides superuenientes, bonum.

Quod mulieribus est purgatio menstrua, hoc melancholia morbo laborantibus est purgatio per hæmorrhoidas, in quas sese exonerat lien, si quando humore melancholico grauetur. Renes etiam cum ab humore crasso & terreo nephritide vexantur, ex fluxu hæmorrhoidum sentiunt non mediocre leuamen.

XII.

Αἱμορροΐδας ἐν τῇ πνεύματι καὶ μὴ μόνον φυλάττειν, κίνδυνος ὅτι ὕδρωπι ἐπιληνέσθῃ, ἢ φθίσιν.

A diuturnis sanato hæmorrhoidibus si vna non seruetur, periculum est aquam intercutem, vel tabem aduenire.

Hæmorrhoides fiunt ob multitudinem & crassitudinem sanguinis ora venarum, quæ terminantur ad anum, aperientis, hepate ad ipsas reponente facem, & aliquando sanguinem melancholicum. Si quis igitur ei hoc intercludat iter, nec unam ex hæmorrhoidibus relinquat apertam, periculum est ab hydrope vel tabe. Regurgitat enim sanguis ille crassus & faculentus, qui per hæmorrhoidas solebat fluere, in totum corpus. Si in hepar, & vi prepolleat, calorem nativum extinguet, ac ita peribit sanguificatio, unde hydrope: Si in pulmones ruat, excitabit vlcus, unde phthisis accidit. Quare non frustra consulis

unam saltem seruare hemorrhoidem, ut per hanc euacuetur faculenta ac vitiosa materia hepatis, praesertim in quibus solita est tempore longo per tales venas excedere.

XIII.

Υπὸ λυγροῦ ἐχορδαῖω πτερυγὶ ἐπιχρόμασι λύσει τὸν λυγρὸν.

Singultienti sternutamenta si superuenerint, tollunt singultum.

Au' or ipse est singultum, ut conuulsionem, fieri vel ex inanitione, vel plenitudine. Quando igitur à plenitudine fit (magna autem ex parte ita fit) violento opus est motu, ut veluti conclusa ipsum efficientes humores ditates diffrentur atque euacuentur: hoc autem facit sternutatio. Sternutando enim non solum cerebrum, sed & ventriculus, ob nervos ad eum derivatos, vehementer concutitur.

XIV.

Υπὸ ὕδατος ἐχορδαῖω ὁ καὶ τὰς φλέβας ἐς τὴν κοιλίαν ὕδατος ῥυέντος, λύσις.

Aqua inter cutem correpto si aqua, quæ in venis est, ad ventrem defluerit, mali fit solutio.

Hoc exemplum est unum earum quæ sponte & utiliter sunt euacuationum, si aqua hydropicorum à iecore ad intestina derivata per alium excernatur: spontaneum autem dicimus, non quod

quod sine causa fit: sed sine causa nostra fit: Quando enim data medicina aquam educente talis fit euacuatio, nequaquam hanc spontaneam nominamus. Quare cum sic utiliter euacuetur aqua hydropicorum à natura, hanc in operibus suis turò imitabitur medicus.

XV.

Υπὸ Ἀγρρόλης ἐκρῶν μακρῆς, ἀπὸ τῶν τομῶν
τῶν ἐμετῶν ἐπιπλοῦν. ὁ λυεὶ τὴν Ἀγρρόλην.

Longo alui profluvio laboranti spontaneus vomitus superueniens morbum soluit.

In diuturno alui profluvio vomitum utiliter mouet natura, qui in contrarium retrahendo malum sanat: hoc unum est eorum quæ rectè à natura facta medicum imitari oportet.

XVI.

Υπὸ τῶν εἰπιδῶν ἢ ὑπὸ τῶν εἰπιδῶν ἐκρῶν
Ἀγρρόλην ἐπιπλοῦν, κακόν.

Pleuritide & Peripneumonia correpto alui profluvium adueniens, malum.

Vehementer laboranti pleuritide, vel peripneumonia, profluvium alui superueniens malum est: significat enim hepar, ob cōsensum quem habet cum partibus respirationi inservientibus, ita malè affici, ut præ imbecillitate non possit ad se attrahere alimentum, neque conuertere in sanguinem. Verùm in mediocri pleuritide, atque

mitiori peripneumonia profluuium alui potest
prodefferatione euacuationis, praesertim ubi in
morbis signa coctionis apparuerint.

XVII.

Οφθαλμοὶ ὄντες ὑπὸ Διὰ ῥοῆς ληφθῶσιν, ἀ-
γαθόν.

Lippientem alui profluuium corripit, bo-
num.

*Quae recte à natura sunt, ea medicus imite-
tur in lippitudine, aluum subducens, ut humor
à quo fit talis affectus, ad inferiora deriuetur.*

XVIII.

Κύσιν Διὰ κοπέντι, ἢ ἐγκέφαλον, ἢ καρδίαν, ἢ
φρένας, ἢ τῶν ἐντέρων ἢ τῶν λεπτῶν, ἢ κοιλίαν, ἢ
ἢ παρ, θανάτωδες.

Profundum vesicae vulnus, cerebri, cor-
dis, praecordiorum, intestinorum tenuium,
ventriculi, iecoris, lethale.

*Vesica profundius vulnerata, lethale est si-
gnum: nam vulnus quod ad eius interiora pro-
greditur, coalescere non potest: est enim vesica
neruosa, tenuis, & exanguis: collum autem eius,
quia carnosum est, videmus quotidie sanari
quando lapis extrahitur. Porro quod vulnera-
tum cerebrum, & cor, mortem affert inenitabi-
lem, unum ex ijs est quae in confesso habentur. Si-
quidem in corde ac septo transverso, ob iugem
n. o. um, vulnus coalescere non potest. Tenuium
autem*

autem intestinorum natura, & ventriculi, non
parum habet carnosæ substantia, & ideo ipsa in
summa parte vulnerata sæpius agglutinantur,
discissa verò usque ad eorum cavitatem, rarissi-
mè. Hepatis vulnera multo sanguine madent,
itaque prius ita vulnerati moriuntur, quàm
vulnera agglutinari possint.

XIX.

Επὶ τῷ Διφρηπῇ ὀστέον, ἢ χόνδρῳ, ἢ νευρῶν, ἢ
γνάθῳ ἢ λεπτόν, ἢ ἀκροποδίῃ, ἔτε αὐξήται, ἔτε
συμφύεται.

Quum discissum fuerit os, aut cartilago,
vel nervus, vel genæ particula tenuis, vel
præputium, neque augetur, neque coalescit.

Os, vel alia quavis pars spermatica, nisi in
admodum parvis non glutinatur primo & per
se, sed interuentu alterius, nam à medulla effici-
tur callus, quo confirmantur partes ossis effracti:
Sic nec cutis unquam regeneratur, licet aliquid
regenerari possit loco cutis: causa, quia omnes
partes spermatica sunt exangues & frigida, &
parum habentes alimenti.

XX.

Ἡν ἐς τὸν κοιλίῳ αἷμα χυθῇ πρὸς φύσιν,
αὐτὰρ κη ἐκπυηθῶται.

Si in ventrem sanguis præter naturam ef-
funditur, necesse est iuppurari.

Si vase rupto vel aperto prater naturam, sanguis effunditur in aliquam capacitatem, necesse est ut corrumpatur.

XXI.

Ταῖσι μενοειδέσιν κιστῶν ἢ αἰμορροΐδων ἐπι-
μυοειδῶν, τῆς μηνίης λύσις.

Infanientibus si varices vel hamorrhoides superuenerint, infanix solutio.

Hic insaniam, quæ propriè melancholia dicitur, vocat, non illum qui fit ex bile furorem. Est autem varix cum vena latiores sunt in femore & cruribus: quod ex crasso & melancholico humore contingit, adeo quòd pellente natura ad partes ignobiliores eos qui insaniam efficiunt humores, & præsertim cum melancholici fuerint ac crassi, varicum aut hamorrhoidum generatio sequitur, & infania solutio.

XXII.

Οἷασι ῥήγνεται ἐκ τοῦ σώματος ἐς τοὺς ἀγκύνας κατὰ βαίνε, φλεβοτομὴν λέει.

Quæcunque ruptiones ex dorso ad cubitum descendunt, venæ sectio soluit.

Quoniam ruptiones ipsas descendere unum eorum est quæ fieri queunt, intelligendi sunt dolores in ruptione excitati ex defluxu humorum in eam partem decumbentium: qui, si euacuentur

per

SECTIO VI.

219

per vena sectionem in cubito existentis, quando
huc apparent fluentes fieri malis solutio. Est enim
praeceptum eius, secundum quod humores repunt,
facere euacuationes per loca conferentia,

XXIII.

Ην φόβος καὶ δαδυμὴ πολὺν χρόνον ἀγα-
λῆν, μελαγχολικὸν ἔστι τοιοῦτον.

Si timor atque mœstitia longo tempore
perseuerant, melancholiam significant.

Metus & mœstitia si longum tempus perseue-
rent absque causa manifesta externa, sunt atra-
bilis casus manifesti: Sed si propter aliquam cau-
sam incipientes deinde inueterascant, insaniam
melancholicam portendent. Nam plures visi sunt
furore correpti, qui ab excandescencia, vel ira, vel
mœstitia principium habuere, ipso scilicet corpore
ad id inclinato ut in talem passionem incideret.

XXIV.

Εντέρων ὡς ἀκαχοπῇ τῇ λεωτῇ π, & ξυμ-
φύεται.

Si quod intestinorum gracilium discin-
datur, non coalescit.

Eadem sententia paulò antiè exposita est.

XXV.

Εξυπίπελος ἔξωθεν μὲν εἶσω τρέπεται, ὅσον αἰ-
γάρον. εἶσωθεν ὃ ἔξω, αἰγάρον.

T

Erysipelas ab exterioribus verti ad interiora, non est bonum: ab interioribus autem ad exteriora, bonum.

Non solum erysipelas, sed aliud quodcunque malum quod ex profundis & principibus partibus transfertur ad cutem, bonum esse signum & causam existimare debemus. Si verò contrà ad interiora & profunda transmutetur, malum: nam quicquid est illorum humorum à quibus erysipelas nascitur, ad partes principes protrahitur, unde praesens vita periculum imminet.

XXVI.

Οἱ ὅσοι σιν αὐτὸ ἐν τοῖσι καύσοισι τε ὄρωσι γίνοντο, τὸ θαλερόν τε λυεῖ.

Quibus in ardentibus febribus tremores fiunt, iis delirium succedit.

Quae febrem ardentem efficiunt cause in venoso genere existentes, quando ad nervos transferuntur, primum tremores faciunt, compatiens verò principio, etiam deliria: quae non tantum non liberant hominem, sed ei etiam plus periculi creant.

XXVII.

Οἱ ὅσοι ἔμπυοι ἢ ὑδρωπικὸι καίονται ἢ τέμνονται, ἐκρυέντος δὲ πύρι καὶ δὲ ὑδατος ἀφρός, πάντως ἀποκίωται.

Quicumque suppurati aut aquam inter cutem patientes vruntur aut secantur, si pus aut

aut aqua vniuersim effluerit, omnes moriuntur.

Omnes euacuationes quæ semel vniuersum educunt, periculosas esse docet, exemplo suppuratorum & hydropicorum: Nam puris in suppuratione, & in hydropicis aqua vniuersa euacuatio lethalis est quippe una cum humore spiritus vitalis vacuatur, atque è vestigio deficit anima, & vires debilitantur, & debilitas ista remedium presens cum non habeat, moriuntur. Neque hoc fit propter pus, quod omnino malum est & noxium, sed quia simul cum pure spiritus multi ex vasis arteriosis exeunt, unde periculum. Hydropici verò periclitantur etiam ab aëre frigido, qui plurimus subit locum aqua confertim euacuata, & reliquum calorem natium extinguit. Idem est periculum mulieribus quæ nuper pepererunt.

XXVIII.

Ευνόχοι & ποδάγρα εἰσὶν, & δὲ φάλακρῃ ζήνουνται.

Eunuchi neque podagra laborant, neque calui efficiuntur.

Eunuchi, præsertim Hippocratis tempore, podagra non laborabant, quod cum reginis inservirent, ocio prorsus non uterentur, nec coitu nervosas partes debilitante, & quod moderata victus ratione contenti viverent. Item calui non fiebant, mulieribus enim similes multam humidi-

tatem redundantem obtinent ad capillos assidue fluentem, unde ipsi capilli augentur & nutriuntur.

XXIX.

Γυνὴ ἐ ποδαγείᾳ, ἢ μὴ τὰ κατὰ μῆνα αὐτῇ ἐκλείπῃ.

Mulier podagra non laborat, nisi menstrua defecerint.

Ob retentos menses, mulieres podagra laborabant, & nulla alia de causa, quia moderata vitæ ratione utentes sobriè vivebant, & mediocriter exercebantur.

XXX.

Παῖς ἐ ποδαγείᾳ, πρὶν τὸ ἀφροδισιασμεῖν.

Puer podagra non laborat ante usum venerorum.

Quòd magnam vim habeat ad generationem podagra venerorum usus, licet eunuchorum exemplo & puerorum.

XXXI.

Ὁδυνὰς ὀφθαλμῶν ἀκρητοποσίη, ἢ λυγρὸν, ἢ πυρίη, ἢ φλεβοτομίη, ἢ φαρμακείη λύει.

Dolores oculorum meri potio, aut balneum, aut fomentum, aut venæ sectio, aut medicamentum, purgatorium soluit.

Non sunt hæc usurpanda remedia sine determinatione, cum oculorum dolores aliqui meri potu solvantur, alij balneo, nonnulli venæ sectione

aut

aut medicamento. Nam quibus sanguinis crassioris copia in oculorum venulis continetur sine plethorica dispositione in toto corpore, ij vini potu iuantur, ut pote quod excalfacere, diffundere sanguinem, & sui motus vehementia obstructions aperire ac digerere possit. Balneum autem confert ijs in quib. cum nulla cruditatis signa appareant, nec sit plenum corpus, in oculos tamen influunt acres humores, qui balneo dulcis aqua fusi aut excernuntur, aut certe dilui mitigantur. Porro fomentis calidis locus est, ubi fluxus constitit, ut discussio fiat eius quod in oculorum tuniis superflue derelictum est: vel si aliquid adhuc influit, fomentum adhiberi potest, non ut causa salubris, sed ut qualis sit agri dispositio certius inde cognoscatur. Hic (ut ubiuis alibi) caute se gerat medicus, ne dum fomento dolori medetur, alteram fluxionem irritet. Nam quia ratione fatus potest id quod in oculis continetur discutere, eadem potest ex vicinis attrahere novam fluxionem. Prodest ergo, vel tanquam causa sanitatis oculorum, vel tanquam signum ad dignotionem, unde nos dispositionem agri comprehendentes ad totius corporis euacuationem perueniamus: ipso quidem sanguine redundante, per venae sectionem: sed malicia humorum infestante, per purgationem eius qui molestus erit: neque enim est difficile admodum distinguere cacochymiam à plethora.

Τραυλοὶ ὑπὸ Ἀγρίοτης μέλιντε ἀλίσκονται
μικρῆς.

Balbi ab alui profluuiio maximè capiun-
tur.

Contingit ijs qui natura balbi sunt alterum
horum, aut cerebrum habere humidum, aut lin-
guam, vel utrunque. Et cerebro quidem talem
sortito temperaturam, defluere ab eo multas hu-
midas superfuitates par est, atque inde fluentes in
ventrem suscipi: unde & longis profluuijs homo
capitur. Lingua verò admodum humida natura
existente, & ventriculum talem esse par est, ut
qui alteram tunicam communem habeat cum
lingua. Imbecillis autem ex humiditate ventri-
culi propria passio est diuturnum profluuium.

Οἱ ἐξυγεγμιώδεις ἔ πᾶντι πλὺς ἐπιπρὶ γί-
νονται.

Qui acidum eructant, non valde morbo
lateralis corripuntur.

Lateralis morbus, licet ab alijs humoribus or-
tum habeat, ferè tamen est à bile flaua semper aut
foi'a, aut cum alijs mista: ructus autem acidus à
pituita & frigidityte, corruptis scilicet in ventri-
culo: ubi à frigore & pituitosis humoribus. Ob
hanc, igitur causam qui acidum ructum habent.

AME

aut quibus superabundat natura pituita, raro à morbo laterali corripuntur.

XXXIV.

Οἱ ὅσοι φαλακροὶ, τῶν τοιούτων κίρσοι μεγάλοι γίνονται. οἱ ὅσοι δὲ αὐτῶν φαλακροὶ σὺν ἰοδὶ κίρσοι ἐπιχρῶνται, πάλιν ἔτι γίνονται δασέες.

Qui capillorum defluvio laborant, iis varices magnæ non fiunt: quibus verò capillorum defluvio laborantibus varices superueniunt, iis capilli denuò nascuntur.

Calui, & ante tempus depilati ob malum aliquod, veluti propter alopeciam aut ophiasim, iis varices non fiunt, quòd tum vitiosi humores ad caput & non ad crura ferantur. Quibus verò caluis & capillorum defluvio laborantibus varices superueniunt, ij rursus capillati fiunt: nam vitiosi humores, qui antea radices capillorum corruperant, ad crura transferuntur.

XXXV.

Τοῖσιν ὑδρωπικῶσι βῆξ ἐπιχρῶμεν, κακόν.

Aqua inter cutem laborantibus tussis superueniens, malum.

Superuenire passionibus alias passiones priscè medici dicere consueverunt, qua ratione ipsius passionis adauctæ contingunt. Neq; enim cùm ex alia fit occasione in homine aquam inter cutem patiente, tussis signū est exitiale, sed quando ipsius morbi ratione. Cùm enim in passione tali aquosa

humiditas tantum adaucta fuerit, ut iam asperam arteriam occupet, tussis superueniens periculum suffocationis adfert.

XXXVI.

Δυσουρίῳ φλεβοτομήν λύει. τέμνειν δὲ τοῖς εἴσω.

Difficultatem urinae vena secta iuuat, fecare verò interiores.

Difficultatem urine, eam videlicet quae propter inflammationem sit aut multitudinem, eius vena sectio soluit, quae in poplite & malleolo est: haec siquidem vena, partium quae infra iecur sunt, uteri potissimum & vesicae, malis confert. Huc pertinet Aphorismus 49. lib. 7.

XXXVII.

Υπὸ κυάγχης ἐρυθρῶ οἴδημα χυεῖται ἐν τῇ τραχήλῳ, ἀγαθόν· ἔξω γὰρ τρέπεται τὸ νέσμα.

Angina correpto si tumor fiat in collo, bonum: foras enim morbus deducitur.

Sermo verus est. & causa in promptu, siquidem humores noxios ab internis ad externa transferri conducit.

XXXVIII.

Οἷοισι κρυπτοὶ καρκῖνοι γίνονται, μὴ θεραπεύειν βέλπον. θεραπεύομενοι γὰρ ἀπόλλυνται ταχέως, μὴ θεραπεύομενοι δὲ πλείω χρόνον διατελοῦσι.

Can-

SECTIO VI.

227

Cancros occultos habentes, melius est non curare: curati enim citò pereunt, non curati longius tempus perdurant.

Cancros minime apparentes, sed in profundo corporis existentes melius est non curare, siue medicamentis, siue sectione, siue vstione, quòd ita magis irritentur, ac agri citius intereant: placandi igitur ac mitigandi potius medicamentis dolorem sedantibus, saniemq; eluentibus.

XXXIX.

Σπασμὸς γίνεται ἢ ὑπὸ πληρώσει, ἢ κενώσει. ἔτι καὶ λυγμὸς.

Conuulsio fit, vel ex repletione, vel inanitione. Ita verò singultus.

Quemadmodum conuulsio duas habet causas, plenitudinem & inanitionem, nimirum neruis crassa materia oppletis, aut supra modum exsiccatis, & ad suum principium contractis, ita & singultus. Singultus enim quasi quadam conuulsio est ventriculi cibos cum salu motuq; concussio retinentis. Nam ventriculus eo motu tentat ea quae sunt in ipsius ore penitus impacta expellere, subindeq; valide excitatur, ut eo succussu quod nocuum est vacuetur. Potest tamen fieri singultus & ab alijs causis, ut à corruptis in ventriculo cibis, à mordacibus humoribus, à frigidityte, &c.

X L.

Οἷοισι δὲ τὸ ὑποχόνδριον πόνοι γίνονται
ἄπερ φλεγμονῆς, τῷ τῷ πυρετῷ ἐπιχρῶντι
λύει τὸν πόνον.

Quibus dolor circa hypochondrium fit
citra inflammationem, iis febris succedens
morbum soluit & dolorem.

Cum dolor aliquis hypochondrium occupaue-
rit, nec sit is ab inflammatione, nec à morfu ex-
citatus, relinquitur ut sit, vel propter obstructio-
nem, vel propter spiritum flatulentum, vel ali-
quam intemperiem inaequalem. Quo fit ut febre
succedente crassos humores obstructionem effi-
cientes extenuante, flatuq; discutiente, atque in-
temperiem frigidam corrigente, dolor huiusmodi
soluatur.

X L I.

Οἷοισι δὲ πύον ἢ εἶδον ἐν τῷ σώματι
ἀποσημαίνει, τῷ τῷ παχύτητι δὲ πύον, ἢ τοῦ
ἔργου ὅτι ἀποσημαίνει.

Quibus suppuratio aliqua in corpore ab-
dita non innotescit, iis propter crassitudi-
nem vel puris vel loci, delitescit.

Si pus crassum fuerit in profundo latens, nun-
quam ad circumferentiam mouetur, nec tumo-
rem excitat, qui nos puris illic existentis commo-
nefacere queat. Sic quoque cutis ipsa, sub qua pus
coacervatur, si crassior & densior fuerit, qualis est

in cal-

SECTIO VI.

229

in calcaneo, in tumorem attolli non potest, ideoq;
nos latet, quamvis alijs signis ipsum deprehende-
re liceat, nimirum dolore & febre.

XLII.

Εν τῷσι κτελεῖται ἡ πύρις πληθὺν ῥυέας,
πονηρόν.

Hepar durum effici regio morbo corre-
ptis malum est.

Cum morbus regius fiat ab hepatis obstructio-
ne, & fiat aliquando per modum criseos, ipsa na-
tura humorem exuperantem in venis contentum
ad cutem expellente: morbum regium hoc loco
dicit qui fit ex hepatis inflammatione, durities
enim ostendit in eo scirrhum esse, vel inflamma-
tionem, quorum utrumque malum est.

XLIII.

Οἱ πόσι πλῆν ὁδὸς ὑπὸ δυσεντερίης αἰσίνον-
ται, τῶν τοῖσιν ἐπιγνοῦνται μακρῆς τῆς δυσεντε-
ρίης, ὅδωψ ἐπὶ γίνεται, ἢ λεῖεντερίη, καὶ ἀπόλ-
λυνται.

Quicunque lienosi à difficultate intesti-
norum capiuntur, iis superuenientem lon-
gam difficultatem intestinorum, aqua inter-
cutem, aut leuitas intestinorum excipit, &
moriuntur.

Lienosi, hoc est, in liene tumorem habentes ex
melancholico humore natum, difficultate intesti-
norum superueniente, liberantur à morbo, quan-

do ratione euacuationis humorum melancholicorum lieni insertorum, talis difficultas euenerit. Sed quoniam sepius huiusmodi euacuatione ultra modum extenduntur, & noxia sunt laborantibus, conuenienter Hippocrates quem finem habeat hac intestinorum difficultas ostendit: laesis siquidem intestinis transitu vitiosorum humorum, vires eorum laborant, & temperies nativi caloris aboletur. Ob hanc igitur causam & leuitas intestinorum ex ipsorum lesione superuenit, & aqua inter cutem: nam iecur, larga & multa euacuatione debilitatur & refrigeratur, coafficitur item ventriculus, unde mors, prostrata eius virtute.

X L I V.

Οἱ ὀσποῖσις ἐκ τραχέως εἰλεὸς ἐπιγίνεται, ἐν ἑπτὰ ἡμέρησιν ἀποκίωται, ἐὰν μὴ πυρετὸς ἐπιρροῇ ἄλλῃς & ἄρῃ ῥυῇ.

Quibus ileos superuenit à stranguria, intra septimum diem moriuntur, nisi febre succedente vrina satis effluat.

In ileo nihil deijcitur, ne si quidem quis acerrimo utatur clystere: stercus autem in morituris vomitu reijcitur. Quòd igitur astricto podice, & interclusa via vrina, hac passio fiat, & quòd in tenuibus

uibus intestinis accidat, nō autem crassis, omnes
atentur: sed unde hoc vitij contrahitur semel dici
on potest, aliis in hunc morbum incidentibus ex
ntinua ciborum corruptione ac cruditate, quam
bstructio in tenui intestino ferè consequitur: aliis
x frigore, vel ex frigida potu immoderato: non-
nullis ex inflammatione, vel surrho, vel abscessu:
uibusdam ab indurato stercore & circa tenue
ntestinum impacto: quandoque ex plagis & icti-
us: nonnunquam ex lethalium medicamento-
um porione, atque aliàs aliis ex causis. Sed quan-
um ad huius aphorismi expositionem attinet,
multitudinem crudorum humorum unà cum
multa frigiditate melius est eorum quæ in ileo
contingunt symptomatum causam arbitrari: Sic
nim febris succedens, medicina est huius disposi-
tionis, & retentorum urinarum euacuatio. Noui-
us siquidem illis morbis conferre febrem qui ex
rigiditate sunt, aliquando sola, aliquando cum
umoribus crudis pituitosis, & flatuosis spiriti-
us.

X L V.

Ελκεα ὁπόσα ἐν αἰώσῳ γίνεται, ἢ μακρότερον
ρόνον ἔχουσιν, ἀνάγκη ὅσπερ ἀφίστασθαι, καὶ ἐν
λαίς καὶ ἰσχυρὰς γίνεσθαι.

Quæcunque vlcera annua sunt, aut lon-

giore tempore durant, in iis os abscedere, & cicatrices cauas fieri est necesse.

In ulceribus malignis, cuiusmodi sunt phagedenæ, quæ longum tempus durant, medicis etiam in curacione nihil delinquentibus, necesse est ut non tantum caro ipsa, verum etiam os quod carni subiectum est, corrumpatur & abscedat, nec non ut cicatrices caue fiant propter os deperditum: nam ipsum corruptum regigni non potest.

X L V I.

Οκρότοι υἱοὶ ἐξ ἀσθματος ἢ βήχος γίνονται πρὸ τῆς ἡβῆς, ἀποθνήσκουσι.

Qui gibbi ex asthmate fiunt aut tussi ante pubertatem, moriuntur.

Qui ante pubertatem ex asthmate aut tussi gibbi facti sunt, eos citò interituros esse dicit: quia thorax in hiis cum diminuitur, aut saltem non augeatur, pulmones autem & cor per aetatem increcant, tanta angustia premuntur ea quæ respirationi obseruiunt instrumenta, ut necesse sit ex difficultate spiritus hominem brevi tempore interire. Gibbositas est dorsi in posteriorem exteriorémve partem distortio. Lordosis, gibbus ad anteriora, malum est priori contrarium: fit enim ubi
in an-

anteriorē partē distortio contingit, ita ut dorso cavitas fiat, in pectore autem tumor. Scosis est ubi in latus, vel dextrum, vel sinistrum, distortio fit. Omnibus quidam commune sponte affectis, hoc est, quibus sine ictu vel casu spina fissa est, tales fieri propter dura tubercula, & conqui difficilia.

XLVII.

Οἱ ὅσοισι φλεβοτομῇ, ἢ φαρμακείᾳ ζυμφοῦνται, τὰς τῆς ἀρτηρίας ἢ τῆς φλεβοτομῆς, ἢ φαρμακείας.

Quibuscunque venæ sectio, vel medicatio conuenit, hos Vere purgare, vel venam cidere oportet.

De ijs qui adhuc sani sunt, sed agri (nisi euacuentur) sunt futuri, nunc ipsi sermo habetur. r enim cum sit temperatissimum, hos oportet anticipemus adueniente Vere euacuare, vel vena sectionem, si plenitudinis passionibus byciuntur, vel per purgationem, si eis qua ex ruptione proueniunt. Nam vena sectio commune auxilium est eorum, qui ex plenitudine nt, morborum: Purgatio verò eorum qui ab moribus praua aliqua qualitate affectis or- m habent. Nonnullis siquidem confert humo- pituitosos euacuare, nonnullis verò amarum

bilem, nonnullis atram, nonnullis serosam superfluitatem, secundum naturam earum quae consueuerunt superuenire passionum. Quod ut exemplo planum fiat, Aliquis singulis annis incidit in melancholiam, nisi purgetur, is, si ex contemptu aliquando purgationem omiserit, & morbum non anticipauerit, symptomata morbi praesentit. Quare non Vere modo, sed etiam Autumno purgatio ei auertenda est.

XLVIII.

Τοῖσι πολλοῖς δὲσι δυσεντερία ἐπιχρῶνται, ἀγαθόν.

Lienosis difficultas intestinorum superueniens, bonum.

Lienosis intestinorum difficultas est auxilio, cum per eam vacuantur crassi & melancholici lienem obsidentes humores. Id in superiore aphorismo dictum est abunde.

XLIX.

Ὁ πόσος ποδαγρική νόσος γίνεται, ταῦτα δὲ φλεγμώματα ἐν τεσσαράκοντι ἡμέρησιν, ἀποκαθίσταται.

Podagrici morbi intra quadraginta dies, sedata inflammatione, finiunt.

Si medicus omnia recte administrauerit, & ager in nullo deliquerit, intra quadragesimum diem soluitur inflammatio podagrica. Nam in quadragesimo die indicantur morbi quicunque
neque

neque iam sunt diuturni exquisiti, neque acutorum numero planè exciderunt.

L.

Οἱ ὅσοι σιν αὐτὸ ἐγκέφαλον ἀσχετοῦ, τετέοισιν αὐτοῦ καὶ πυρετὸν καὶ χολῆς ἐμετον ἐπιγλύεα.

Quibuscunque præceditur cerebrum, iis necesse est febrem & bilis vomitum superuenire.

Vulnerato cerebro succedit febris, ea ratione communi, qua quolibet membro principali patiente inflammationem, subsequitur febris. Vomitus autem bilis fit compatiante ventriculo, propter eius cum cerebro communicationem, ore præsertim ipsius, ad quod determinatur ex cerebro quadam effatu digna nervorum coniunctio.

L I.

Οἱ ὅσοι σιν ὑγχαίνεσιν ὁδωῶν γίνονται ἐξαίφνης ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ ἀσχετοῦ ἀφανοὶ γίνονται καὶ ῥέχουσιν, ἀποκινῶνται ἐν ἐπὶ τὰ ἡμέρησιν, καὶ μὴ πυρετὸς ἐπιλάβῃ.

Quicunque sani dolore capitis repente capiuntur, & statim muti fiunt & stertunt, in septem diebus pereunt, nisi febris apprehenderit.

Quibus, adhuc sanis, dolor in capite repente accidit cum vocis & actionum voluntariarum

V

lesione, ij versantur in magno vita periculo, atq;
eò maiore, si stertant, & eis sensus unà cum mori
perierit: hoc enim est indicium apoplexia manife-
stum: cuius causam referre oportet, non solum ad
spiritum flatuosum, sed etiam ad materia uni-
versim fluentis multitudinem, quam ad cere-
brum fuisse de'atam indicant casus dolori super-
uenientes, qui multam pituitam acervatam esse
in ventriculis cerebri commonstrant. Ob id febris
suctedens, ut quæ calfacit, extenuat atque resol-
vit spiritum flatuosum, & pituitosos humores,
hoc periculo si qua res alia liberare potest.

L I I.

Σηγοεῖν δὲ χρὴ καὶ τὰς ὑποφάσιαις τῶν ὀφθαλ-
μῶν ἐν ὕπνῳ ὑπνοῖσιν. ὡς γὰρ ἡ ὑποφαίνεται
ἐν ὑπερκαταρροαῖς τῶν βλεφαρῶν & λευκῶ, μὴ ἐν
ἀσθενείᾳ ἐόντι ἢ ἐν φαρμακευποσίᾳ, φλαῦρον
ἔσθ' ἰσχυρὸν καὶ θανατῶδες σφόδρα.

Considerare oportet oculorum in dor-
mientibus suspensiones: nam si quid album
commixtis palpebris subinspicitur, neque ex
alui profluvio aut medicamenti potione
istud contingat, malum est signum & lethale
valde.

Cum oculi per somnum integrè claudi non
possunt, sed albedinis aliquid in aperto relin-
quunt, id (modo ne præcesserit immodica qua-
dam euacuatio) significat palpebrarum siccita-
tem,

SECTIO VI.

237

tem, aut potentia ipsas mouentis imbecillitatem
extremam in cerebro.

LIII.

Αἱ φρεσὶς αἰ μὴ μὲν γέλωτος γινόμεναι
ἀσφαλέστεραι, αἱ δὲ καὶ πικρῆς, ἐπισφαλέστεραι.

Desipientiæ quæ cum risu fiunt, securio-
res: Quæ verò serio, periculosiores.

Fiunt omnes desipientia patiente cerebro, siue
per seipsum, siue per compatiendi rationem; dif-
ferunt autem inuicem per causas ipsas efficien-
tes: Nam quæ fiunt à sanguine parum adusto, aut
à sola caliditate sine humore vitioso, similes sunt
eis quodammodo quæ ex ebrietate contingunt
cum risu. Quæ vero ex flaua bile serio perficiun-
tur, ipsaq; multum exusta, ut iam magis ad atræ
bilis naturam accedat, sunt insania valde furio-
sa & periculosa, quoniam à prauo humore pro-
creata sunt. Duplex enim cum sit atræ bilis, una
quæ est velut i fax sanguinis, quam, cum volumus
exquisitè loqui, nondum atram bilem nomina-
mus, sed humorem melancholicum: nominibus
verò abutentes atram bilem aliquando etiam
vocalamus, quoniam si non prius vacuetur, paulò
post atræ futura est. Caterum altera est ex flaua
bile superaffata genita, quæ omnium est pessima,
& unde seuißima nascuntur symptomata. Desi-
pientia quæ ab hoc humore gignuntur sunt peri-
culosiores.

L I V.

Εν ῥῆσιν ὁξείσι πάθει ῥῆσι μὲν πυρετοὶ αἱ
κλαυθμώδεις ἀναπνοαί, καὶ ἡ.

In acutis morbis qui cum febre affligunt,
luctuosæ spirationes malum significant.

*Spirationes luctuosæ quæ in medio sui inter-
rumpuntur, & luctui similes existunt in passio-
nibus acutis, musculorum & nervorum præ se fe-
runt duritiem, vel virium imbecillitatem, vel
dolorificum aut convulsorium aliquem affectum.*

L V.

Τὰ ποδαγρικὰ ἔσθ' ἡρως καὶ ἔσθ' φθινοπώρου κι-
νέται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ.

Podagrici morbi Vere & Autumno ma-
gna ex parte mouentur.

*Vere quidem mouentur non ratione Veris,
quod saluberrimum existit, sed cùm per Hyemem
antecedentem multi collecti sint humores, ij Ve-
ris calore funduntur, ac in partes imbecillas pro-
truduntur, unde morbi sunt articulares. Mouen-
tur & in Autumno, ob Autumni videlicet ina-
qualitatem, quæ horum aliorumq; multorum
morborum causa esse solet, præsertim cùm Æsta-
te precedente, & ipso Autumno, vitiosi humo-
res ex esu crudorum fructuum coaceruati, hos
morbos excitare possint, ad imbecilliores partes
delapsi.*

Τοῖσι

LVI.

Τοῖσι μὲν αἰσθητικῶσι νεσθήμασιν ἐς τὰ δε ἐπι-
κίνδυνοι αἱ ἀποσκήψεις, ἢ ἀποπληξίαι, ἢ σπασμοί,
ἢ παρὰ σπασμὸν, ἢ μανίαι, ἢ τύφλωσιν σημαίνονται.

In morbis melancholicis ad partes corporis decubitus humorum sunt periculosi: aut enim apoplexiam, aut convulsionem, aut furorem, aut cæcitatem significant.

Si materia illa, quæ committit morbum melancholicum, transferatur in nervos, convulsio: si in ventres cerebri, apoplexia vel furor: præsertim cum supra modum exusta fuerit: si in oculos, cæcitas: atque sic pro vario decubitu materia diversi morbi excitantur.

LVII.

Ἀπόπληκτοι δὲ μάλιστα γίνονται ἡλικίῃ τῇ
ἀπὸ τεσσαράκοντα ἐτῶν ἄρχῃς ἐξήκοντα.

Apoplexiæ in ætatibus maximè fiunt à quadragesimo anno vsque ad sexagesimum.

Non omnem apoplexiam, sed quæ ex atra bile fit, contingit aduenire ijs qui hanc agunt ætatem, quæ est à quadragesimo anno vsque ad sexagesimum, quoniam in ijs maximè abundat atrabilis humor, qui ventriculos cerebri sua crassitie obstruens, hanc ipsam efficit.

Οἷσιςιν ὑπὸ ἰχιάδος ἐνοχλεμύοισι χρο-
νίης ἐξίσταται ὁ ἰχίον, καὶ πάλιν ἐμπίπτει, τε-
τέοισι μὲν ἐπιγίνονται.

Quibus à coxendice infestatis diuturna
coxa erit, & rursus illabitur, iis mucores in
ea parte nascuntur.

Sape in articulis humor pituitosus acervatur,
quem mucorem appellat, à quo madefacta arti-
culationis ligamenta, laxiora redduntur, atque
ideo facile à cavitate articulus excidit, & rursus
facile recidit : quia nunc ait accidere ijs qui ita
morbo laborant coxendicum.

LIX.

Οἷσιςιν ὑπὸ ἰχιάδος ἐνοχλεμύοισι χρο-
νίης, ὁ ἰχίον ἐξίσταται, τετέοισι τήκεται ὁ σκέ-
λες, καὶ χολοῦται, ἢ μὴ καυθῶσιν

Quibuscunque à dolore coxendicum mo-
lestatis diuturno, excidit coxa, iis crus tabe-
scit, & claudicant si non vrantur.

Quibus a coxendicum dolore molestatis exci-
dit coxa coxaeque articulus, ratione humorum qui
illuc decurrerunt, ijs crus tabescit, & atrophia la-
borat. Mucoris enim copia obstructionem parit,
atque adeò impedit ne nutrimentum illuc defe-
ratur : & claudicant si candentibus ferramentis

non urantur circa vertebram. Nam vstio mucorem in pixide collectum ac illapsum absumit & exsiccat, ligamentaq. solidaora efficit. & in habitum naturalem reducit.

L X.

Ἡν ἐπίπλοον ἐκπέσῃ, ἀνάγκη δ' ὅσα πλώει.

Si omentum ceciderit, necesse est ut putrescat.

Omentum dictum à Græcis Epiploon, à Latini etiam Rete, ventriculo insidet, & calorem eius innatum fouet ac tuetur. Hoc si per vulnus ventris inferioris excidat, putrescit post longum tempus, si non ligatum fuerit, & excisum antequam reponatur. Pars autem sincera separabitur ab infecta, ligatura fili è serico, quod postea extrahetur, deinde scindetur infecta pars, ac sincera reponetur.

APHORISMORVM

HIPPOCRATIS

Sectio VII.

APH. I.

ΕΝ τῶσιν ὁξείσι νοσήμασι ψύξις ἀκρωτηρίων, κακόν.

In morbis acutis frigiditas partium extremarum, malum est.

Partium extremarum frigiditas in acutis morbis absque causa manifesta, significat vehementissimam cuiusdam visceris, ut iecoris, aut ventriculi inflammationem, cuius calor instar cucurbitula sanguinem ad se trahit, unde extrema partes frigescunt sanguine destituta.

I I.

Επὶ ὅσῳ νοσέοντι σπέρξ πελιδνὴ, κακόν.

In osse ægrotante caro liuida morbum significat.

Non enim in mediocribus ossium lationibus, sed fortibus purrilaginibus talis species coloris circumstantibus carnibus aduenit, extincto scilicet in eis nativo calore.

Επὶ ἱ-

III.

Ἐπὶ ἐμέτῳ λυγρῷ καὶ ὀφθαλμοῖς ἐρυθροῖς κα-
κόν.

A vomitu, singultus & oculorum rubor,
malum.

Qualis est passio conuulsio musculis, talis est
singultus stomacho, qui aduenit, humoribus in-
festantibus nonnunquam totum ipsum ventri-
culum, nonnunquam os eius & gulam: quos per
vomitiones abijciens, statim à singultu libera-
tur. Qui si neque per has cessauerit, duorum al-
terum ostendit, vel scilicet cerebrum (neruorum
principium) vel ventriculum pati non medio-
crem inflammationem Rubor verò oculorum v-
tramque sequitur dispositionem, sed precipuè il-
lam quæ existit in cerebro.

IV.

Ἐπὶ ἰσχυρῷ φέρον, ὃ καὶ χερσὶν.

Post sudorem horror minimè bonum si-
gnificat.

Quòd iudicatoria, quæ non iudicant, nec sol-
uunt morbos, partim mortalia, partim malè iu-
dicantia sint, ab ipso dictum est, quoniam natura
in huiusmodi dispositionibus morbo succum-
bit. Horror igitur qui sudori succedit, utpote uni-
uersis noxijs per sudorem non expulsis, sed iuxta
sensiles partes harentibus, malam iudicationem
significat.

V.

Επὶ μανίῃ δυσεντερία, ἢ ὕδρωψ, ἢ ἑκτασις,
ἀγαθόν.

A furore difficultas intestinorum, vel aqua inter cutem, vel mentis alienatio, bonum.

Difficultatem quidem intestinorum, vel aquam inter cutem transmutationis ratione esse furoris sanationem, non est extrarationem, cum à capite noxij humores transferantur ad inferiora. Mentis autem alienatio, quæ est motus ac vehemens perturbatio, qualis accidit ijs quibus paulò post adfutura est crisis, significat quod natura in hoc est, ut humorem peccantem discretum paulò post euacuet per indicationem.

V I.

Επὶ νύσῳ πολυχρόνῃ ἀποσιτία καὶ ἀκρητοὶ
ὑποχωρήσεις, κακόν.

In morbo diuturno fastidium cibi & deiectiones synceræ, malum.

Fastidium cibi in morbis longis facultatis imbecillitatem ostendit, quæ quia ad finem morbi durare vix potest, periculosum est, valde ne antè succumbat ager quàm possit adiuuari, præsertim ubi synceræ deiectiones extiterint nulli aquosæ humiditati permixtæ. Nam deiectiones huiusmodi, quæ sunt unius cuiuspiam humoris solius, siue is picrocholicus sit, siue melancholicus, siue porraceus,

SECTIO VII.

245

ceus, siue bilis aruginosa dicta, nativam omnem humiditatem exustam esse à calore febrili demonstrant.

VII.

Ex πολυποσίης ρίγος καὶ ἀφ' ὧν φροσύνη, κακόν.

Ex multa potatione rigor & desipientia, malum.

Quòd aliqui ex vini potatione desipiant, sanguine feruente & spiritu calido caput opplenti-
bus, id unicuique manifestum est: Sed quòd ali-
qui sint qui etiam cum desipientia rigeant, id ra-
rius, & maioris cuiusdam mali indicium est.
Nam tantum abest ut multitudine vini calor
natiuus augeatur, ut etiam, sicut lucerna flam-
ma oleo universim superinfuso, prorsus extin-
guatur.

VIII.

Ἐπὶ φύματος εἶσω ῥήξεως ἐκλυσις, ἔμετος, καὶ
ἀποψυχὴ γίνεται.

A tuberculi intus ruptione exolutio, vo-
mitio, aut animi defectio fit.

Ut suppurationum ad ventriculum ruptionem sequitur vomitus, sic ad pulmones tussis, &
ad intestina puris deiectio. Communis autem
omnium ruptionum, quamcunque in partem de-
umbant, est virium lapsus & animi defectus,
propter vitalis spiritus excretionem.

Επὶ αἵματος ῥύσις ὡς φροσύνη ἢ καὶ πᾶσμός, κακόν.

A profluuiio sanguinis, desipientia ac conuulsio, malum.

Desipientia post sanguinis fluxum non bonus est casus, etiam si sola contigerit, multò autem minus conuulsio, vel si absque desipientia facta fuerit. Maximum verò malum est ambarum conuentus, ubi etiam ex immoderata euacuatione conuulsio casus est admodum exitialis; quippe, quum fiat ab inanitione, defectum & siccitatem corporis, magnamq; virium imbecillitatem significat.

Επὶ εἰλοῦ ἔμετος, ἢ λύγξ, ἢ πᾶσμός, ἢ ὡς φροσύνη, κακόν.

Ab ileo vomitus aut singultus, aut conuulsio, aut delirium, malum.

In ileis nihil descendit ad inferiora, & hoc est proprium inseparabile passionis huius: vomitus autem non semper adest, sed quando exitiales sunt: & si vehementius distorqueantur, stercus eis superiora petit, atque singultiunt. Quidam verò desipiunt & conuelluntur, compatiēte cerebro stomachi passioni. Hac verò mihi fieri videntur intestinis, in quibus talis passio existit, à se expellere stercus appetentibus, & non potentibus se exo-

se exonerare, propter factam in partibus inferioribus obstructionem, sed coactis contra naturam violenter moueri, & ad loca superiora materiam noxiam extrudere.

X I.

Επὶ πλάτρου εἰπὸς πνευμονίης, κακόν.

A morbo laterali inflammatio pulmonis, malum.

Quando non potest is qui morbum lateralem facit, in costis humor contineri totus, pars eius aliqua ad pulmonem fertur, unde pleuritidi superuenit peripneumonia, malum priore deterius, utpote quod nobiliorem partem occupet.

X I I.

Επὶ πνευμονίης φρενίτις, κακόν.

A peripneumonia delirium, malum.

Peripneumonia, inflammat o est pulmonis cum febre acuta, à calido humore excitata, cui si delirium succedat, vaporibus à pulmone ad cerebrum delatis, malum est duplicatum.

X I I I.

Επὶ καύμασιν ἰσχυροῖσι πασμός, ἢ τέτανος, κακόν.

A vehementibus æstibus conuulsio, aut distentio, malum.

Nonnulli quidem æstus idem quod febres intellexerunt. Nonnulli verò æris ambiens feruo-

rem ita nominari dixerunt: Alij pro cauterijs & escharis: & omnes verum dicunt: superueniunt enim his omnibus, haudquaquam in bonum, Tetani ac convulsiones propter nervorum siccitatem, quas diximus esse pessimas.

XIV.

Επὶ πλὴν ἢ ἐς τὴν κεφαλὴν ἐκπληξίς, ἢ τῆς φροσύνης, κακόν.

Ex capitis ictu obtupescencia & desipientia malum.

Desipientia quidem agnoscitur loquentibus agentibusve nihil consentaneum rationi: obtupescencia verò, quando neque aliquid dicunt, neque agunt, sed aperti oculis quieti manent, similes ijs qui ex timore sunt attoniti. Hac sunt indicio quòd ictus intrà cerebrum penetrauerit.

XV.

Επὶ αἵματος πύσος πύς πύσις, κακόν.

A sanguinis sputo puris sputum malum.

Non omne sputum sanguinis, sequens habet sputum purulentum, sed quod malignum existit: tale autem est omnino à pulmone.

XVI.

Επὶ πύς πύσος φθίσις καὶ ρύσις. ἐπὶ δὲ τὸ πύελον ἴχνηται, ἀποθνήσκουσιν.

A puris sputo tabes & fluxus: quum verò sputum retinetur, moriuntur.

Phthisin nominat, aut tabem totius corporis,

61677

SECTIO VII.

249

cum parua febre extenuationem consequentem
insanabilia pulmonis ulcera. Per fluxum autem
intelligit, vel capillorum defluxum, vel alui flao-
rem: utrunque enim consuevit euenire cum tabi-
di ad extremum mali perducuntur, alterum ex
siccitate, alterum ex potentia imbecillitate. Ce-
terum eousque tabidi viuunt, dum pulmonem
expurgare possunt per ea quae expuendo excer-
nuntur. Cum vero non expuunt pro imbecillita-
te, sed puris copia in pulmone coacervata viam
spiritus obstruit, strangulantur.

XVII.

Επὶ φλεγμονῇ τῆς ἥπατος λυγξήκεται.

In hepatis inflammatione singultus, ma-
lum.

Communium neruorum ratione, qui sunt
breuissimi, stomachus hepati compatitur tum
in inflammatione maxima & pessima laborat
hepar: nonnunquam etiam bile multum calida,
& multa in huius visceris inflammationibus
genita, ac confluenta ad intestinorum princi-
pium: qua superfuitante atque ad ven riculum
recurrente, contingit os eius morderi, atque ideo
singultire.

XVIII.

Επὶ ἀρευνίῃ σπασμὸς ἢ ἀσφροσύνη, καλεῖται.

A vigilia conuulsio vel detipencia, ma-
lum.

Cum vigiliae sint ex ijs qua maximè euacuanti
& exiccant, conuulsio autem fiat ab euacuatio-
ne & repletionem, nihil mirum si vigilias immo-
deratas comitetur ipsa conuulsio, ac interdum
desipientia, ratione immodica siccitatis, & quia
in longis vigilijs biliosior redditur sanguis.

XIX.

Ἐπὶ ὀστέον ψιλώσθ' ἐρυσιπέλας.

Ab ossis denudatione erysipelas, malum.

Osse nudato carnem circumstantem videri ab
erysipelate apprehensam, malum: significat enim
sanguinem calidiorem flauamq; bilem confluere,
qua partes adiacentes sua acrimonia exedit &
absumit.

XX.

Ἐπὶ ἐρυσιπέλατι σηπεδὼν, ἢ ἐμπύσις, κακόν.

Ab erysipelate putredo, aut suppuratio,
malum.

Tale siquidem erysipelas significat, quòd non
tantum in superficie existentes corporis partes ex-
ulcerat, sed & profundiores depascitur, atque
adeò ulcus purium efficit, quòd undique ad
sanas partes pascendo serpit.

XXI.

Ἐν τῷ ληθαργῷ τρέμος, κακόν.

In lethargo tremor, malum.

Scribit Galenus, nullum motum propter natu-
ram, fieri in lethargo, neque conuulsiuum, neque
palpi-

SECTIO VII.

251

palpitantem, neque tremulum, nisi per accidens. Proinde, si tremor incidat, is erit ab oppressione, & materia decubitu in nervos, aut ab infirmitate, ex antea facta resolutione, per validam agrotationem, aut à causa externa, ut fame, lassitudine, vigilijs, curis. Is autem tremor, maximè manus afficit in lethargo, quia, cum manibus proiectis supini iaceant lethargici, motus, saltus, tremor, convulsio, ea parte magis se produnt. Vide aphor. 26. sect. 2. lib 4. coac.

XXII.

Επὶ ἰσχυρᾷ σφυσμᾷ ἐν ὅσιν ἐλκεσιν αἰμὴρ ῥαγίζῃ, καὶ ῥοι.

A vehementi in vlceribus pulsu, copiosa sanguinis fit eruptio.

Membris inflammatis, & loci angustatio, & dispositio dolorifica, tristem afferunt laborantibus sensum ex motu arteriarum, quem natura (cupiens id quod alienum est, excernere) magnum & violentum efficit, atque ita à violentia sanguis erumpit.

XXIII.

Επὶ ὀδυνῇ πολυχρονίῃ τῇ δὲ τῷ χειλὶ ἐκ πύσεως.

A ventris diuturno dolore suppuratio fit.

Cum ventris dolor à frigore, vel inaequali intemperie, vel flatibus, vel mordacibus humoribus excitatus, non possit in longum tempus extendi

X

si omnia circa agrum opportunè fiant. Reliquum est igitur, si diu duret, ut ab inflammatione suam habeat originem, qua processu temporis suppura- bit, nisi hominem morte præcipiat.

XXIV.

Ἐπὶ ἀκρῆτι τῷ ἐποχρῆσθαι δύσεντε εἶναι κακόν.
A deiectione sincera, difficultas intesti-
norum, malum.

Deiectiones sinceras solet Hippocrates nomi-
nare impermixtas aquosa humiditati, qua solum
habent sincerum illum, qui infra deijcitur, hu-
morem: siue sit flava bilis, siue atra. Nihil igitur
mirum si in talibus deiectionibus aliquod intesti-
num exedatur ab humore, qui suo transitu, mor-
sus, erosiones, & exulcerationes efficit: unde dy-
sen teria.

XXV.

Ἐπὶ ὅσῃς ἀφαιροπῇ τῆς φρεσὶν, ὡς κενεὸν
λάβει.
In ossis capitis præcisione, si vacuum ex-
cipiat, delirium fit.

Osse quod in capite est præciso usque ad inte-
riorem superficiem, quam vacuum excipit locus
qui cerebrum continet, desipientia fit. Nam iam
passio proxima existit membranis & cerebro, hoc
est, quod ipse dicit, si vacuum excipiat.

XXVI.

Ἐκ φαρμακωπῶν ἀσμεῖς, ἵνα τῶδες.
Ex mea

SECTIO VII.

253

Ex medicamento potione conuulsio lethalis est.

Medicamenti portiones & medicationes consuevit Hippocrates nominare eas tantum, quae purgantibus sunt medicamentis. Quod verò conuulsio, quae fit istis supra modum euacuantibus, lethalis existat, iam dictum est abunde, significat enim siccitatem insanabilem.

XXVII.

Ἐπὶ ὁδὸν ἰατρῶν τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοσητῶν ἀκρω-
τισμὸν φέρεται, καὶ τὸν νοσητῶν.

In forti dolore ventris partium extremarum frigiditas, malum.

Fit partium extremarum frigiditas propter dolorem vehementem medias corporis partes occupantem, ob quem natura in seipsam contrahitur. & ad eam consequitur sanguis, non solum extremas corporis partes derelinquens, veluti pedes & manus & caput, sed & cursum uniuersam.

XXVIII.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ τενασμός ἐστι, καὶ τὸν νοσητῶν.

Mulieri utero gerenti si tenesmus superuenerit, facit abortum.

Tenesmus nomen accepit ab ea passione ob quam, cum cacare vehementer appetant, continuè exurgunt. Ob talem igitur molestiam totum aliud corpus laborat, & praecipuè matrix, quae co-

gnata est recto intestino in hoc affectu maxime dolenti. Nihil autem mirū si propter vehementes atque frequentes exurrectiones, conceptus abortitur, quando et ex aliis omnibus fortibus motibus a quibus doloribus, mulieres grvida solent abortire.

XXIX.

Οτι αὐτὸ ὅσον, ἢ γόνυ ὅ, ἢ νῶτον δὲ ποικίλῃ ἐν τῷ σώματι, ἢ τε αὐξάνεται, ἢ τε συμφύεται.

Siue os, siue cartilago, siue nervus in corpore procisus fuerit, neque augetur, neque coalescit.

Hic aphorismus est idem cum aphor. 19. 6. sect.

XXX.

Ὡς ἐνὶ λευκοφλεγματος ἐκφυγῶν ἀλγύροισα ἐπιλήθεται ἰσχυρῇ, λύει τὴν νόσον.

Ei qui leucophlegmatia detinetur, si ventris fluxus superuenerit vehemens, à morbo liberatur.

Speciem aqua inter cutem leucophlegmatiam nominant, quæ alba pituita dicitur: hæc soluitur alui profusio vehementi (dummodo hoc non accidat ab imbecillitate facultatis retentivæ) nimirum ad alium delabente eo qui morbum faciet at humore pituitoso.

XXXI.

Ὅτι οἱ σισιν ἀφραδέα ἔα ἀλεχρήματα ἐν τῇσι
ἀλγύ-

Ἀφ' ὧν οἱ σι, τὰ τέτοιον ὁπὸ τῆς κεφαλῆς ἔκτρεται κα-
ταρρέει.

Quibus in alui profluuiis excrementa
spumosa sunt, iis ex capite pituita defluit.

Hoc indistinctè dictum est : Fiunt enim ali-
quando excrementa spumosa pituitoso humore
ex capite ad ventriculum defluente: fiunt autem
ἐν vasis, quæ ad ipsum perueniunt, illum effun-
dentibus. Conflari etiam interdum possunt in
ipso ventriculo cum unam habeant, ut ita di-
cam, causam continentem, antecedentes verò plu-
res. Est autem huius pituita causa continens spi-
ritus flatuosus, dum humori commiscetur vehe-
mentem habens motum & inaequalem, ita quod
ipse dirumpitur, & pituitam frangit in multas
partes ac paruas ampullas. Ipsius verò motus cau-
sa est propria natura, & interdum multitudo ca-
loris: sic enim ἐν in his quæ elixantur apparet
spuma, & in Mari violentis ventis agitato.

XXXII.

Ὅσοι σι πυρίσσειν ἐν τοῖσι ἔργοις κεκρυμμέ-
ναις αἰ ἀποτέλειες γίνονται, μεγάλῳ πλὴν ἀρρώ-
στῳ σημεῖον.

Quibus febricitantibus urinæ sedimina
crassioris farinæ speciem referunt, diutur-
num fore morbum significant.

Qui febricitantes mingunt urinam similem

farina crassiori, si saluari debeant, viribus existantibus robustis, non nisi tardè liberantur, quia crassa materia quæ ex guo tempore discuti non potest, in longum producit agritudinem. Qui vero cum tali urina imbecilliores fuerint, ac in morbo exitialiter se habuerint, morte præripiuntur antequàm agritudo diutius protrahatur.

XXXIII.

Οἱ ὅσοισι ὁ πολὺ δάδες αἱ ὑποστάσεις, αὐτὰ ὡς ἂν δὲ λεπτοί, ὁ ἕτερος ὑπερβολὴν σημαίνει.

Quibus verò sedimina nunc sunt biliosa, quæ ab initio fuerunt tenuia, acutum morbum significant.

Quum sedimina urinarum ab initio tenuia fuerint, & subinde biliosa sunt, acutum & breuem morbum significant: nam biliosum semper acutos morbos operatur. Bilis autem appellatone sine alia adiectione, cholericus humor intelligitur, ut atra bilis nomine, melancholicus.

XXXIV.

Οἱ ὅσοισι ὁ διεστηγὸς τὰ ἔργα γίνεται, ταῖς τοῖς τὰ ἔργα καὶ ἰσχυρὰ ἐν τῷ σώματι εἰσιν.

Quibuscunque urinae distantes sunt aut inæquales, iis turbatio vehemens in corpore est.

Per inæquales aut diuulsas urinas intelligi vult substantia urinae inæqualitatem, quæ rectè dixit

dixit fortem significari perturbationem. Nam superante natura, omnia aequaliter unita sunt: morbificis verò causis illi sedè:iosè reluctancibus, illud quod vincitur quidem atque concoquitur aliam habet formam, quod verò reluctatur, aliam.

XXXV.

Οἱ ὅσοι σιν ἐν τῇ σιν ἔργισιν ἐφίστανται πομφόλυγες, νεφελικὴ σημαίνει καὶ μακρὴ τὴν ἀρρώστιον ἔσσεσθαι.

Quibus in urinis superstant bullæ, iis morbum renum, & longum fore significant.

Bullæ sunt ab humiditate quæ à flatuoso spiritu circum extenditur. Solet autem hoc magis accidere quando humor aliquid tenacitatis habet: tunc enim bullæ ipsæ sunt stabiles, & difficulter solubiles. Cum igitur spiritus fluosissimus unum cum urinis excernitur, signum est frigida agri tudinis renum. Quod si frigida est agri tudo, ut sit longa necesse est: frigidum enim omne est difficulter solubile, & vix coctionem admittit, acque ideo diu durat.

XXXVI.

Οἱ ὅσοι σιν ἡ λιπαρὴ ἢ ὑπέρτατος καὶ αἰθέριον, πυρρὸι σιν νεφελικὴ, ὁ ὅστις σημαίνει.

Quibus in vrina pinguedo supernatat & confertim exit, iis renum vitium & acutum morbum significat.

Siue alui excrementum, siue urina pinguis fuerit, ex colliquatione adipis fit non magis in renibus quàm in toto corpore existentis: quare non propriè morbi renalis est signum, sed consumptionis vniuersi corporis, & commune omnis adipis ab igneo calore colliquati. Verùm hoc discrimen est, in aliis enim partibus corporis adipēs colliquati paulatim & non confertim cum urina exeunt, primum colliquatione participata à venis illi vicinis, deinde ab iis quæ continuantur, & rursum ab aliis, donec ad renes perueniant. Adipēs verbò circa renes colliquati, transsumptio ad urinas celerissima est, & non paulatim, sed confertim fit, atque ideo in renibus ipsis dispositio esse monstratur: Cui rei & experientiam, si diligentius animaduuerteris, inuenies consentientem.

XXXVII.

Ουδὲν εἰναι τὴν νεφελικγῖαν ἐξαιτῶν πρὸς τὴν ἀσθενείαν
συμβαίνει σημεῖα, πόνοι τε πρὸς τὰς μύας τὰς ῥα-
χιαίας γίνονται, καὶ πρὸς τὰς ἑξωτὰς γυν-
ται, δάκνημα πρὸς δέχον ἰσχυρὸν ἔχει. καὶ τὸ μέλ-
λον οἱ πόνοι πρὸς τὰς εἰσωτὰς γίνονται, καὶ τὸ
δάκνημα πρὸς δέχον ἰσχυρὸν μέλλον εἶναι.

Quibus autem morbo renali laboranti-
bus mala signa accidunt, dolorēsque circa
spinæ musculos fiunt, siquidem circa loca
exteriora fiant, abscessus quoque exterius
futuros

futuros expecta: si verò dolores magis circa loca interiora fiant, etiam abscessus expecta futuros interius.

Qui longo tempore nephritici sunt, doloresque circa spina dorsive musculos sentiunt, iis abscessus accidunt: ij autem interni externive futuri sunt pro vario positis musculorum. Nam siue retro siue antè se si manuerit dolor, illic quoque abscessum futurum expecta.

X X X V I I I.

Οἱ ὅσοι αἷμα ἐπέουσιν, αὐτὸ μὲν αὐτοὶ πύρετ' ἔσθαι φησιν. εἰ δ' ἐκ τοῦ πυρετοῦ καὶ αἷμα ἴδωμεν. ἵστανται δ' εἰν δ' τοῖς ὕδασι καὶ τοῖς σπυγμοῖς.

Quicunque euomunt sanguinem, si sine febre quidem, salutare: si verò cum febre, malum. Curare verò acerbis & refrigerantibus.

Febre vacantibus liquet nullam adesse inflammationem in loco unde emittitur sanguis. Quare vel alicuius vasis ore adaperto fit sanguinis vomitus, vel ex ulcere quidem, sed sine inflammatione. Quare id bonum, hoc est minus malum, censendum est. Curantur enim quae sunt absque inflammatione ulcera, facile acerbis. Quaeunque verò cum inflammatione sunt simul ac febribus, non solum curari non possunt, sed ne sic quidem permanere: semper enim maiora sunt ac maligniora.

Κατάρροι ἐς τὴν ἀνω κοιλίαν ἐκτυθένται ἐν
ἡμέρησιν εἰκοσιν.

Destillationes in ventrem superiorem
suppurantur intra viginti dies.

Ventrem superiorem nominat hic thoracem
in quo pulmo continetur, & in quem à capite de-
stillatio fertur per asperam arteriam. Suppuratur
autem magna ex parte in viginti diebus, nempe
14. aut 17. aut ad summum vigesimo die: Sem-
per enim Hippocrates diem vigesimum indicato-
rium facit, non vigesimum primum.

Ἦν ἐρέη αἷμα καὶ θρόμβους, καὶ σπασμὸν ἔχει
καὶ ὁδὸν ἐμπίπτει ἐς τὸ πρῶτον, καὶ τὸ ὑπογά-
στρον καὶ τὸν κτένα, καὶ οὕτως τὴν κύστιν νεκρὴν ση-
μαίνει.

Si quis sanguinem & grumos mingat, aut
urinam guttatim emittat, dolorque ad peri-
næum, hypogastrium & pectinem pertin-
gat, partes ad vesicam pertinentes malè affi-
ci significat.

Est idem cum aphor. 80. 4. sect.

Ἦν ἡ γλῶσσα ἐξαίφνης ἀκρατὴς γίνεται ἢ
ἀπόπληκτόν ἢ τὸ σῶμα πρὸς μὴ ἀσχηλὸν τὸ εἶδος
γίνεται.

Si lingua repente incontiens fiat, aut
aliqua

SECTIO VII.

261

liqua corporis pars stupore elanguit, tale est melancholicum.

Incontinentem linguam nominat, qua infirma est i. a, ut non possit articulata edere vocem, aut immobilem & omnino resolutam, sicut corporis partem stupidam, etiam resolutam dicit. harum autem passionum eam causam indicat esse, quæ quartani est circuitus: melancholicus enim humor crassus & lentus, haud aliter ac pituita, sua crassitie nervos, sensum & motum à cerebro deferentes obstruens impedit, ne vis sensitiva & motrix ad linguæ aliarumq; partium musculos pervenire queat.

XLII.

Ἡν φόβος καὶ δούρειν ποικίλῳ χρόνον ἀγαπᾷ, μελαγχολικὸν ὁ τοιοῦτος.

Si timor atque inæstitia longo tempore perseverant, melancholiam significant.

Repetitus est ex 4. sect. aphor. 23.

XLIII.

Ἡν ὑπερκαθαυρομένων τῶν πρεσβυτέρων λυγρὸν ἐπιγίνεται, σκελετίζον.

Si senibus supra modum purgatis, singultus superueniat, non bonum.

Sunt enim imbecilliores, ætatis ratione, eoque in illis omnia mala, etiam levia, sunt suspecta; cum illis nativus calor paucus supersit, paucique boni humores, habeantque ideo venas angustas,

multisque obstructionibus impeditas; corpusque siccum ac penitus aridum, cuiusque humidi nativi iactura, si aliqua facta sit, nulla arte reparari potest. Non mirum itaque si in ijs, post purgationem, singultus aut conuulsio superueniens (ut pote immodici siccitatis indices) malum portendant.

XLIV.

Ἡ πυρετὸς μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχῃ, ὕδατες πολλὰ καὶ θερμὰ κατὰ χρομῶς καὶ τῆς κεφαλῆς, λύσις δὲ πυρετοῦ γίνεται.

Si febris non ex bile fit, multa aqua calida capiti superfusa febrem tollit.

Ex balneo aqua calida sentiunt utilitatem febres quae non ex humore fiunt, sed ab aliis causis, ut à lassitudine, exustione, frigore, obstructione meatuum: respirat enim & dissolvitur per ipsos humido tepenti refferatos febrilis calor, ac ita corporis habitus saepe refrigeratur. Diariis igitur & hecticis utiles sunt balnea: iis autem quas humoris putredo vel inflammatio aliqua excitarit, non conveniunt, nisi prius concoctis aut euacuatibus honoribus. Verum cum à pituita putrescente fiat etiam febris putrida, hic videbitur Aphorismus non esse verus, qui bilis tantum meminit, nisi quis existimaverit pituita putrefactionem in alterutram bilem converti.

Γαλῆν

XLV.

Γυνὴ ἀμφιδέξι· ὅς ἐ γίνεται.

Mulier ambidextera non fit.

Homines qui ambabus manibus pro dextris utuntur sapius visi sunt, mulier verò nulla ad hunc usque diem, ob naturæ imbecillitatem. Satis enim habet, si sola dextra modicè utatur.

XLVI.

Οἱ ὅσοι ἔμπυοι καὶ ὄντα ἢ τέμνοντα, ἢ μὲν τὸ πύον καὶ ταρῶν ῥυῖ καὶ λευκὸν, ὡς γίνεται, ἢ δὲ ὑφαίμαον καὶ βορβορῶδες, καὶ δυσῶδες, ἀπολλύονται.

Quicunque suppurati vruntur vel secantur, si pus purum fluxerit, & album, euadunt: si verò subcruentum & fæculentum & fœtidum, pereunt.

Suppuratos nominat, quibus inter thoracem atque pulmonem acervatum est pus: hoc si purum effluerit, & album, post resolutionem aut secretionem, euadunt: significat enim quòd natura valida fuit, & morbum deuicit: si verò pus quod effluit, subcruentum, fæculentum & fœtidum fuerit, pereunt: significat enim morbi ac putredinis victoriam, facultatūque casum ac naturæ ruinam.

XLVII.

Οἱ ὅσοι τὸ ἥπαρ ἀλέπουσι καὶ ὄντα, ἢ μὲν τὸ πύον καὶ ταρῶν ῥυῖ καὶ λευκὸν, ὡς γίνεται, ἐν

χρῶνι γὰρ τὸ πύον τετέοισιν ἐστίν. ὡς δὲ οἶον αἰμὴρ-
ρον ῥυθὶ ἀποκινῶται.

Qui iccore suppurato vruntur aut secan-
tur, siquidem pus purum effluxerit, & al-
bum, euadunt, iis enim pus conclusum in
membrana est: si verò velut amurca effluxe-
rit, intereunt.

Ipse causam dixit ob quam nonnulli pereunt
suppurati, nonnulli verò euadunt. Quibus enim
in tunica est pus, nihil patiente substantia hepa-
tis, saluantur: Quibus verò usque ad carnem he-
patis corruptio pertingit, non absque ratione mo-
riuntur. Quòd autem amurcam Græci nominant
facem olei, & quod talem par est esse incoctam
putredinem hepatis, liquet unicuique.

XLVIII.

Ὁδυνὰς ὀφθαλμῶν ἀκρητον ποτίσας καὶ λεί-
σας πολλαὶ θερμαὶ, φλεβοτόμει.

Dolores oculorum post meri potionem
& aquæ calidæ balneum, venæ sectione cu-
rato.

Cum tria hæc remedia nusquam in una dispo-
sitione conueniant, hic Aphorismus videtur ex ijs
vnus esse qui fuerunt interiecti: neque enim vi-
num neque balneum tolerat plethorica dispositio
absque maximo detrimento, verum hæc auxilia
sunt sanguinis crassi in aliqua parte compacti,
cùm non adest totius corporis repletio. Quare si
absque

SECTIO VII.

265

absque plenitudine dolor fiat propter obstructio-
nem ac compactionem crassi sanguinis, tum bal-
neum utile erit & vinum, inutilis autem vena
sectio: si verò plenitudo fuerit, utilis quidem erit
vena sectio, inutile autem balneum & vinum.

X L I X.

Υδροπικῶνται ὡς βῆξ ἔχει ἀνελπίστως ἐστίν.

Si hydropicum tussis habeat, desperatus
est.

Idem cum aphor. 35. sect. 6.

L.

Σταφθεῖν καὶ δυσουρεῖν ἰσχυρῶς καὶ φλεβο-
τομή λυεῖ. τέμνειν δὲ τὰς εἰσω φλέβας.

Vrinae stillicidium, & mingendi difficul-
tatem vini potio & venae sectio soluit, inci-
dere verò interiores.

Stillicidium urina quod ab intemperie fit, pra-
sertim frigida, & mingendi difficultas quae à
crassis humoribus & flatuoso spiritu fit, vini po-
tione solvuntur: Nam vinum suo calore frigidi-
tatem ex hisce dispositionibus discutit, ac obstru-
ctione liberat meatus: inflammatio verò si acce-
dat, vena eius, quae in poplite est aut in malleolo, se-
ctione sanabitur.

L I.

Υπὸ κυψέλης ἐχρησάμενος εἰδήματα καὶ ἐρύθημα ἐν
τῇ στήθει ἐπιγλυφόμενος, αἰχμαλόν, ἔξω γὰρ πέπειται ὁ
ἐσθόμενος.

Ab angina habito tumor & rubor in pe-
ctore superueniens, bonum: extra enim ver-
titur morbus.

*Hic Aphorismus non dissimilem habet cum
precedente sententiam.*

LII.

Οὗτοι αὖ σφακελιῶδες ὁ ἐγκέφαλος, ἐν
πρῶταις ἡμέραις διόλυνται. ὡς δὲ ταῦτα λεγού-
μενοι, ὁ γὰρ γένον.

Quibus cerebrum sphacelatum est, in tri-
bus diebus pereunt: Si verò hos euaserint,
fani fiunt.

Si sphacelus est corruptio substantia uniuscu-
iusque partis quæ sphacelari dicitur, non contin-
git hunc, qui ita agrotat, persanari. Quo fit ut
abutantur hoc verbo ad significandam non com-
pletam corruptionem, sed huius dispositionis in-
ceptionem. Sicut enim gangranam, iam ita com-
pletam ut pars sit intermortua, sanare est impos-
sibile, dum verò adhuc fit, possibile est: Sic &
sphacelum, dum quis in eum incidit, quanquam
mortificationem carnosæ partis quæ provenit ex
magnitudine inflammationis, quam propriè me-
dici gangranam nominant, etiam sphacelum
Græci vocabant. Quòd verò cita sit ex ipso mors,
est manifestum: nempe quoniam morbus est gra-
uissimus, & pars maximè princeps. Quòd si
egrum mors in tribus primis diebus non antici-
pauerit,

pauerit. sperandum est morbum declinare, & vi-
res esse fortes quæ corruptionem vincere possint.

LIII.

Περὶ τοῦ στερνῦτος ἐν τῇ κεφαλῇ, ὡς ἔρρηκτο-
νός ἐστι κεφαλῆς, ὡς δὲ οὐρανὸς ἐν τῇ γῇ κεφα-
λὴν κεφαλῆς. ὡς καὶ τὸ πνεῦμα ὁ ἀνθρώπος ἐν τῇ
φύσιν ἐστι. ὡς καὶ τὸ πνεῦμα ὁ ἀνθρώπος ἐν τῇ
φύσιν ἐστι.

Sternutamentum fit ex capite, cerebro
calfacto, aut humectata capitis parte inani.
Aër enim intus contentus extrâ erumpit,
sonat autem quoniam per angustum exit.

Hic de sternutamento agit quod habet sue ge-
nerationis principium, naturam appetentem fla-
tuosum spiritum ex capite excernere. Fit enim
rarefactis ijs qui sunt in capite humoribus &
natura impetus excretis. Rarefieri verò ipsis acci-
dit concalfactis: calfiunt autem narium calore ex-
citato & aucto, ob cuius imbecillitatem prius
erant superfluitates aggregatae. Cum igitur ait:
calfacto eo quod est in capite inani, maximè qui-
dem intelligere oportet de eo qui est in ventriculis
cerebri, atque etiam de ambiente ipsum extrinse-
cus aëre: facile enim est & illi per cerebrum, pri-
mum quidem ad ipsos ventriculos, hinc verò sub-
ire ad nares. Quia verò uniuscuiusque ex d. t. & per
angustum narium meatum, sonitum edī Hippo-
crates inquit.

Y

L I V.

Οἷοισιν ἥπαρ θειοδυνάται, τετέοισιν πυρε-
τος ἐπιγνώριον ὅ λυεὶ τὴν ὁδὸν.

Quibus hepar vehementer dolet, iis fe-
bris superueniens soluit ægritudinem.

Ei dolori hepatis qui est à flatuoso spiritu, fe-
bris superueniens est auxilio, utpote quæ flatum
dissoluat & discutiat sua caliditate. Ei verò qui
est ab inflammatione si febris noua superueniat,
tantum abest ut medeatur, ut plurimum etiam
obesse credatur adueniente calore calorem inflam-
mationis qui febrilis erat adiuigente.

L V.

Οἷοισι συμφέρεται αἷμα ἀφαιρέσθαι ἀπὸ τῆς
φλέβης, τετέοισι συμφέρεται εἶναι φλεβοτομήσθαι.

Quibus conuenit sanguinem ex venis de-
trahere, iis vere vena secanda est.

Repetitus est ex præcedenti scđt. aph. 47.

L V I.

Οἷοισι μεταξὺ τῆς φρενὸς καὶ τῆς γαστρὸς
φλέβης ἀποκλείεται, καὶ ὁδὸν παρέχεται
ἔχον διέξοδον εἰς ἐδιδέρκην τῆς κοιλίας, τετέοισι
καὶ εἰς φλέβας εἰς τὴν κύστιν τραπέντος ὁ φλέβης
περὶ λύσις γίνεται τῆ νόσου.

Quibus inter ventriculum & septum
transuersum pituita concluditur, dolorem-
que infert, utpote quæ ad alteram cauita-
tem

SECTIO VII.

269

tem exitum non habet, iis, per venas ad vesicam conuersa pituita, morbus soluitur.

Per locum in quo concluditur pituita, illud spacium laxius est intelligendum, quod est quidem infra septum, sed intra membrana abdominis interioris eam partem quae ad epigastrium attinet: Pituita igitur ibi conclusa cum dolore, ad venas per vias oculos fugientes, rursus à venis ad vesicam transferri à natura potest, prius sufficienter extenuata.

LVII.

Ουόσοισι αὐτὸ ἥπαρ ὕδατος πληθὲν εἰς τὸ ἐπίπλωμα ραγῇ, τετέοισιν ἡ κατὰ τὴν ὕδατος ἐρumpit ἄται, καὶ ἀποθνήσκουσιν.

Quibus hepar aqua plenum in omentum eruperit, iis venter aqua repletur, & moriuntur.

Si quando contingat vesicas aquosas quae circa iecur generantur, rumpi, aqua effunditur ad locum membrana abdominis interioris, ad epigastrium, in quo etiam aqua hydropicorum concinetur. Ad omentum autem non potest è ruptis illis vesicis aqua effluere, nisi ipsum aliquo modo excidatur: est enim solidum & firmum undique, ita ut nihil in ipsum incidere possit nisi ex ventriculo, colo intestino ac liene, illisq; partibus unde ipsum enascitur. Venter autem aqua impleri, non de illo ventre dictum est in quo cibi recipiuntur.

tur, sed de tota cavitate quæ est infra thoracem, secundum quod significatum ventrosi nominantur, & mulieres dicuntur gestare ventrem. Porro aqua ad eum locum effusa, moriuntur tum hitum hydropici, nisi per medicamenta purgantia humiditates superfluas, & præterea per epithemata, quæ vim habeant ciendi urinam, & in vapores soluendi talem humorem, beneficio naturæ & artis seruentur.

LVIII.

Ἀνξίη, χέσμη, φρίκη, οἷν & ῥοσ ῖσα πινόμεν & λυα τὴν νόσον.

Anxietudinem, oscitationem, horrorem, vinum æquali portione aquæ mistum epotum, morbum soluit.

Anxietudo illis evenire solet quibus in ore ventriculi humoris aliqua qualitas continetur ventriculo molesta, quam ipsa tunica imbiberunt. Oscitationes autem sicut & pandiculationes sunt in musculis ab humiditate flatuosa, vel spiritus vaporoso, quasi partium corporis distensiones. Horror autem pravis humoribus per cutem currentibus accidit. Singula hac vino æquali portione aquæ misto epoto percurantur. Vinum enim præterquàm quod omnes humores optimos reddit, calfacit totum corpus, & cetero monetur ad omnes partes.

LIX.

Οἵ ποισιν ἐν τῇ ἐρήτρῃ φύμα γίνεται, τῆς τοῖ-
σι ἀγρυπνίας τοῦ καὶ ἐκ τοῦ λυτοῦ, λύσις.

Quibus in vrinaria fistula tubercula na-
suntur, iis, suppuratione facta & eruptione,
solutio accidit.

Ob sermonis brevitatem nihil magni hoc ha-
beri aphorismo suspicabitur quispiam: facile enim
est unicuique intelligere, quod in meatu urinario
qui in pene est (hunc etenim meatum fistulam
urinariam nominant) si consistant tubercula, &
mox rumpantur, fieri solutionem. Verum si dili-
gentius animaduertimus, maius aliquid ex eo o-
stenditur. Contingit enim urinam aliquando re-
tineri ob tale tuberculum, ex cuius disruptione
sanitas proculdubio sequetur, doloris & suppres-
sionis urinae solutio.

Οἵ ποισι δὲ αὐτὸ ἀέτι κεφαλή σφαιρὴ ὑπὸ τῆς
προσώπου, ἀνὰ γὰρ ἀφ' ὧν καὶ τῆς ἀφ' ὧν.

Quibus cerebrum aliqua ex causa con-
cussum est, eos repente mutos fieri est ne-
cesse.

Mutos appellare consuevit, qui iacent eodem
modo quo apoplectici, sine sensu pariter & motu
voluntario. Hic affectus ab alijs quidem causis
fieri potest, sed nunc de eo loquitur qui concussio-

mem cerebri sequitur ab aliquo violento casu vel
ictu. Contrahitur enim vis animalis in seipsam,
in talibus dispositionibus à motu periculoso mo-
lestata, & proinde quiescit. Atque ideo donec se
rursus ipsa vis collegerit, mutum atque immobile
totum tacet quod ita afficitur animal.

L X I.

Τοῖσι σώμασι τοῖσιν ὑγρὰς τῆς σαρκὸς ἔχουσι δὲ
λιγὸν ἐμπόσειν. λιγὸς γὰρ ξηραίνει τὸ σῶμα τα.

Corporibus carnes humidas habentibus
famem adhibere conuenit : fames enim cor-
pora siccat.

Quod quidem omnia quæ exsiccant sint passio-
num humidarum remedia, est manifestum : Si-
quidem contraria contrariorum remedia sunt.
Quod autem & moderata fames ex accidenti
corpora exsiccat : est minimè dubium : nam calor
naturalis non habens quo pascatur, carniū hu-
miditatem absūmit.

L X I I.

Ἦν ἄν ποτε τοῦ ἐχρυσίου, ὁ τραχὺς ἐπιπρε-
φῇ, καὶ κρατύνειν μὴ δύναται, οἰδηματώσ μὴ εὐ-
τὸς ἐν τῷ τραχύῳ, θανάσιμον.

Si febre detento, nullo existente in fauci-
bus tumore, derепente suffocatio succedat,
nec nisi ægrè deuorare queat, lethale.

L X I I I.

Si febricitanti collum peruertitur, ut de-
uorare

uorare non possit, sine ullo colli tumore, exitiosum est.

Satis fuerat. 62. inseruisse, cum in 63. (cuius etiam textus græcus non habetur) idem prorsus tradatur: imò & impune (quemadmodum in plerisque codicibus factum) expungi ambo potuerunt, ut spurij.

LXIV.

Ὅτι αὖ ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαί, καὶ τὸ πῦρ καὶ ψυχῆται, & πάλιν θερμαίνεται ἢ ψαλμαί, ἑτέρου ἐξ ἑτέρου μεταβάλλει, μήκους νόσον σημαίνει.

Vbi toto corpore mutationes, & corpus refrigeratur, vicissimque calefit, aut colorem alium ex alio mutat, longitudinem morbi significat.

Hic aphor. est idem cum 40. sect. 4.

LXV.

Ἰσχυρὸς πολὺς θερμὸς ἢ ψυχρὸς ῥέων αἰεὶ σημαίνει ἔχον πλεονεξίαν ὁρῶν. ἀπαιτῶν οὐκ ἔστι τὰ μὲν ἰσχυρὰ, αὐτὰ δὲ αἰθερῆ, καὶ τὰ γεν.

Sudor multus, calidus vel frigidus, semper fluens, repletionem humorum esse significat: abducere igitur oportet, robusto quidem superne, debili verò, infernè.

Quòd ne essarium sit superfluas corporis humiditates vacuare, est manifestum. An verò robustis superne tantum, debilibus autem infernè, id di-

gnum est animadversione: nam hac ratione roboris, & debilitatis non videtur esse distinguendus remediorum usus, sed humores educendos esse quod sua sponte repunt, facileque vacuantur. ideo censetur hic Aphorismus unus ex adiectis.

LXVI.

Οἱ πυρετοὶ οἱ μὴ ἀλγέλλαντες ἢ ἰσχυροὶ ἢ ἀλγέλλαντες θύονται, ἐπικίνδυνοι, ὅτι ἢ αὐτοὶ περὶ ἀλγέλλανσι, συμπίπτει ὅτι ἀκίνδυνοι.

Febres non intermittentes, si tertia quoque die exacerbantur, periculosae: quoquo modo autem intermiserint, periculum abesse significatur.

Est idem cum aph. 43. sect. 4.

LXVII.

Οἱ ὅσοι πυρετοὶ μεγάλῃ, ταπτοῖσι φύματα ἐς τὰ ἄρθρα ἢ πόνοι γίνονται.

Quos diuturnae febres exercent, iis vel tubercula vel dolores in articulis fiunt.

Hic aphorismus est idem cum 44. sect. 4.

LXVIII.

Οἱ ὅσοι φύματα μεγάλα, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐκ πυρετοῦ γίνονται, ὅσοι σιτίσι πλείους χέρον.

Quibus longa tubercula, aut ad articulos, labores à febre fiunt, hi copiosiore cibovtiantur.

Idem cum 45. aph. sect. 4.

LXIX.

Ὡς τὰ πυρετοὶ τρεφῶν διδῶν, τὰ μὲν ὑγιάνουσι.

νοῦν ἰσχύς, τὸ δὲ καί μιν οὐκ ἐξ ὧν.

Si quis febricitanti cibum dederit, sano
quidem cibum est, laboranti vero morbus.

Vult dicere cibum sanis quidem augere robur,
morbum vero laborantibus, ita ut in febrienti-
bus ex duobus alterū necessarium esse videatur,
aut ut nutrientes, febrem augeamus, quia natura
ad cibi coctionem reuocata finit inualefcere mor-
bū: aut non nutriētes, vires dissoluamus, quæ cibo
foueri debēt: Hic utendum prouidenti coniectura, de
qua in undecimo aphorismis huius materia. Inter a-
dulterinos & supposititios est habendus hic aph.

L X X.

Τὰ Δ' αὖτ' κύριε Διχαρύνοντες ἀρχὴν δ' εἰς οὐρανὸν
τοῖς ὑμνήουσιν ὑποχαρύνονται. τὰ ἥκιστα ἐν ὁμοίᾳ
τῶν τέλει, ζῶντες νοσῶ δέ τε ἀθάνατοι. τὰ δ' ὁμοίᾳ τοῖς ὑ-
μνήουσιν, ἥκιστα νοσῶντες.

Quæ per vesicam excernuntur inspicere
oportet an talia sint qualia sanis excernun-
tur. Quæ igitur minimè similia sunt iis, hæc
morbosiora: Quæ verò sanis similia sunt, hæc
minimè morbosa.

Quicquid præternaturam est, quantum recessit ab eo quod est secundum naturam, tantam habet prauitatem. Urina dicitur optima quæ sanorum urinis simillima est, & quæ sedimentum album, leue, & æquale habet, significat salubrem securitatem, & morbum paulo tempore dura-

turum: Quæ verò contraria est, & nullam subsistentiam, aut aliam habet à supradicta, mala est, & cruditatem significat.

LXXII.

Οὗτοι αὖ καὶ τῶ αἵματι διαχωρέη, ὅτι χολῆς μελαίνης ἐνεστίν, καὶ πλεῖον, πλεῖον, καὶ ἐλάσσον, ἐλάσσον ἢ νοσήσας.

Quibus infra cruda deiciuntur, atra bilis inest: Si plura, maior: si pauciora, minor est morbus.

Huius scriptor voluit ostendere, quibus cruda deiciuntur, in ijs instrumentis quæ coquendi vim habent, esse atram bilem, ex qua refrigerata deterius concoquunt.

LXXIII.

Αἱ δὲ ποικίλεις αἱ ἐν ζῷσι πυρετοῖσι καὶ διαλείπουσιν πελιδναί, καὶ αἱματώδεις, καὶ δυσώδεις, καὶ χολώδεις, πάσαι κακῆ. Διαχωρῆσαι δὲ καλὰς, ἀγαθαί, καὶ καὶ εἰς διαχωρήσεις, καὶ καὶ εἰς ἄλλας. καὶ δὲ μετὰ τῇ συμφερόντων ἐκκρίνηται. καὶ τῇ ἑπὶ τῶν κακῶν.

Excretiones in febribus non intermittentibus, liuidæ, cruentæ, foetidæ & biliosæ, omnes malæ. Sed si prosperè excernuntur, siue per aluum, siue per vrinas, bonæ. Si verò aliquid eorum quæ non confert excerni, per hæc loca excernitur, malum.

Idem est cum aph. 47. 4. seq.

Τὰ σώ-

LXXIV.

Τὰ σώματα γὰρ ὅπου αὐτὸς βέλεται καὶ ταί-
ρειν, εὖ ὅρα ποιεῖν· καὶ μὴ αὐτὸς βέλεται, εὖ ὅρα
ποιεῖν, σήσῃ πλὴν καὶ ἡλίου· καὶ δὲ καὶ τῶν, ὅπου καὶ
Corpora cum suis

Corpora, cum quis purgare volet, fluxilia reddere oportet: Quod si supra fluxilia, reddere volet, alius sistenda est; si verò infra, humectanda.

Vide aphorismum 9 sectionis 2.

L X X V.

Υπὸ Θ, ἀντιστρίβ, ἀμφότερα ἔμετρίε μῆλλον
 ἡ δὲ ἀντιστρίβ, ἀντιστρίβ.

Somnus atq; vigilia, vtrumque si modum
excefferit, malum.

Idem est cum aph. 3.2. sect.

LXXVI.

Εν τοῖσι μὴ ἀγαλείπουσι πυρετοῖσιν, καὶ τὰ μὲν
ἐξ αὐτοῦ ψυχρὰ ἦ, τοῖ δὲ ἐνδοῦ καλεῖται καὶ διψῶν ἔχει.
θινάσκειν.

In febribus non intermittentibus si partes exteriores sint frigida, & interiores vrantur & sitim habeant, lethale est.

Idem cum aph. 48. sect. 4.

LXXVII.

Εν μὴ ἀφλείποντι πυρετῶ, ἡ δὲ χεῖλ Θ, ἡ ὀ-
φρὺς, ἡ ὀφθαλμὸς, ἡ εἰς ἀφραφῇ, ἡ μὴ βλέπη,
ἡ μὴ ἀκῆ, ἡ δὲ αὐτὴν ἐόντος ἔσθματος, ὅτε
αὐτὸς τῶν γινώσκται, ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν.

Si in febre non intermittente, labrum aut supercilium, aut oculus, aut nasus peruertatur, si non videat nec audiat imbecillo iam existente corpore, quicquid horum acciderit, mors in propinquo est.

Idem cum 49 sect. 4.

LXXVIII.

Ἐπὶ λευκαῖς φλέγμασι, ὕδρωψ ἐπιγίγνεται.

Albæ pituitæ aqua intercus superuenit.

Hic aphorismus est de incipiente specie hydropis, quæ leucophlegmatica dicitur; in qua (à frigida intemperie partium solidarum, ut hepatis propter quam sanguis aquosus generatur, quæ per carnosum genus effunditur, nec agglutinatur nec assimilatur) totum corpus tumet; venis, & totius corporis habitu, pituita repleta; unde cutis exalbescit, caro mollior est, ut viuidi coloris floperit. Ne ergo absolnatur hydrops, oportet eam pituitam purgare.

LXXIX.

Ἐπὶ διάρροϊᾳ, δυσεντερίᾳ.

A diarrhoea, dysenteria.

Vide aphor. 24. huius sect.

LXXX.

Ἐπὶ δυσεντερίᾳ, λιεντερίᾳ ἐπιγίγνεται.

Dysenteria, superuenit lienteria.

Pars est aphorismi 43. sect. 6.

Ἐπὶ σφίγγει.

LXXXI.

Επὶ σφακελισμῷ δόσασις ὀστέα.

A corruptione, ossis abscessus succedit.

Vtrum verò ad ossis an ad carnis circumstantis corruptionem sequatur ipsius ossis abscessus, non manifestavit. Vtrumque autem potest esse verum.

LXXXII.

Επὶ αἵματος ἐμέτω φθόη, καὶ πύξι καὶ θύρσι αἵω. ἐπὶ φθόῃ, ῥέυμα ἐκ τῆς κεφαλῆς. ἐπὶ τῷ ῥέσματι Διέρροια. ἐπὶ Διέρροϊᾳ χέσις τῆς αἵω καὶ θύρσι, ἐπὶ τῇ χέσει θάνατος.

Ex sanguinis vomitione tabes, & puris per superiora purgatio. Ex tabe, fluxio è capite: ex fluxione, alui profluuium: ex alui profluuiio, purgationis per superiora retentio: ex qua, mors.

Veteres ferè utebantur vocibus usitatis vulgo. Non enim sequitur tabes, etiam si sanguis euomat à ventriculo: sed bene sequitur à sanguinis spuitione à pulmonibus: hęc ergo confundit vomitum, qui generalior est, cum expuitione. At si in ipsa tabe, euomat sanguis, seu expuatur, est lethale: nam in tabe materia illa retenta, calefacit pulmones, & deinde cerebrum ipsum: quo calefacto, fit attractio ab universo corpore in caput, & illic acrimonia contrahitur. Si ergo materia illa, quæ à cerebro defluit, petat rursus pulmones,

augebit tabem, unde sanguis expuetur: si decum-
bat in ventriculum, excitabit vomitum sangui-
nis, aut diarrhoeam: Hipp lib. de morbis. ubi tra-
dit curationem tabidorum, prohibet ne aluum
molliamus, quia ubi commotum est alui proflu-
uium, natura non occupatur in purgatione ma-
teriae quae est in pulmonibus, quae si retineatur,
suffocabit egrum. HOLLERIUS.

LXXXIII.

Επὶ αἵματος πύσις, πύσις πύσις, καὶ ῥύσις. ἐπὶ
ᾧ σάλον ἴχνηται, ἀποθνήσκουσιν.

Ex sanguinis sputo, puris sputum & fluor:
ubi autem sputum retinetur, moriuntur.

Vide aphor. 15. huius secti.

LXXXIV.

Οἷον καὶ ἐν τῷσι καὶ πλὴν κύστιν, καὶ τοῖσι καὶ
πλὴν κυλίστιν υποχωρήμασι, καὶ ἐν τῷσι καὶ τοῖς σάρ-
καις, καὶ ὡς πη ἀπὸ τῆς φύσεως ἐκβαίνει τὸ σῶμα,
ὡς ὀλίγον, ὀλίγη ἢ νῆστος γίνεται. ὡς δὲ πολὺ,
πολλή. ὡς πάνυ πολὺ, κατὰ σίμωσιν τὸ τοιοῦτον.

Qualiscunque aut per vesicam, aut per
aluum, aut per carnem, aut per aliam quam-
vis corporis partem excretio recedens à na-
turae modo, si parum quidem recedit, parua
est agritudo: Si multum, magna: Si admo-
dum multa, lethalis.

Cum sanitas sit mediocritas quaedam, in om-
nibus corporis excretionibus parvus à natura
modo

modo recessus, vel in qualitate vel quantitate,
paruum quidem, & magnus magnum, sed admo-
dum multus lethalem morbum indicat.

Qui sequuntur, spurij sunt.

LXXXV.

Οἱ ὅσοι ἐπὶ τὰ τεσσαράκοντα ἔτη, φρενιπυρί-
ζονται, & πάνυτι ὑγιάζον. ὅσον γὰρ κινδυνέ-
ουν οἷσιν αὐτοῖς οἰκείῃ τῆς φύσεως, καὶ τῆς ἡλικίης
ἢ ἑξήσδε.

Quicunque supra quadraginta annos fiunt
phrenetici, non ita valde sani fiunt. minus
enim periclitantur quorum naturæ & ætati
morbus fuerit affinis.

LXXXVI.

Οἱ ὅσοι σιν ἐν τῇσιν ἀρρώσισιν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ
περὶ αἵρεσιν διακρύβουσιν, ἀγαθόν. ὅσοι σιν δὲ αὐτοῖς
περὶ αἵρεσι, κακόν.

Quibuscunque in morbis oculi illacry-
mantur ex voluntate, bonum. Quibus verò
contra voluntatem, malum.

LXXXVII.

Οἱ ὅσοι σιν ἐν τοῖς πυρετοῖσιν εὐδίσιν, αἵματι ἐκ τῆς
ἐνδὲν ῥυτῆς, πονηρόν.

Quibus in febribus quartanis sanguis ex
aribus fluxerit, malum est.

Ἰδρώτες ἐν τῇσι κρισίμοισιν ἡμέρησι γινόμενοι
σφοδροὶ καὶ πύχρεις, ἐπικίνδυνοι.

Sudores in diebus iudicatoriis oboriētes,
vehementes & veloces periculosi sunt.

Οἱ αἰθέρημοι ἐὰν ἔμετώπῃ, ὥσπερ παλαγγαί,
καὶ κρυνοὶ, καὶ ψυχροὶ σφοδρὰ καὶ πολλοὶ, ἀνάγκη
ᾧ τὸν ἰδρῶτα προέλθῃ μὲν βίης, καὶ πόνης ὑπερ-
βολῆς, καὶ αἰθρίας πολυζηνίς.

Qui expelluntur ex fronte, velut guttæ &
aquæ salientes: Et frigidi valdè ac multi:
necesse enim est talem sudorem prodire
cum violentia & doloris excessu ac expres-
sione diuturna.

Ἐν χρόνῳ νοσίου καὶ κλίης καὶ φόρη, καὶ ἐν.
Ex morbo diuturno alui defluxus, malum.

Οὐδ' αὖ φάρμακα εὖ ἰῆται σίδηρος ἰῆται, ὅσα
σίδηρος εὖ ἰῆται, πῦρ ἰῆται, ὅσα δ' πῦρ εὖ ἰῆται,
ταῦτα καὶ νομίζειν αἰάται.

Quæcunque non sanant medicamenta, ea
ferrum sanat, quæ ferrum non sanat, ea ignis
sanat, quæ ignis non sanat, ea incurabilia
putare oportet.



HIPPOCRATIS PRÆNOTIONVM

LIBRI TRES,

Græcè & La-
tinè,

*Cum explicatione ex Commentariis Ga-
leni sumpta per JO. BUTINVM
medicum.*

IO. BUTINI PRÆFATIO
in Prænotiones Hippocratis.



ETVS opinio est iam usque à
primis deducta temporibus, &
magno omnium gentium firmata
consensu, in mentibus hominum
esset tanquam oraculum aliquod,
ex quo futura presentiant. Quares, ut immor-
Z

talis Dei nos quodammodo similes efficit, eiusdem
 prudentia & rationis socios, ita ab aliorum a-
 nimalium natura, quæ quantum sensu mouen-
 tur, tantum ad id quod adest se accommodant,
 longius abducit: A quibus paulominus homo dif-
 ferret, si nihil animus eius præsentiens in poste-
 rum causas rerum earumque progressus, & quasi
 successiones ignoraret. Quapropter ut in semini-
 bus vis inest earum rerum quæ ex iis progignun-
 tur, sic in causis condita sunt tres futura, quas esse
 futuras aut concitata mens, aut somno soluta
 cernit, aut ratio aut coniectura præsentit. Nihil
 enim est futurum, cuius non causas id ipsum effi-
 cientes natura contineat: ex quibus quod eueniet
 qui intelligunt, prouidentes aut prudentes, quasi
 prouidentes appellati sunt: & Prouidentia inde
 dicta est, quæ quidem ex observatione eorum quæ
 diuturno usu notata fuerunt, ars præfagiendi fa-
 cta est. Nam sicuti Medici ex arteriis & spiritu a-
 groti, multisque ex aliis indicibus, & venientes &
 crescentes morbos intelligunt, & declinantes: A-
 strologi ex variorum syderum situ ac positione
 aliquid certo euenturum experientia compere-
 runt, ut tempestates, eclipses Solares, Lunares, &
 similes euentus: Gubernatores item cùm exultan-
 tes Loligines viderint, aut Delphinos se in por-
 tum conuocantes.

Aus

*Aut cū arguta lacies circumvolauit hirūdo,
Aut summanantes in aqua colludere plumas,
Aut Borea de parte trisulcis cū fulminat, &
cū*

*Euriq; Zephyriq; tonat domus,
tempestatem significari, longa id animaduersio-
ne edocti, putant, ideoq; tum ponto humida vela
legunt, nunquamq; imprudentibus imber obfuit.
Sic deinceps alij alia signa habent, quæ ad varias
rerum futurarum prænunciationes non immerito
obseruare censentur:*

*Cana fulix etenim fugiens à gurgite ponti,
Nunciat horribiles clamans instare procellas,
Haud modicos tremulo fundens è gutturo
cantus.*

*Sæpe etiam pertriste canit de pectore carmen,
Et matutinis acredula vocibus instat,
Cū primū gelidos rores Aurora remittit.*

*Verū ut in cæteris artibus coniectores, sic in
hoc posse falli concedimus: potest accidere, ut ali-
quod signum dubiè datum, pro certo sit acceptum:
potest aliquod latuisse, aut ipsum, aut quod esset
illi contrarium. Medicus morbum ingraue cen-
tem ratione præuidet: insidias Imperator: tempe-
states Gubernator; tamen ij ipsi sæpè falluntur,
qui nihil sine certa ratione opinantur. ut agrico-
la cū florem oleæ uidet, baccam quoque se visu-*

rum putat, non sine ratione ille quidem, sed nonnunquam tamen fallitur. In medicina cum sapius ipse respondeat euentus, interdum tamen fallit nos, & moritur aliquis, de quo medicus securus primò fuit: Et quæ medendi causæ reperta sunt, nonnunquam aliquid in peius conuertunt. Neque id evitare humana imbecillitas in tanta varietate corporum potest. Quòd si falluntur ij, qui nihil sine aliqua probabili coniectura ac ratione dicunt, quid existimandum est de coniectura eorum qui extis, aut auihus, aut somniis futura diuinant? Verùm ad agros, non vates, aut hario-los, sed medicos solemus adducere, quibus cum morbus ipse, differentia, partis afflicta natura, situs, & adiacentia cognita fuerint, multò certius philosophari datur, & à signis quæ in sensum cadant, ab excretis facili spiratione, leui tolerantia, bonitate pulsuum, somno minimè laborioso, facie simillima sanis, decubitu decenti, loco, tempore, &c. ad morbi cognitionem, hinc autem ad inuentionem remediorum via certa deduci contingit. Qua ex re factum est ut ea medicina pars, quæ ex signis quid futurum sit in morbis inuestigat, Semieictice dicta sit. Hac est qua præteritorum cognitionem, præsentium inspectionem, & futurorum prædictiones continet. Porro ut salutis aut boni signa prognostica sumit à facultatum corpus nostrum

nost-um dispensantium, vitalis, animalis, & naturalis, paruo in aegri recessu à statu ipsarum secundum naturam, & qui sanis ipsis inerat: Ita verò signa mortis aut mali à magno recessu. Recessum hunc indicant actiones dictarum facultatum, magis aut minus lese pro morbi magnitudine. Sed ne diutius in vestibulo simus harentes, propius accedendum, & de ijs ordine differens Hippocrates ipse audiendus est.



Prænotionum
lib. tres sic per
capita istin
guentur nam in
libro

Secundo
habet ea.

Tertio
scribit ca-
pita

- 6 De virg.
- 7 De vomitu.
- 8 De puerio.
- 9 De gravelline & servitatione.
- 10 De a se ssu
- 11 De d l re à vesica.
- 12 De signis q ius cognoscuntur parvulis.
- 1 De feb i us.
- 2 De dier m deterioriorum observatione.
- 3 De iudicio mulierum à partu.
- 4 De dolore capitis & faciem in febre.
- 5 De angina.
- 6 De gargillione i flammatione laborante.
- 7 De signis febrium non dierm na o loco affecto.
- 8 De vomitione sp nina.
- 9 De co n sione puerili.
- 10 De signorum in er se comparatione.
- 11 De signis in genere.
- 12 De signorum certitudine.
- 13 De quibus morbis sunt predicti cuncti

Primo
docet cap.

- | | | | | | | |
|---|---|----|---|-----------------------------------|--------------------------|--|
| { | { | 1 | { | { | 1 | Necessariam esse medico praenotionem, & praedictionem. |
| | | 2 | | | 2 | |
| | | 3 | | | 3 | Signa ex vultu. |
| | | 4 | | | 4 | Signa ab oculis. |
| | | 5 | | | 5 | Signa à decubitu aegri. |
| | | 6 | | | 6 | Decumbere in ventrem quàm malum. |
| | | 7 | | | 7 | Signa à fridore dentium. |
| | | 8 | | | 8 | Signa à ulcere. |
| | | 9 | | | 9 | Signa à gesticulatione manuum. |
| | | 10 | | | 10 | Signa à spiratione. |
| | | 11 | | | 11 | Signa à sudore. |
| | | 12 | | | 12 | Signa ab hypochondriis. |
| | | 13 | | | 13 | Signa à timore & à hypochondriis. |
| | | 14 | | | 14 | Signa à seppuratione. |
| { | { | 1 | 1 | De aqua interitura. | | |
| | | 2 | 2 | De somno. | | |
| | | 3 | 3 | De dietione. | | |
| | | 4 | 4 | De generibus malorum & gestionum. | | |
| | | 5 | | 5 | De praecordiorum dolore. | |



HIPPOCRATIS
PRÆNOTIONVM
LIBER PRIMVS.



Quàm sit necessaria prænотio predictiōne

CAPVT I.



ON ἰητρὸν δοκεῖ μοι ἄριστον εἶναι, πρὸ νοσούντων ἐπιτηδύειν. πρὸ γινώσκων γὰρ καὶ πρὸ λέγων παρὰ τοῖσι νοσέουσιν ἔτε παρ' ἐόντα, καὶ τὰ πρὸ γινώσκοντα, καὶ τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι, ὁ γὰρ σὺτε παραλείπουσιν οἱ ἀσθενέοντες, ἐκδιηγόμενοι τοῖσι νόσοις τ' αὖ μάλιστα γινώσκοντα τὰ τῆς νοσούντων πρὸς ἡμέραν, ὥστε ἔλθον ἐπιτρέπῃ τὰς ἀνθρώπους σφίσις ἐωυτοῖς τῶ ἰητρῷ. τίς γὰρ θεράπειον ἄριστα αὐτοῖς ποιεῖτο, πρὸς δὲ ἐσώμενα τῆς παθημάτων. ὅτι γὰρ μὴ γινώσκοντες πάντας τὰς ἀσθενέοντας, ἀδύνατον. τοῦτο γὰρ ἔστι πρὸς γινώσκοντα τὰ μέλλοντα ἀποδέσσειν, καὶ εἶναι αὐτῷ.

Medi-

Medicum uti providentia ut mihi vide-
tur optimum est. Prænoscent enim & præ-
dicent apud ægrotos, & præsentia, & præ-
terita, & futura, & quæ ægrotos prætereunt
exponens, fidem utique fecerit, quod ægro-
torum res magis cognoscat, quare audebunt
homines seiplos medico committere. At ve-
rò curationem optime fecerit, ubi prænoue-
rit futuras affectiones. Sanos enim facere
omnes ægrotos impossibile. hoc enim præ-
stantius esset quàm prænoscere in posterum
euentura.

CAP. II.

Ἐπεὶ δὲ οἱ ἄνθρωποι ἀποθνήσκουσιν, οἱ μὲν πρὶν
καλέσαι τὸν ἰητῆρα ὑπὸ ἰσχύϊ τῆς νόσου· οἱ δὲ, καὶ
ἐσκαλεσάμενοι, ὥστε ἡμᾶς ἐτελεύτησαν· οἱ μὲν,
ἡμέτερον μίλλω ζήσαντες· οἱ δὲ, ὀλίγον πλεονάζον-
τες, πρὶν ἢ τὸν ἰητῆρα τῇ τέχνῃ, πρὸς ἑκάστον νόσημα
ἐνταγωνίσασθαι· γνόντες οὐκ ἔχοντες τῶν παθόντων τῶν
ποιετέων τὰς φύσεις, ὁπόσον ὑπὲρ τὴν δύναμιν
εἰσι τῶν σωμάτων· ἅμα δὲ καὶ εἴπερ δεῖον ἐνεσιν ἐν
τῇσι νόσοις, καὶ τέττα τὴν πλεονοσίαν ἐκμανθάνειν·
ἔτι δὲ αὐτὸν θαυμάζοιτο τε διηγήσας, καὶ ἰητῆρας
ἀγαθὸς αὐτὸν εἶη καὶ γὰρ ὅς οἱόν τε περὶ γίνεσθαι, τεττα
ὅτι μάλλον δυνάει· αὐτὸς δὲ ὡς ἀφύλακτον, ἐκ
πλείονος χρόνου περὶ ἐλαστούμενον πρὸς ἑκάστην
καὶ τὰς ἀποθανεμένης τε καὶ σωτησμένης περὶ
νόσου τε καὶ περὶ ἀγασθῶν, αὐαίπερ αὐτὸν εἶη.

Quandoquidem homines moriuntur, alij priusquam medicum vocent, præ violentia morbi: alij etiam accito medico, derepente vita decedunt, quidam ubi vnam vixerunt diem, quidam tempore paulò diuturniore, ante quam medicus per artem aduersus morbos repugnet. Itaque nosse oportet, talium affectionum naturas quantum corporis vires excedunt. Simul verò etsi quid diuini in morbis inest, etiam huius prænotationem ediscere. Ita enim meritò admirationi fuerit, utpote ex multo tempore singula consultò perpendens, ac ita morituros victurósque præsentens atque denunciāns, omnem prorsus calumniam vitabit.

Providentia, dicta quòd aliquid antiè videatur quàm fiat, in anima est nostra, ut præsensio. Hæc prædictionem quæ per vocem efficitur, antecedit: Nam quæ in anima sumus opinati, ea demùm nos prædicere posse constat. Quis enim futura prædicere valeat, nisi ea præcognouerit? præcognoscimus autem ex iis quæ plerunque observata sunt: imbres siquidem siccitatésque, & frigora, & æstus, & ventos, quibusdam ex signis præsentiant etiam nauium rectores & rustici. Apud Vergilium rubens luna signum est venti: & cornicum garritus, obstreperaqué ranarum querela, pluvia.

pluvia. Denique quid vesp̄er serus rehat, unde
serenas ventus agat nubes: quid cogitet humidus
auster, Sol tibi signa dabit. Medici, si Hyems
squallida & aquilonia fuerit, Ver verò pluui-
osum, febres acutas Æstate fore coniectant, & a-
lia mala qua nos ob circumflui aeris causam in-
fistare solent, presentunt. Quare medicum (ut
pradicere possit exitum morborum, qui magna
ex parte causas ex qualitate cœli trahunt, aut ab
ambientu nos aeris conditione dependent) cœli
& temporis rationem tenere oportet. Hoc est quod
Hippocrates diuinum in morbis esse putauit.
Causa nimirum admirabilis, obscura, nec ullo
sensu comprehensa, ab ipso diuina nuncupatur,
qua toto confusa aëre ex primis qualitatibus non
constat, neque ex illis profisciscitur, sed cum sit su-
blimioris ac cœlestis cuiusdam originis, vim ad
progignendos morbos maximam habet. Ex ho-
rum atque similium præsensione prædictione ve-
existimans ager medicum agnoscere naturam
agrotationis, in spem erigitur, ac se exhibet obse-
quentem. Porro obsequio parentis agri, & consi-
lio benè monentis medici, facile dispellitur mor-
bus qui adest, aut qui futurus imminet præcaue-
tur, modò ne sit ita desperatus, ut nulla ope sana-
ri posse videatur: nam, ut ait Poeta,

Non est in medico semper releuetur ut ager,
Interdum medica plus valet arte malum.

Quare medicus naturam affectuum præsentiens,
ac inde reualituros aut morituros prædicens, non
solum à crimine intercepti agra vindicabitur, sed
ut fidus meritis commendabitur, omnesq; in ad-
mirationem sui concitabit.

De signis ex vultu.

CAP. III.

Σκέπειται ὁ χρῆν ὡς ἐν τοῖσιν ὁξείαι νοσήμασι,
πρῶτον μὲν τὸ πρῶτον ὅτι νοσέοντος, εἰ ὁμοίον ἐστὶ
τοῖσι τῶν ὑγιαίνοντων· μέγιστα δὲ, εἰ αὐτὸ ἐκινῆται.
ἔτι γὰρ αὐτὸ ἡ ἀεὶ ἐστὶν· τοῦ δὲ ἐναντιώτατον ὁμοίον,
δεινότατον. εἴη δὲ αὐτὸ τοῖον δὲ· ῥίς ὁξεία, ὁφθαλ-
μοὶ κοῖλοι, κροτάφοι ἐκτεταμένοι, ὡς ψυ-
χρὰ καὶ ἐκτεταμένα, καὶ οἱ λοβοὶ τῶν ὠτῶν ἀπε-
τραμμένοι, καὶ τὸ δέρμα τοῦ πρῶτον σκλη-
ρὸν τε καὶ περὶ τὸν μύρον, καὶ καρφαλέον ἐόν, ἐπὶ τὸ
χρῶμα δὲ ἐκτεταμένον πρῶτον χλωρὸν τε, καὶ καὶ
μυῖαν ἐόν, καὶ πελιὸν, καὶ μελιδωδὲς, καὶ μὴ οὐκ ἐν
δύσῃ καὶ ἐν ἑσπέρῃ, τοῦ πρῶτον τοῖον ἢ, ἐν μέντοι οἷον
τε ἢ τοῖσιν ἄλλοις σημείοις· ἐκτεταμένον, ἐ-
πινέμεναι χρῆν, καὶ ἡ χροὺς πησεν ἀνθρώπος, καὶ τὰ τῆς
κοιλίας ἐκτεταμένα καὶ ἰσχυρά, καὶ λιμὰδες πᾶσι
αὐτόν. καὶ μὴ πᾶσι τετέων ὁμολογῇ, ἥσον νομίζον
δεινὸν εἶναι. κρινεται ὁ πᾶσι ταῦτα ἐν ἡμέρῃ τε καὶ
νυκτὶ, καὶ ἀπὸ τούτων τὰς πρῶτας τοῦ πρῶτον
τοῖον ἢ. καὶ δὲ μηδὲν τετέων φησὶν εἶναι, καὶ δὲ ἐν
ταῖς

τῷ χρόνῳ τῷ περιηρημένῳ κατὰ τὴν εἰδέναι χρὴ
 ἐκ τῆς εἰδέναι τῆς θανάτου. ὡς δὲ καὶ παλαιότερον εἰδέναι
 τὸ νοσήματος, ἢ τελευτῆς, ὅτε πρὸς τὸν θάνατον
 ἢ, ὡς τῶν ἐπαινέων, ὡς ἂν καὶ πρὸς τὸν
 ἐκείλῳ, καὶ τὰλλα σημεῖα σκέπτεται, ὅτε ἐν
 τῷ ζύμπαντι πρὸς τὸν θάνατον, ὅτε ἐν τῷ σώματι, καὶ τὰ
 ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς.

Considerare porro hoc modo conuenit
 in morbis acutis: Primum quidem faciem
 ægroti, sit ne similis sanorum, maximè verò
 an ipsa sibi ipsi, ita enim optima fuerit: Si ve-
 rò maximè contraria simili fuerit, horren-
 dissima est. Talis autem fuerit: nasus acutus,
 oculi concaui, tempora collapsa, aures frigi-
 dæ ac contractæ, & extremitates earum a-
 uersæ, & cutis circa frontem dura, & circum-
 tenta, ac arida, & color totius faciei palli-
 dus, aut etiam niger, aut liuidus, aut plum-
 beus. Siquidem igitur in principio morbi
 facies talis fuerit, & nondum ex aliis conie-
 cturam facere licuerit, interrogare oportet,
 num vigilauerit homo, aut alui excrementa
 valde liquida sint, aut fames aliqua ipsum
 teneat. Et si quidem horum aliquid confi-
 teatur, minus graue esse putandum est: no-
 dicantur autem talia per diem ac noctem, si
 ob has causas facies talis fuerit. Si verò nihil

ψιες αὐχμῶσι καὶ ἀλαμπείς, ἢ τὸ χρῶμα ὁ ξύμ-
παντες θεωρῶντες ἢ κλοιομῶν ἢ, αὐτὰ πάντα κα-
καὶ νομίζουσιν, καὶ ὀλέθρια εἶναι. Σκοπεῖν ὅμως καὶ τὰς
ὕποφάσεις τῶν ὀφθαλμῶν ἐν ταῖς ὑπνοῖσι. ὡς
γὰρ ἐν ὑποφάνηται ὁ λευκός, τῶν βλεφάρων καὶ
ξυμδακρυμῶν, καὶ ἐν ἀφάρροις, ἢ φαρμακο-
ποσίας εἶναι, ἢ καὶ εἰδοσμῶν ἔγωγε καθόδην,
φλαυρῶν τὸ σημεῖον, καὶ θανατῶδες λίαν. Ἡν δὲ
καμπύλον ἢ ῥικνὸν ἢ ῥύνην, ἢ πελιὸν, ἢ ὠχρὸν βλε-
φαρῶν, ἢ χεῖλ. ὅ, ἢ ῥίς, μετὰ πιν. ὅ τῶν ἄλλων ση-
μείων, εἰδέναι καὶ, ἐκ τούτων εἶναι θάνατον. Θανα-
τῶδες δὲ καὶ χεῖλεα δακρυμῶν, καὶ κρεμνισμῶν
καὶ ψυχρὰ, καὶ ἐκλυση γινώμενα.

Si enim lucem fugiant, aut inuoluntariè
illacryment, aut distorqueantur, aut alter
altero fiat minor, aut albas partes rubentes
habeant, aut venulas liuidas aut nigras in
ipsis habeant, aut sordes circa oculos appa-
reant, aut etiam instabiles, aut eminentes,
aut caui vehementer facti, aut squallentes
& obscuri fuerint, vel totius color euariet
vultus: hæc omnia mala & perniciofa esse
putandum est. Considerare verò conuenit
etiam oculorum subapparitiones in som-
nis. Si enim albæ quid partis subapparuerit
palpebris non commissis, si id non ex alui
profluuiò, aut medicamento potione fuerit,
aut ægrotus non ita dormire consueuerit,

malum signum & valde lethale est. Lethale etiam si contracta fiat palpebra, livida, aut pallida, si labia aut nasus resoluta & pendentia, & frigida, & albicantia facta sint cum aliquo ex aliis signis, morti proximum esse sciendum est.

Hæc indicia sumpta ab oculis pessima quidem sunt, omnia si concurrant, mala etiam singula, sed pro quantitate contrarietatis minus aut magis exitiosa censi debent. Oculorum etiam album commissis palpebris apparens inter dormiendum, exitium præ se fert, extremam enim imbecillitatem facultatis, palpebras mouentis ostendit. Quidam simile conijci potest ex contracta palpebra & labijs.

Decubitus ægri.

CAP. V.

Κεκλιμένον ὃ χρὴ καταλαμβάνεσθαι τὸν νόσον-
τι ὑπὸ τῆς ἡτέρας, ἐπὶ τὸ πλεονέχον τὸ δεξιόν, ἢ τὸ ἀ-
ριστερόν, καὶ ταῖς χεῖρας, καὶ τὸν τράχηλον, καὶ τὰ σκέ-
λεα ὀλίγον ἐπικεκλιμένα ἔχοντα, καὶ τὸ ἔμπαν
σῶμα ὑγρόν κείμενον. ἔτω γὰρ καὶ οἱ πλείστοι τῶν ὑ-
γιαίνόντων κατὰ κλίνοινται.

Αἰσθάνει δὲ εἰσι τῶν κατὰ κλίσεως αἱ ὁμοιαι τῆσι
τῶν ὑγιαίνόντων ὑπὸν ὃ κείσθαι, καὶ ταῖς χεῖρας, καὶ
τὸν τράχηλον, καὶ τὰ σκέλεα ἐκτετακμένα ἔχοντα,
ὥσπερ ἀγὰρον.

Εἰ δὲ

Εἰ δὲ καὶ περὶ τοῦτο, καὶ καὶ ἄλλοι ἀπὸ τῆς
κλίνης ἐπὶ πόδας, εἰ δὲ ὁ πόρῳ ἐσιν.

Εἰ δὲ καὶ γυνὴς τὰς πόδας δὲ εἰσποιοῖτο ἔχων καὶ
θερμὰς καὶ ἄλλας ἐόντας καὶ τὰς χεῖρας, καὶ τὸν πρὸς ἄκρη-
λον, καὶ τὰ σκέλεα ἀνωμόλως διερρίμματα καὶ γυ-
μονά, καὶ ἄλλοι ἀλυσμὸν γὰρ σημαίνει.

Θανατῶδες δὲ, καὶ τὸ κακὸν ὅτι καὶ θεύδειν αἰεὶ, καὶ
τὰ σκέλεα ὑπὸ τῆς κλίνης ἐν τῇ καμνίᾳ εἶναι ἰσχυ-
ρῶς, καὶ ἀπὸ τῆς κλίνης.

Decumbentem aegrotum a medico depre-
hendi conuenit, in latus dextrū aut sinistrū,
& manus, & collum, & crura modicè inflexa
habentem, & totum corpus flexibile sicuti.
Ita enim plurimi ex sanis decumbunt.

Optimi autem sunt decubitus qui sano-
rum decubitibus similes existunt. At verò
supinum iacere, & manus, & collum, & cru-
ra extenta habere minus bonum est. Si verò
etiam pronus fiat, & de lecto ad pedes dela-
batur, magis horrendum est.

Si verò nudos quoque pedes habere com-
periatur, nec admodum calidos: & manus,
& collum, ac crura inaequaliter deflecta, ac
nuda, malū est. anxietatem enim significat.

Lethale autem est, & hiantem semper
dormire: & crura supini iacentis valde in-
curuata esse ac complicata.

Aa

Decubitus in latus, robur indicat facultatis per musculos firmantis corpus, quomodo rursus debilitatem, ubi cubare in latus non possit ager. Quam in re quæ peculiaria sunt agrotis, consideranda. Si enim offendas agrum ut plerisque bene valentium vsuuenit, cubantem, laudabis talem iacentis habitum: Si verò contrario modo reparias decumbentem, non convenit statim horrere quasi malum indicium, sed requirere utrum in consuetudine sit talis agro figura. Nam consuetæ cum in naturam penè transierunt, ea ut minus efficere solent, ita non ad id magnum malum portantur: Quamvis extentis & manibus, & cruribus, supinus qui cubet, non possit alicuius boni significationem ullam exhibere, minorem, qui de lecto ad pedes devolvitur, & qui manus & pedes disjicit, aut hianti ore dormit, tunc enim significatur extinctio quadam facultatis corpus regentis.

In ventrem decumbere quàm malum sit.

CAP. VI.

Ἐπὶ γαστέρι δὲ κεῖσθαι, ὃ μὴ σωήτης ἐστὶ καὶ ὑγιαίνοντι ἐπὶ τοῦ κοιμῆσθαι, καὶ φροσιώλω ἵνα σημαίνει, ἢ ἐπὶ ὡλῶ τῆς ἀμφὶ τὴν κεφαλὴν ἔπων.

Ἀναγκαῖον δὲ ὅτι βλάπτει τὸν νοσέοντα, τῆς νέου ἀκμασσοῦς, πονηρὸν μὲν εἰ πάντες τοῖς ὀξέσι νοσήμενοις κεῖσθαι ἐν τοῖς ἀσθενέσι δὲ μὴ νοσήσιν.

At

At in ventrem decumbere, si quis non sit adfuetus dum sanus fuit, ita dormire, delirium significat, aut dolorem locorum circa ventrem.

Cæterum erectum sedere velle ægrum, in morbi vigore, in omnibus morbis acutis malum est: pessimum autem in peripneumoniacis.

Cubare in ventrem contra consuetudinem aut delirium significat, aut dolorem quandam qui circa tales partes fatiget. Cæterum in morbi vigore cum ament omnes acuto morbo laborantes immoti cubare, & si quis eos excitet, agere ferant, arbitrare propter vehementem spirandi difficultatem, aut inquietationem, aut delirium, ægrum postulare ut erectus sedeat.

Stridor dentium in febribus quid portendat.

CAP. VII.

Οδόντες ὅτι πρίν ἐν πυρετοῖσιν, ὁκρόσοι μὲν ζυγῆδες ἐστὶν ἀπὸ πύδων, μακρὰν καὶ θανατῶδες, καὶ ἀσθενῆς ἀπὸ ἀμφοῖν κίνδυνον ἐσόμενοι, καὶ ὅτι καὶ ἀσθενέων τὸ ποιεῖν, ὁλέθριον γίνεται ἤδη.

Dentibus stridere in febribus quibus non familiare id est à pueris, furiosum ac letale est. Verum prædicere oportet ab utrisque

periculum futurū. Si verò etiam delirus hoc faciat, perniciosum valde iam existit.

Dentium stridor in febribus vel à mentis vehementi commotione, qua futuri delirij est indicium, vel ab affecta nervorum origine existit, qua mortem propè esse demonstrat, atq; eò magis si cum stridere præsens concurrat delirium.

De signis ex ulcere.

CAP. VIII.

Ελκος ὃ ἢ τε καὶ πρὸ γεγενῆστος τύχη ἔχων, ἢ τε καὶ ἐν τῇ νόσῳ γίνηται, καὶ ὡς μακρὸν δὲ ἢ ὥς μέλαινα ἀπὸ πύλου ὁ αὐτῶς, πρὸ τῆς θανάτου, πελιδνὸν τε καὶ ξηρὸν ἔσται, ἢ ὡς ἄλβον τε καὶ ξηρὸν.

Ulcus autem siue prius factum fuerit, siue in morbo accesserit, considerare oportet. Si enim moriturus est homo, ante mortem lividum ac siccum erit, aut etiam pallidum & siccum.

Facultas corpus nutriens si debilis habeatur, siccum relinquetur ulcus, nec ullus color in eo certus manebit, sed pro diversitate humorum redundantium enariabit, à bilioso croceum, ab atrabiliario lividum aut viride erit, sicut à pituita pallidum.

Gell.

Gesticulatio manuum quid significet.

CAP. IX.

Περὶ τῶν χειρῶν φορῆς, τίςδε γινώσκω· ὁκρόσισιν
 ἐν πυρετοῖσιν ὀξείσιν, ἢ ἀειπλούμενίῃσιν, ἢ ἐν
 φρενίπσιν, ἢ ἐν κεφαλαλγίῃσι, πρὸς τὸ πρῶτον
 φεγγυῖας καὶ θηροδύσας ἀπὸ κενῆς, καὶ ἀποκαρ-
 φολογύσας, καὶ κερνίδας ἀπὸ τῶν ἰματίων ἀποκλ-
 λύσας, καὶ ἀπὸ τῶν χεῖρας ἀχρῶν ἀποσώσας, πᾶσας
 τῶν κακῶν καὶ θανάτῳ δέας.

At verò de manuum motione ita sentio,
 quæ in febris acutis, aut peripneumoniis,
 aut in phrenitide, aut capitis dolore, ante
 faciem feruntur, & frustra venantur, & fe-
 flucas legunt, & floccos de vestibis euellūt,
 & de pariete paleas detrahunt, eas omnes
 malas & lethales esse.

Gesticulationes manuum deprauatæ ob ima-
 ginationem fiunt, illi similem quæ per suffusio-
 nes oculorum contingit. Fit enim ut per cruditates
 exhalantibus ad caput humoribus crassis, vi-
 sa quedam appareant: Si enim restitit humor
 crassius, aut niger, prohibens digredi foras viso-
 rium splendorem, ibi visa pro natura humoris
 consistunt, quæ interdum pilorum aut subtegmi-
 nis, aut staminis, quandoque culicis, aut muscæ
 ob os volitantis, aut lentis, aut milij, aut festu-
 carum speciem representant. Humor enim in

oculo mundus concipit illam exhalationem, qua
ubi perturbatur, non mirum si visa appareant,
que non nisi crudelitatem humorum, morbi ma-
gnitudinem, & natura perturbationem conse-
quuntur.

Spiratio.

CAP. X.

Πνέυμα ὃ πυκνὸν μὲν ἔσθ', πόνον σημαίνει, ἢ φλε-
γματικὸν ἐν τοῖσιν ὑπὲρ τῆς φρενὸς χωρίοις μέγα
ὃ ἀναπνεόμενον καὶ ἀπὸ πολλοῦ χρόνου, ὡς φρε-
σιν δὲ δεικνύει. ψυχρὸν δὲ ἀναπνεόμενον ἐκ τῆς ῥινὸς
καὶ τῆς στόματος, ὁλεθρὸν κέρτα ἤδη γίνεται.

Εὐπνοίαν δὲ καὶ νομίζειν κέρτα μεγαλύτερον
διώκειν ἔχειν εἰς σωτηρίαν ἐν ἡμέραις τοῖσιν ὅξέσι
νοσήμοισιν, ὅσα ξυμπεριτοῖσιν ἐστὶ, καὶ ἐν περὶ α-
ργήσονται ἡμέρησι κείνῃ.

Spiritus densus dolorem significat aut in-
flammationem, in locis supra septum trans-
versum: qui verò magnus expiratur, & per
multum temporis intervallum, delirium
indicat. Si verò frigidus è naso & ore expi-
retur, valde iam perniciosus est.

Bonam autem spirationem valde ma-
gnam vim habere ad salutem, in omnibus
acutis morbis putare convenit, qui cum fe-
bribus sunt, & in quadraginta diebus iudi-
cantur.

Spi-

Spiratio frequens & eadem parua, significat
dolorem: crebrior autem, & magna, inflamma-
tionem etiam partium supra septum transuer-
sum positarum, quæ sunt cor & pulmo. At verò
rara spiratio, hoc est, multò interposito tempore
facta, si magna est, indicat delirium, quasi obli-
vifcente actionum ager: Si parua, adeo ut sensum
effugiat, extinctionem caloris naturalis: quod
percipietur ex habitu frigide oris & narium. In
summa, spirandi facilitas optimum cùm ubique
præbet indicium, tum præsertim in acutis. Spira-
tione siquidem integra manente, nativus calor
superesse demonstratur, qui solus vel à medico
adiutus, urgenti malo repugnare sufficiat.

Sudores.

CAP. XI.

Οἱ δὲ ἰσχυροὶ, ὅσοι μὴ εἰσὶν ἐν πύσιν τοῖς ἰ-
σχυροῖς νοσήμασιν, ὅσοι ἐν ἡμέρησι τε κρισίμασι
γίνονται, καὶ τελείως τὸν πυρετὸν ἀπαλλάττειν.
ἀγαθοὶ δὲ καὶ ὅσοι ἀπὸ παντὸς τοῦ σώματος γι-
νόμενοι, ἀπὸ δειξάντων τὸν αὐτὸν πυρετὸν φέ-
ρονται τὸ νόσημα. οἱ δὲ αὐτὸν μὴ τοιοῦτον πύσιν, καὶ
ἐλυσσιν τελέειν καὶ οἱ ψυχροὶ τε καὶ μετὰ
τὸν πυρετὸν γινόμενοι, καὶ τὸν αὐτὸν πυρετὸν
ἀπαλλάττειν. καὶ οἱ δὲ ἐν πύσιν γινόμενοι, καὶ
τὸν αὐτὸν πυρετὸν ἀπαλλάττειν.

Sudores optimi sunt in omnibus acutis
morbis, qui in diebus iudicatoriis sunt, &

febrem perfecte submouent. Boni verò sunt, qui per totum corpus fiunt, & hominem facilius morbum ferre faciunt. Qui verò tale quid non effecerint, incommodi sunt. Pessimi autem sunt frigidi, & qui tantum circa caput & faciem fiunt, & circa ceruicem. Hi enim cum acuta quidem febre mortem præsignificant, cum mitiore verò longitudinem morbi.

Sudor post coctionem in die decretorio medicæ calidus, ex toto manans corpore per cutis spiracula, solutarius est, aut huiusmodi, ut ex eo melius habeat ager: huic diuersus non est utilis. Frigidus autem sudor, qui sic è corpore fluit, crassitiem materiae quæ non facile discuti, aut à calore vini queat, præ se fert: ideoq; longitudinem morbi, si cum mitiori est febre: si verò cum acuta, mortem significat.

Signa ex hypochondriis.

CAP. XII.

Υποχόνδριον δὲ, ἄριστον μὲν, αὐτὸ δ' αὖτὸν τε εἶναι, καὶ μελαγχρὲν καὶ ὀμφαλὸν, καὶ ἐπὶ δεξιᾷ, ἢ ἐπ' ἀριστερᾷ. φλεγμονὴν δὲ, ἢ ὀδυνῶν περιέχον, ἢ ἐν τετραμήριον, ἢ ἀνωμάλως διγυκείδονα τὰ δεξιὰ πρὸς τὰ ἀριστερὰ, ταῦτα πάντα φυλάσσειν καὶ εἰ δὲ καὶ σφυγμὸς ἐν εἴῃ ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ, φόρυδον σημεῖον, ἢ πρὸς φρεσίν.

Ἀλλὰ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἐπιχειρῶν καὶ τοῦ
τέων

πῶν· ὡς δ' αἱ ὀφθαλμοὶ κινῶνται, μὲν ὡς
τὰς ἐλπίς.

Hypochondria saluberrima sunt si dolore vacant, si mollia & æqualia sunt dextra ac sinistra parte. Si verò inflammatione vexantur, aut dolore, aut intenta sunt, aut inæqualiter affecta dextra ac sinistra parte, hæc omnia animaduertenda sunt. Si verò pulsus in hypochondriis insit, perturbationem significat aut delirium. Verum oculos talium intueri oportet, si enim oculi frequenter moueantur, furiosos hos fore timor est.

Docet quid medico prædicendum sit ex hypochondriis, aut natura simillimis, aut iisdem inflammatione tentatis, mollibus, intentis & renitentibus, atque aded inæqualiter affectis, opponendo saluberrimis pessimorum & inæqualium signa. Nam ut censentur salubria quæ sunt natura similia, sic tantò sunt deteriora quantò magis à natura similitudine recedunt. In horum regione pulsantes subsultantes ve arteria, perturbationis aut delirii periculum adesse denunciant: Quod magis pro certo firmabis, si oculi vagi appareant & instabiles.

Tumor in hypochondriis.

CAP. XIII.

Οἱ δὲ μὲν ἐν τῇ ὑποχονδρίᾳ σκληρὸν τε εἶναι καὶ

ἐπὶ δ' ὡς, καὶ κίτον μὲν, εἰ ὅτε πᾶν εἴη τὸ ὑποχόν-
δριον. εἰ δ' εἴη ἐν τῷ ἐτέρῳ μέρει, ἀκινδυνότερον
ἔστιν ἐν τῷ ἐπ' αἰσθερά.

Σημαίνει δ' τὰ τοιαῦτα οἰδήματα, ἐν ἀρχῇ μὲν
θανάτον ὀλιγοχρόνιον ἔσεσθαι. ὡς δ' ὑπερβολὴν εἰ-
ρησιν ἡμέρας ὅ, τε πυρετὸς ἔχων, καὶ τὸ οἰδήματι μὲν
καθίσταται, ἐς ἀπύνησιν τρέπεται.

Γίνεται δ' τετέοισιν ἐν τῇ πρώτῃ φασίδῳ, καὶ
αἵματος ῥῆξις ἐν τῷ ῥινῶν, καὶ κίετα ὠφελεία.

Αἱ ἐπανερωπῶν χροῖ, εἰ τὴν κεφαλὴν αἰλίσ-
σιν, ἢ ἀμυλωποῖσιν. ὡς γὰρ πεισιστον εἴη, ἐν-
ταῦτα ῥέπει. μάλλον δ' τοῖσι νεωτέροισι πέντε καὶ
τετρήκοντα ἔτεων, τὴν δ' αἵματος ῥῆξιν παρὰ τὸ
χεῖρ.

Τὰ δὲ μαλθακὰ τῶν οἰδημάτων, καὶ ἀνώδυνα, καὶ
τῷ δακτύλῳ ὑπεκκινῶν, χρονιωτέρως τοῖς κείνοις
ποιέεται, καὶ ἥσον ἐκείνων δεινότερα ἔστιν. εἰ δ'
ὑπερβολὴν ἐξήκοντα ἡμέρας, ὅ, τε πυρετὸς ἔχων, καὶ
τὸ οἰδήματι μὲν καθίσταται, ἐμπύον ἔσεσθαι σημαίνει.
καὶ τοῦτο, καὶ τὸ ἐν τῇ ἄλλῃ κελίῃ καὶ τῶν τῶν. ὁ-
σα μὲν οὐκ ἐπὶ δυνά τε ἔπ, καὶ σκληρὰ, καὶ μεγά-
λα, σημαίνει κίνδυνον θανάτου ὀλιγοχρόνιον. ὁ-
σα δ' μαλθακὰ τε καὶ ἀνώδυνα, καὶ τῷ δακτύλῳ
πιεζόμενα ὑπεκκινῶν, χρονιωτέρως ἐκείνων.

Τὰς δ' ἀποστάσεις ἥσον τοῖς ἐν τῇ γαστρὶ οἰδήμα-
τι ποιέεται, καὶ ἐν τοῖσιν ὑποχονδρίοισιν ἡκιστα δ'
τὰ ὑποκρίτω δ' ὀμφαλῷ εἰς ἀπύνησιν τρέπεται.
αἵματος δ' ῥῆξιν ἐν τῇ αὐτῇ ἔκπῳν μάλιστα παρὰ
δεχέσθαι.

Απὸν-

Απάντων ὅ γ' ἡ τῶν οἰδημάτων χρονιζόντων πρὸς
 ταῦτα τὰ χεῖρα, ὑποσκέπτειται τὰς ἐκφυήσας. τὰ δ'
 ἀπὸ πύμαται ὡς δ' εἰ σκέπτειται, τὰ ἐν τῷ στήθεϊ. ὁ γ'
 στήθεϊ ἔξω τρέπεται, ἄριστά ἐστι, μικρότερον ὄντα, καὶ
 ὡς μέγιστα ἐκκλίνοντα ἔξω, καὶ ἐς ὅξυ δ' ὑποκυρ-
 τήματα. τὰ δὲ μεγάλα τε ὄντα καὶ πλατέα, καὶ
 ἥκιστα ἐς ὅξυ δ' ὑποκυρτῆματα, καί κ' ἴσα. ὅσα δ' εἴσω
 ῥήγνυται, ἄριστά ἐστιν, ἀμειδὲν τὰ ἔξω χεῖρα ἐπι-
 κρινανέει, καὶ ἔστι παρὰ τὸ λυγρὸν καὶ ἀνώδυνα, ἐ-
 πὶ τὸ ἔξω χεῖρον, ὁμώχρως φαίνεται.

Tumor in præcordio durus existens &
 dolorosus, pessimus quidem est si per totum
 fuerit præcordium: si verò fuerit in altera
 parte, minus periculosus est in sinistra.

Significant autem eiusmodi tumores, in
 principio quidem, mortem breui affuturam:
 si verò viginti dies transgrediatur, tum fe-
 bris detinens, tum tumor non confidens ad
 suppurationem conuertitur.

Contingit autem his in primo circuitu,
 etiam sanguinis eruptio e' natibus, & valde
 prodest.

Verum interrogare conuenit, an caput
 doleant, aut hebetem visum habeant. Si
 enim horum quid fuerit, ad eum locum re-
 nit. magis tamen in iunioribus v. ac x. an-
 nis sanguinis eruptionem expectare con-
 uenit.

Molles verò tumores, & doloris expertes, & digito cedentes diuturniores iudicationes faciunt, & minus illis sunt horrendi. Si transgreditur LX. dies febris detinens, & tumor non confidit, suppuraturum significat & hunc & eum qui in reliquo ventre est eodem modo. Qui igitur tumores dolorosi sunt, duri, & magni, periculum mortis breui affore significant: at qui molles, & doloris expertes sunt, & digito compressi cedunt, diuturniores illis sunt.

Cæterum tumores in ventre minus faciunt abscessus, iis qui sunt in præcordiis. Minimè verò qui sub vmbilico sunt ad supurationem conuertuntur. at sanguinis eruptio, ex supernis locis maximè expectanda.

Omnium autem tumorum diuturnorum circa hos locos, suppuratio consideranda. Sunt autem suppurationes, quæ hinc fiunt, hoc modo considerandæ: quæ extra vertuntur, optimæ sunt, ex quibus parvæ, & quam maximè foras eminentes, & in acutum fastigiata: quæ verò magnæ sunt, & latæ, & minimè in acutum fastigiata, ex pessimæ: quæ verò intro rumpuntur, optimæ sunt, quæ nil cum externo loco communicant: sed sunt contractæ, & sine dolore, & totus externus locus concolor apparet.

Tumor

Tumor in hypochond. ijs præter naturam, cum dolore quem phlegmonem appellant, si dextra affligat parte, periculosior est, propter hepar: mitior, si sinistra, propter lienem: exitiosissima si utraque lacessit: adeo ut si intimum aliquod inde viscus afficiatur, vita non sit in tuto. Mollis autem tumor, nec dolens, quem œdema vocant, diutius immoratur, quia frigidior est: Calore enim concoctio perficitur, sed minori cum periculo est, quia dolore vacat, dolor siquidem vires exoluit. Verum ut calidiorum illum tumorem dolentem si febris non desinat vigesimo die, in suppurationem verti dicit: ita huic frigido, suppurationis limitem ponit sexagesimum diem. Si qui sint inter hos medij tumores, quadragesimum diem habent terminum suppurationis suæ. Suppuratio verò non est aliud quam tumoris aut inflammationis ad pus transmutatio, quæ quia multiplex est, ea minus mala censetur, quæ foras non intrò tendit, quæ non in multam est latitudinem extenta, quæ in sublimem effertur coniformam referens, hæc enim robur foras expellens indicat facultatis: Quæ autem intrò rumpitur, deterior est omnino quam quæ foras ad cutim movetur: hæc enim ruptio intrò in partes nobiliores fit, non facile medicamentum admittit, pus secretum mordicat internas partes, committit intestinum difficultatem, alimonia vitiat diductionem,

atque ventriculi concoctionem debilitat. Mala quidem est hac suppuratio: sed ea quæ introrsum rumpitur, atque extrorsum cum malum habeat geminatum, aliis omnibus est deterior.

De signis puris.

CAP. XIV.

Τὸ δὲ πῦον, ἄριστον λευκόν τε εἶναι, καὶ ὁμαλόν, καὶ
λεῖον, ὅς τις ἤκιστα δυσώδες. ὃ δὲ ἐναντίον τῆς
καρτικῆς.

Pus optimum est album, læue, æquale, & quàm minimè graueolens: quod verò huic contrarium est, pessimum est.

Tres in corpore humano sunt alterationes: Vna exquisitè secundùm naturam, qua cibi in cremorem nutritioni aptum vertuntur: Altera contraria huic, præter naturam, qua computrescunt omnia, & sanguis (deiecta à fluxione natura) in peregrinam quandam qualitatem peruenit, unde abscessus mali, corruptela partium & mortificationes: At tertia, qua suppuraciones comitatur & pus generat, medium inter has obtinet locum, neque à solo calore extra naturam, neque à solo secundùm naturam facta: Mixtus enim ex utroque est calor inflammationis, & pus ex fluore seminali sanguinis ortum habes ipsum, nec ex materia prorsus benigna peragitur, nec etiam omnino aliena. Nam materia illa sanguinea, ex qua in puris generatione assimilationem molitur natura,

tura, aliquid habet quod substantia similitudine effici potest familiare, cuius ratione, vicina phlegmona partes concoctionem aggrediuntur, atque ita in concoquendo natura laborat, ut assimilationem moliens putrefacienti causa resistat, impediatque ne amplius in putrefaciendo pergat. Quae in re superior ipsa coloris quidem assimilationem consecuta est, non autem substantiae omnem ex parte, ob incidentem causam putrefacientem, quae obstitit. Itaque purus non putredo simpliciter, sed concoctio dici potest, quae in unam speciem semper mutatur coloris & consistentiae, & odoris. Optimum enim purus esse censetur crassum, sibi simile, candidum, & minime foetidum. Illa vero putredo quae eueicta natura contingit, aut facultate ad ultimam debilitatem adducta, aut humore extremè pravo vincente, neque consistentiam habet, neque colorem unum, neque odorem, sed putrescens humor semper variatur, ac in peiorem continue alias aliam qualitatem mutatur. Puris autem generatio sic fit: sanguis in partes laborantes decumbens (ut provida natura solet affectae parti succurrere) ex vasis in tunicas earum desudat, ac unicuique particula adiacenti toris modo immiscetur. Talis igitur sanguis dispersus in locis inflammatione affectis, utpote extra conceptacula positus, cum non possit ad pristinam re-verti naturam, vel putrescit omnino, si calor na-

tius est imbecillus, vel permixta quadam alteratio fit, tum à causa naturali, tum ab ea quæ præter naturam est: naturalis enim causa concoquit, causa præter naturam putrefacit: quæ in conflictu, si natura superior evaserit (evidenti fluxione contraria) hæc quicquid humoris in partem procubuit, vel perspiratu digeret, quæ curatio magis optanda est, vel concoquet: concoctione verò pus generabitur, quo tandem extra pulso à facultate alienorum expultrice, partes affectæ ad statum naturalem redibunt: sed si fluxio vicerit, corruptio sequetur victarum partium. Ceterum ex iis causis tum conservantibus, tum putrefacientibus, utra præpolleat in inflammatione, si gnum hoc erit manifestum, vincentis quidem causa conservantis pus quale describit Hippocrates: putrefacientis autem, contrarium.

HIPPOCRATIS

PRÆNOTIONVM

LIBER SECVNDVS.

De aqua intercutem.

CAP. I.

Οἱ δὲ ὕδρωπες, οἱ ἐν τῷ ὀξέϊ νοσησάντων πύ-
 ρες κρηγί. ὅτε γὰρ πυρεθὲ ἀπαλλάσσεται

πῶδ' αὖ οἱ τε εἰσὶ κάρτα καὶ θανατώδεις. δ' ὄχοντα
 ἢ οἱ πλείστοι δ' ἀπὸ τῆς κενεάνων ἐκ τῆς ὀσφύος. οἱ δ'
 ἀπὸ τῆς ἥπατος.

Οἱσι μὲν οὖν ἀπὸ τῆς κενεάνων ἐκ τῆς ὀσφύος
 αἱ δ' ὄχοντα γίνονται, οἷτε πόδες οἰδέεσι, καὶ ἀγέρροισιν
 πολυχρόνιοι ἔχουσιν, ἕτε τῶν ὀδυάων λύσσει τῶν
 ἐκ τῆς κενεάνων καὶ τῆς ὀσφύος, ἕτε τῶν γαστέρος
 λαπαύσσουσιν. ὁπόσοις ἢ ἀπὸ τῆς ἥπατος ὑδρώπες
 γίνονται, βῆχες τε καὶ θυμὸς τ' ἐτοιμασιν ἐγίνεσθαι, καὶ
 ἐδὲν ἢ ἀπὸ πλῆθους ἀξίον λόγου, καὶ οἱ πόδες οἰ-
 δέεσι, καὶ ἡ γαστήρ ἐκ ἀσχωρέει, εἰ μὴ σκληρὸν τε καὶ
 πρὸς ἀνάγκην, καὶ πρὸς τῶν κηλίων γίνονται οἰ-
 δήματα, τὰ μὲν ἐπὶ δεξιᾷ, τὰ δ' ἐπ' αἰσθερᾷ, ἐστὶ
 ῥυμά τε καὶ καπαπανόμῃα.

Κεφαλὴ δὲ, καὶ χεῖρες, καὶ πόδες ψυχρὰ εἶναι
 κακόν. τῆς τε κηλίας, καὶ τῆς πλυσθῆς, θερμῶν
 εἶναι. ἄριστον ἢ ὅλον τὸ σῶμα, θερμὸν τε εἶναι, καὶ
 μαλ' ἄριστον.

Στεφάνος ἢ ῥῆσιδης ἐν ἀλγέοντι, καὶ ἐν
 τοῖσι μετεωρισμοῖσι ἐλαφρὸν εἶναι. εἰ δ' βαρὺς εἶναι
 φαίνεται, καὶ τὸ ἄλλο σῶμα καὶ τῶν χεῖρας ἐκ τῶν πό-
 δας, ἐπικινδυνότερον.

Εἰ δ' πρὸς τῷ βαρεῖ ἐοικέναι καὶ οἱ ὄνυχες καὶ οἱ δάκτυλοι
 πελιδνοὶ γίνονται, πρὸς δόκιμος ὁ θάνατος παρὰ
 μήκην. μνησινόμοι ἢ παντελῶς οἱ δάκτυλοι, καὶ οἱ
 πόδες, ἥσον ὁλέθριοι τῇ πελιδνᾷ εἶναι.

Ἄλλα καὶ πάλλα σημεῖα στέπτεας καὶ ἄλλα
 ὁπτιέως φέρων φαίνεσθαι τὸ κακόν, καὶ ἄλλοι

τῶν ἀεισηκόντων πρὸς ταῖς τοιαύταις σημεῖοις
 ὑποδεικνύει, ὅτι νόσος ἐς δυνάσιν τε ἀπὸ αἵματος
 πύσας τε ἐν μὲν αὐτῷ ἥρωτον ἀεισηκόντος, ἐν δὲ μέλανος
 γένεται ὁ σῶματος δυνάσις.

Οφθαλμοὶ δὲ καὶ αἰδοῖα αἰσθησώδη, πόνοις ἰσχυροῖς
 ἐνὸς σημεῖος, καὶ κίνδυνον θανάτου δείκνυσι.

Aquæ porro inter cutem, ex acutis morbis obortæ, omnes malæ sunt; neque enim a febre liberant, & valde dolorosæ sunt, ac letales. Incipiunt autem pleræque à laterum mollitie, & à lumbis: aliquæ verò etiam ab hepate.

Quibus igitur à laterum mollitudine & lumbis principia fiunt, his & pedes intumescunt, & alui profluvia diuturna ipsos tenent, quæ neque dolores ex laterum mollitudine ac lumbis solvunt, & ventrem molliunt, quibus verò ab hepate aquæ inter cutem oriuntur, his tussis tussendi quæ promptitudo accedit, & nihil memorabile expuunt, & pedes tument, & venter non egerit nisi dura, & coactus: & circa aluum fiunt tumores, aliqui in dextra, aliqui in sinistra parte, tum consistentes, tum confidentes.

Caput autem & manus, & pedes, si frigida sunt, malum est, ubi & venter, & latera calida sunt: optimum verò est & totum corpus calidum esse, ac molle.

Com

Conuerti autem facile conuenit ægrotum, & in attollendo se leuem esse. Si verò grauis esse appareat, & reliquo corpore, manibus, & pedibus, magis periculosum est.

Si verò supra grauitatem ungues & digiti liuidi fiant, mors euestigio expectanda est: at si digiti ac pedes penitus nigrescant, minus perniciosi sunt quàm liuidi.

Verùm & alia signa considerare oportet. Si enim facile ferre videatur malum, & aliquid quoddam ex salutaribus ad hæc signa subindicet, morbum ad abscellum verti spes est: ita vt æger quidem superstes mansurus sit, corporis verò partes nigræ factæ, casuræ.

Testes & pudenda reuulsa, dolores fortes significant, & periculum lethale.

Hydropis communis quadam causa est frusta sanguificatio, quæ fit iecore vel per se affecto, vel per consensum. Nam iecur per magnas venas & nervos ventriculo & intestinis, & lieni copulatur, quæ dum efficiuntur, ipsam quoque affici par est. Sed vt intumescere pedes omnis aquæ inter cutem commune est, quia calor naturalis cum sit in eis debilis, ob distantiam à corde, non potest digerere quod ad pedes est missum pro nutritione, unde inflatio: Et quia sunt in loco decliniori, humiditates aptæ sunt ad ipsos confluere: ita profluvium alui peculiare est ei Hydropi qui

fit intestinis, & mesenterio phlegmone laborantibus, irritatis scilicet ipsis ad excernendum, vel à bilis copia illuc demissa, vel quia non distribuitur alimentum, sed corrumpitur ob calorem partium qua inflammatione vexantur. In hydrope autem qui ab hepate est, cum neque intestina, neque mesaraica vena afflata sint, nec corruptum in ijs alimentum sit, non sunt diarrhoea, quinimo vix aliquid deijcitur, sed ipsius hepatis tumor incumbens diaphragmati, & faciens angustiam pulmonum, tussendi cupiditatem inducit, unde nihil effatu dignum expuitur. Porro si calentibus costis & ventre, externa partes frigent, id mali significant in morbis acutis, parum sanguinis in totum corpus permeare, plurimum verò eius in ea parte qua inflammatione vexatur, includi, ac ob eam rem caorem. Et inflammationem augeri, quae pessima est constitutio. Ex qua e contrario optimam eam esse cognosce, in qua corpus omne molle pariter & calidum aequè est. Summa verò totius praesagitionis est, morbi collatio cum agri viribus: enim morbus fortior est, ager omnino moritur: Si debiliior quam agri vires, haudquam morietur si modo nihil peccetur. Quemadmodum ferentes onera, aut grauati ab eis vix moriuntur, aut si leuius apparet onus, innocuè ferunt: ita sauias, si fortis quidem fuerit, facile corporis onus fert, ut haudquaquam ad mouendum

dum corpus offendatur: si imbecilla est, utpote
 grauata, vix corporis partes erigit. Grauitas enim
 partium precipuum est indicium debilitatis fa-
 cultatis: Cuius extincta signa etiam sunt ungues
 ac digituli liuidi, qui si nigrescunt, id fit, vel quia
 pars est mortificata, vel quia materia eò decum-
 bit in abscessum. Caterum vitalis facultas defi-
 ciens præ dolore, ad suam contrahitur originem:
 ita fit ut partes eam comitata conuellantur, con-
 uulsio autem hac extinctionem significat.

De somno.

CAP. IX.

Περὶ τῶν ὕπνων, ὡς ποῦ καὶ φύσιν σωήτες ἡμεῖν
 εἰ, πῶς μὲν ἡμέραν ἐξηγερέναι καὶ πῶς τὴν νύκτα,
 καὶ ὅθεν.

Ὡς εἴη τοῦτο μεταβεβλημένον, καί κινον. ἡκιστα
 ἂν λυπέσῃτο, εἰ καὶ μᾶλλον ὅπως εἰς τὸ τρίτον
 μέρος τῆς ἡμέρας.

Οἱ δὲ ἀπὸ τούτων τὸ χρόνον ὕπνοι, πονηρότερον
 εἶσι.

Κάκιστον δὲ μὴ καὶ μᾶλλον, μήτε τὴν νύκτος, μήτε τὴν
 ἡμέρας· ἢ γὰρ ὑπὸ ὁδυνῆς τε καὶ πόνων ἀγρυπνίη,
 ἢ ἀφ' ἀφροσύνης ἐστὶ ἀπὸ τούτων τὸ σημεῖον.

Quod ad somnos attinet, quemadmo-
 dum secundum naturam consuetum nobis
 est, interdiu vigilare oportet, noctu dormi-
 re: Si verò hoc fuerit transmutatum, peius
 est. Minimè verò lædi æger poterit, si dor-

miat mane ad tertiam partem diei: qui verò ab hoc tempore fiunt somni, deteriores sunt. Pessimum autem est non dormire, neque noctu, neque interdiu: aut enim præ dolore & afflictionibus, vigilia adfunt, aut delirium aderit ab hoc signo.

Somni quantitatem ac durationem metietur optimè natura, & bona consuetudo. Verum si diu noctuq; somnus interurbatur, ex insomnia magnum quoddam malum portendetur.

De deiectione.

CAP. III.

Διαχώρημα δὲ ἐστὶν ἄριστον, ὃ μὴ ἀπαρτίζον τε καὶ ξυμμετρικόν. καὶ τὸν ὥρην, ὡς πρὸς τὴν ὑγίαινον πτωχεύει· πλεόνους ὃ πρὸς λόγον τῶν εἰσιόντων· τριαύτης γὰρ ἔστι τῆς διεξόδου, ἢ καὶ τεταλμένη ὑγίαινοι αὐτοῦ.

Εἰ δὲ ἔῃ ὑπερὸν ὃ διαχώρημα, συμφέρει μήτε πείζειν, μήτε πυκνόν· ἢ ἐπὶ, καὶ κατ' ὀλίγον υποχωρεῖν· κατὰ γὰρ τὸ αὐτῶν πρὸς τῆς ξυμμετρίας ἐξαναστῆσι· καὶ ἀρρυθνείη αὐτοῦ.

Εἰ δὲ ὑπὸν ποικίλῃ διαχωρεῖ, κίνδυνος λεπτοθυμίας. ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ πλεόνους τῶν εἰσιόντων, ἢ δὲ, ἢ πρὸς τῆς ἡμέρας υποχωρεῖν, τῆς ὧνυκτός, ἅπασι· πλείονα δὲ ἐπὶ τὸ πρῶτον, ὡς πρὸς συνήθειας ἐστὶ τὰ αὐτῶν.

Παχυνεῖται δὲ καὶ τὸ διαχώρημα, ἔστι πρὸς κείσιν τῆς νύκτος· ὑπόπυρρον δὲ ἔστω, καὶ μὴ λίαν ὀνυώδες.

Επι-

Επιτήδον δὲ καὶ ἑλμύντας τροχύλας διεξιέναι
καὶ τὸ ἀλγυρῆματος, πρὸς κέρειν ἐξουσίας τῆς νέ-
σου.

Δεῖ δὲ ἐν παντὶ τὰ νοσήματα, λιπαρὴν τὴν καί-
αλον εἶναι, καὶ εὐοχρον.

Egestio alui optima est, mollis & cohæ-
rens, & secundum horam, in qua etiam a sa-
no egerebatur. Iuxta copiam verò, pro ra-
tione ciborum ingestorum. Tali enim con-
tingente exitu, venter infernus sanus fuerit.

Si verò liquida fuerit egestio, conducit
neque stridere, neque frequentem esse, &
paulatim succedere. Delassatur enim homo
ex frequenti desessu, & vigilias utrique con-
traherit.

Si verò sæpe aceruatim egerit, periculum
est ne in animi deliquium incidat. Quin &
iuxta copiam ingestorum egerere oportet,
bis aut ter in die, & noctu semel. Plura verò
mane, quemadmodum in consuetudine est
homini.

Inspissari autem oportet egestionem, mor-
bo ad iudicationem tendente: sit autem sub-
tilua, & non valde graueolens.

Commodum est & lumbricos rotundos
eum egestionem prodire, morbo ad iudica-
tionem tendente.

Oportet autem in omni morbo mollem

esse ventrem, & iusta mole præditum.

A consistentia, quantitate, & tempore quo deiectiones excernuntur, argumentum sumit optima deiectionis, qua si mollis coactaque est, & eo tempore secreta quo secunda valetudine assuevit, pro copia ingesti cibi, ac subrufa, nec admodum graueolens, indicat non solum inferiorem ventrem benè valere, sed nihil in eum aliunde, viruta à decore aut liene, defluere quod molestum sit.

Genera malarum egestionum.

C A P. IV.

Υδαρὲς ἢ κέρτα ἢ λουκρὸν, ἢ χλωρὸν, ἢ ἐρυθρὸν, ἢ χυρῶς, ἢ ἀφρώδες ἀφχωρεῖν· πονηρὰ τῶντα πάντα.

Ἐπὶ ἢ πονηρὸν, καὶ σμικρὸν τε εἶναι, & γλίχρην καὶ λουκρὸν, & ὑπόχλωρην, καὶ λεῖον.

Τετέων ἢ θανατωδέστερα αὐτῶν εἶναι τὰ μέγιστα, ἢ λιπώδη, ἢ πέλεια, ἢ ἰώδεα, ἢ κακὸν ὄμα.

Τὰ ἢ ποικίλα, χροινιώτερα μὲν τετέων, ὀλέθρια ἢ ἐδὲν ἥσων. ἔτι ἢ τὰ τοιαῦτα, ξυσματώδεα, καὶ χολώδεα, καὶ πραιοειδέα, & μέγιστα, ποτὲ μὲν ὀμρὸν διεξερχόμενα, ἀλλήλοισι, ποτὲ ἢ καὶ μέγιστα.

Φύσιν ἢ αἰσὺ ψόφου, καὶ πᾶσι δὲ διεξίεναι, αἰσιν κρείσσον ἢ, καὶ αἰσὺ ψόφου διελθεῖν, ἢ αὐτοῦ αἰσιν ἐλάττω. καὶ ἔτι διελθοῦσα, σημεῖον ἢ πονεῖν τὸν αἰσιν ἥρωπον, ἢ πᾶσι φρονεῖν, μὴ μὲν ἐκὼν ὁ αἰσιν ἥρωπος ἔτι τὴν αἰσιν πᾶσι φύσιν ποιήσει.

At κε

At verò aquosum valde, aut album, aut pallidum, aut viride, aut vehementer rufum, aut spumofum stercus egerere: hæc omnia mala sunt.

Malum insuper est & quod exiguum est, & viscosum ac album, aut subviride ac leue.

His verò magis lethalia fuerit stercora nigra, aut pinguis, aut liuida, aut ærugino-fa, & male olentia.

Quæ verò varia sunt, diuturniora quidem his sunt, nihilominus autem perniciofa. Sūt autem talia, ramentosa, & biliofa & cruenta, & prasina, & nigra, aliquando simul inter se exeuntia, aliquando particulatim.

Flatū porrò sine strepitu ac crepitu prodire optimum est. melius autem est & cum strepitu exire, quàm isthic reuolui. & qui sic progressus est flatus, aut dolere quid hominem significat, aut delirare: nisi sua sponte homo ira flatum emittat.

Aquosa deiectio cruditatem: candida, qualis ferè in ictero est, nullam, aut valde paucam bilem ad intestina defluere significat: nigra verò ab atra bile sic tingitur. Porro pinguis deiecitur, quoties pinguedo ab ignito calore consumitur: Graueolentia putredinis est indicium. Multiplicis coloris deiectio multas indicat esse affectiones, & ob eā rem tempore opus est ad cōcoctionem siquidem naturæ

tanquam cum multis hostibus conflictura, multum temporis insumat oportet.

Præcordiorum dolor.

CAP. V.

Τὰς δὲ ἐκ τῆς ὑποχονδρίας πόνας τε καὶ κυρτώματα, ἢ ἡ νεύρα, καὶ μὴ ξυνὸν φλεγμονῇ, λύει βορβορυγμὸς ἐν γαστρὶ καὶ ἐν τῇ ὑποχονδρίᾳ καὶ μάλιστα μὲν διὰ ξυῖαν ξυνὸν κέπρωτε, καὶ ἔρω, καὶ φύση· ἢ δὲ μὴ, καὶ αὐτὸς δὴ παλαιωθεὶς, ὠφελεῖ· ὠφελεῖ δὲ καὶ ὑποχονδρία βλάπτει τὸ κατὰ χολέρα.

Cæterum præcordiorum dolores ac tumores si fuerint recentes, & nō cum inflammatione, soluit murmur in præcordio obortum, & maximè quidem si pertransierit cum stercore ac vrina ac flatu: Sin minus etiam per seipsum transierit, iuuat, si ad inferas sedes deuoluatur.

Murmur non solum spiritus indicium est, sed spiritus humori permisti. Quoties igitur egreditur spiritus ille flatuosus, aut nequaquam egrediens descendit deorsum ad aliquam inferiorem sedem, hypochondria vindicantur utroque accidente, tum doloris cruciatus, tum etiam tumor, sed potissimum si cum vrina & stercore vacuetur. Talis enim vacuatio nullum prætererea relinquit in hypochondriis excrementum.

Vrina.

Vrina.

CAP. VI.

Τὸ δ' ἔργον ἄριστόν ἐστιν, ὅταν εἴη λευκή τε ἢ
ὑπόλευκός, καὶ λείη, καὶ ὁμαλὴ πᾶσι τὸν χρό-
νον, ἔστω δὲ καὶ κραιδίη ἢ νοδσος· σημαίνει γὰρ ἀσφα-
λειαν τε, καὶ νόσημα ὀλιγοχρόνιον ἔσσεσθαι.

Εἰ δ' αἴμα λείποι, καὶ ποτὲ μὲν κραιδεῖν ἔρῃσι, πο-
τὲ δ' ὑφίσταται τὸ λευκὸν ἐλαῖον, χρονωτέρῃ
γίνεσθαι ἢ νοδσος, καὶ ἥσων ἀσφαλῆς.

Εἰ δ' εἴη ὅτε ἔργον ὑπερυδρῶν, καὶ ἡ ὑπόλευκός
ἐντέκε ὁμοίη, καὶ λείη, πολυχρονωτέρῃ μὲν ὅτε
ἔστω γίνεσθαι, σωτήριον δ' ἡγάρτα.

Κοιμνώδεις δ' ἐν τοῖσιν ἔργουσιν αἱ ὑπολευκός,
πονηρά· τετέων δ' εἰσὶ κακίαι, αἱ πεταλώδεις· αἱ
λευκαὶ δ' καὶ λεπταὶ ἡγάρτα φλαῦραι· τετέων δ' ἐ-
πι κακίαι εἰσὶν αἱ πιτυρώδεις.

Νεφέλαι ἐμφερόμεναι τοῖσιν ἔργοις, λευκαὶ
μὲν ἀγαθαί, μέλαινα δ' φλαῦραι· ἔστω δὲ πυρρόν
τε εἴη τὸ ἔργον καὶ λεπτόν, σημαίνει τὸ νόσημα ἀπε-
πλον εἶναι. καὶ δ' καὶ πελυχρονωτὸν εἴη τοιοῦτον εἶναι,
κίνδυνον μὲν ἐδωκέναι τῷ ἀνθρώπῳ διαρκέ-
σαι, ἔστω δὲ καὶ πεπανδῆ τὸ ἔργον.

Θανατώδεις δ' αἱ τῶν ἔργων, ὅτε δυσώδεα, καὶ
υδατώδεα, καὶ μέλαινα, ἐπαχέα.

Επὶ δ' τοῖσι μὲν ἀνδράσι καὶ τῇσι γυναιξί, τοῖς
μέλαινα τῶν ἔργων κακίαι· τοῖσι δ' ποιοῖσιν, τοῖς υ-
δατώδεα.

Οκρόσαι δ' αὖ ἔργα λεπτά καὶ ὠμαῖ ἔρῃσι που-
λὸν χρόνον, καὶ πάντα ὡς περὶ σαρμῶσι σημαίνει.

ἢ, τετέοισιν δ' ὀψάσιν δ' εἰ παρσδέχεαζ ἐς τὴν κῆτω
τῆς φρενὸν χωρία.

Καὶ τὰς λιπαρὰς τῆς αὐτῆς οὐδ' αὖτε μὲν, ἀ-
ραχνοειδὲς μὲν φρεαζ· σιωτήξ· ὅ γ' σημεῖα.

Σηοπείν γ' κρη τῆς ἔρων ἐν οἷσι αἰνεφέλας, λῶ
τε αὐτῶν, λῶ τε κῆτω ἔωσι, καὶ τὰς χρώματα ὀκτῖα
ἴχασιν, καὶ τὰς αὐτῶν κῆτω φρενὸν μὲν αὖτε τοῖς χρώ-
μασιν, οἷσιν εἴρηται, ἀρα τὰς εἰς νομίζεσιν καὶ ἐπι-
νέειν. τὰς γ' αὐτῶν ἔωσι τοῖς χρώμασιν, οἷσιν εἴρηται,
καὶ τὰς εἰς, ὅ μὲν φρεαζ τὰς τοιαύτας.

Μὴ ἐξαπατάτω δέ σε, λῶ γ' ἡ κύστις ἀνόσημα ἔ-
χουσα, τῆς ἔρων τὸς τῶν αὐτῶν δ' ὀπιδιδῶ· ὅ γ' ὅλας
σώματος σημεῖον ἐστίν, ἀλλ' αὐτῆς καὶ ἑαυτῆς.

Optima verò est vrina, quum fuerit alba
subsidentia, & lævis, & æqualis per totum
tempus, donec iudicatus fuerit morbus: si-
gnificat enim & securitatem, & morbum fo-
re breuem.

Si intermiserit, & aliquando quidem pu-
ra meiatur, aliquando verò subsidet album
ac læue, diuturnior fit morbus, & minus se-
curus. Si verò fuerit & vrina subrubra, &
subsidentia ipsius similis, & lævis, diutur-
niorem quidem hæc morbum quàm prior
significat, sed valde salutarem.

At subsidentia in vrinis crassiores polen-
tæ partes referentes, prauæ sunt. Hæ autem
peiores sunt laminosæ. Albæ verò & tenues
valde

valde malæ sunt. Verùm his deteriores sunt furfuraceæ.

Nubeculæ quæ feruntur in vrinis, albæ quidem bonæ sunt, nigræ verò malæ.

Quandiu verò fulua fuerit vrina & tenuis, morbum inconcoctum esse significat. Si verò & diuturna fuerit talis existens, periculum est ne sufficere homo possit, donec vrina fuerit concocta.

Lethaliores autem sunt vrinæ, & foetidæ, & aquosæ, & nigræ, & crassæ.

At tum in viris, tum in mulieribus nigræ vrinæ pessimæ sunt, in pueris autem aquosæ.

Quicumque vrinas tenues & crudas metunt multo tempore, si alia veluti superstitibus futuris signa fuerint, iis abscessum expectare oportet ad locos infra septum transversum.

Sed & pinguedines supernè instantes, araneorum telis similes, damnare oportet: sunt enim colliquationis signa.

Considerare verò conuenit in vrinis in quibus nubeculæ sunt, an supernè aut infernè sint, & quales habeant colores. Et quæ quidem deorsum feruntur, cum coloribus relatis, eas bonas esse putare, ac laudare: quæ verò sursum feruntur, cum coloribus relatis, malas esse, & tales damnare.

Nec verò decipiat te, si vesica morbum aliquem habens, eiusmodi urinas reddiderit: non enim totius corporis signum est, sed ipsius per se vesicæ.

Ut facultatis naturalis, quæ in ventre est, indicia agnoscuntur ex ijs quæ quotidie deijciuntur, ita eius quæ in iecore ac venis est ex urina. In hac enim indicia clara sunt partim optima, partim imperfecta, partim in totum frustrata concoctionis, quemadmodum & in ijs quæ deijciuntur. Præterea ut in deiectionibus signa sunt aliorum affectuum, quàm ventris, ita urina alios affectus quàm venarum & hepatis, indicare potest. Urina ergo faciens sedimentum album, laue, & aquale securitatem significat, & morbum breui soluendum, cum signa habeat concoctionis: subrubra verò cum sedimento subrubro & laui, indicat exuperantiam sanguinis non exquisitè elaborati. Igitur quia optimi humoris exuperantia est, idcirco sine periculo est: sed quia humidior, eget concoctione. Porro sedimentum crassius, laminosum, & fursuraceum, exassato sanguine, contingit à febrili calore atque inæqualiter colliquis carnibus. Album verò & tenue à spiritu flatu, & fit, tenacius admixto humorum excremento semicocto.

Nubecula sublimamentum urinae est: quod si nigrum est, id ob vehementem accidit frigiditatem.

tem, quæ ratione sanguis concretus nigrescit: aut
 propter exuperantem sit calorem: etenim sanguis
 nigrescit si adurit. Et qui diutius in sole versan-
 tur aestivo, nigri redaduntur. Ergo iure nigrum sub-
 limamentum damnatur probaturq; album. Sed
 in urinis contenta quando magis deorsum ferun-
 tur ad fundum vasis, tanto meliora sunt, leuantur
 enim sursum à vaporoso spiritu. Optima est urina
 subaurea vel subcrocea calore, substantia medio-
 cri, proportionem respondens potui facto, hypostasi
 alba, leui, equabili, in qua nulla innateat bulla,
 neq; tuberculum aliquod subsideat, non inhereat
 macula, neque quicquam complicitur ex eis quæ
 solent inferri similia capillis & ramentis, & alijs
 eius generis. Quatum unaquaq; urina ab hac de-
 clinauerit, tantum ab optima sanitate recessit. Te-
 nuis enim aquosa morbum crudum significat, &
 naturalis facultatis debilitatē. Crassa frigidorum
 & crudorum multitudinem: nigra obstructionem, &
 humorum assationem: foetida eorundem putrefa-
 ctionem, sicut desuper pinguis consumptionē indi-
 cat. Verum urina prava, ut interdum humorum in
 toto corpore existentium vitia, & facultatis conco-
 cticis ostendunt, ita renum & vesicæ tantum non-
 nunquam affectum declarant, non humorum aut facul-
 tatis. Quinimo fieri potest ut totum animal per vesti-
 cam & renes expurgetur, & abscessus etiam cum
 urina externatur, eo videlicet materia derivata.

Vomitus.

CAP. VII.

Εμετος ὃ ἀφελιμώτατος, ὁ φλέγματος καὶ χολῆς
 ξυμμεμιγμένον, καὶ μὴ παχὺς καίρεται, μηδὲ
 πολὺς ὡς μέγιστα. οἱ γὰρ ἀκρητέστεροι κακίους εἰσὶν.

Εἰ δὲ εἴη τὸ ἐμύδιον πρᾶσσειδες, ἢ πέλιον, ἢ
 μέλαν, ὅ, τι αὐτῇ τέτειν τῶν χρωμάτων, νομίζειν
 καὶ πονηρὸν εἶναι.

Εἰ δὲ καὶ πάντα τὰ χρώματα ὁ αὐτὸς ἀνθρώπος
 ἐμέει, καίρεται ὁλόθριον τοῦτο γίνεται. τάχιστα γὰρ
 θάνατον σημαίνει τὸ πέλιον τῶν ἐμεσμάτων, εἰ ὅζου
 δυσώδεις.

Πᾶσαι δὲ αἱ ὑπόσαπτοι καὶ δυσώδεις ὁσμή, κα-
 καὶ ἐπὶ πᾶσι τοῖσιν ἐμεομένοις.

Vomitus commodissimus est, ex pituita
 ac bile quàm maximè permixtus, & non
 crassus valde neque multus: nam meracio-
 res, deteriores sunt.

Si verò id quod vomitu reiectum est, pra-
 fini fuerit coloris, aut liuidum, aut nigrum:
 quicumque horum fuerit colorum, malum
 esse putandum est.

Si verò omnes colores idem homo vo-
 mit, valde perniciosum hoc est. Celerrimam
 enim mortem significat liuidus vomitus si
 graueolens fuerit.

Omnes verò subputridi ac foetidi odo-
 res, in omnibus vomitibus mali sunt.

Syncerus in vomitu humor apparens, peior est:
nam

nam ut biliosus caloris copiam immodicam, sic
pituitosus indicat frigus. Quinetiam syncerus hu-
mor crassior redditur mixto, pituitosus quidem
propter frigiditatem quae concretus, biliosus vero
propter abundantem calorem exuētus & frixus:
Calidum enim exugit, frigidum astringit: Petra-
ceus autem vomitus quorundam esculentorum
in veniculo cruditatem, aut calorem praeter na-
turam ratione agrotationis indicat. Et quando
plures praeter naturam colores, seu nigri seu iuui
apparent, tanto id deterius est, praesertim si cum
a. iqua alia maiore qualitate terti odoris apparent.

Sputum.

CAP. VIII.

Πύελον γὰρ ἐπὶ πάντι τοῖσιν ἀλγύμασι, τοῖσι
ὡς ἐν τῷ πλύμονα καὶ τοῖς πύελαις, καὶ τῷ τε ἀνα-
πύελαι, καὶ οὐπέτωσιν συμμιγνύμενον τε φαίνεται
τὸ ξανθόν, ἰσχυρῶς τὸ πύελαι· εἰ γὰρ πολλὰ ὕστερον
μὲν πύελαι ἀρχὴν τῆς οὐδίας, ἀναπύελαιτο ξανθὸν
εἶον, ἢ πυρρὸν, ἢ πολλὰ βήχας παρῶν, καὶ μὴ ἰσχυ-
ρῶς συμμιγνύμενον, καὶ κίον γίνεσθαι· τὸ γὰρ ξαν-
θὸν ἀκρετὸν εἶον, κινδυνώδες· τὸ δὲ λευκὸν καὶ γλί-
χρον καὶ σπορῶδες, ἀλυσιτελές. κακὸν δὲ καὶ τὸ
χλωρὸν εἶον καὶ τὰ ἀφρώδες. Εἰ δὲ εἴη ὅπως
ἀκρετὸν, ὥστε καὶ μέλαν φαίνεται, δυνάστερ ἐστὶ
τοῦτο κείνων. Κακὸν δὲ καὶ μὴ μὲν ἀνακαταίρη-
ται, μὴ δὲ περὶ τὸ πλύμονα, ἀλλὰ πλήρης εἶον ζεῖν
ἐν τῷ φάργκι.

C.

Sputum in omnibus doloribus qui sunt circa pulmonem & costas, citò & facile expui conuenit, & flauum sputo valde permixtum apparere. Si enim longè post principium doloris, expuerit quod flauum est, aut rufum, aut quod multam tussim inducit, & non valde permixtum est, deterius est. Nam & flauum merum periculosum est: & album, & viscosum, & rotundum, inutile est. Malum est & quod viride est valde, itemq; pallidum & spumofum. Si verò ita fuerit meracum, vt etiam nigrum appareat, hoc ipsum deterius est quàm illa: malum etiam est si nihil repurgetur, neque pulmo aliquid eiiciat, sed plenius in gutture ferueat.

Facilis & prompta scretio demonstrat quòd non vehemens sit in thorace dolor, quòd sputum non sit glutinosum, membris tenacius inhaerens, nec admodum crassum, & praeterea quòd non sit aquosum nimis: Nam materia tenuis vix scretur, vt quae in pulmonibus circumfluitet. Materias autem quae expuntur permisceri inter se salubrius est, nec quicquàm externi syncerum: flauum enim sputum redditur propter flaua bilis abundantiam: candidum verò, glutinosum ac rotundum, propter assitam puitam Quo fit vt syncerum quod egeritur, malum semper affectum inducet. Nam ubi sero, us huiusmodi assatur, fit flaua bilis,

bilis, quæ pallida apparebat mixta eidem humori seroso. Aeruginosa verò fit ubi is multum assatur, & ubi supra modum nigra, quæ est deterrima & quàm maximè erodens atrabilis, aut ubi crassus sanguis similiter exsiccatur: aut id fit ratione mortificationis & refrigerationis. Spumans autem sputum fit à spiritu flatuoso cum humore mixto, qui dum frangitur, pituitam quoque in multas & exiguas partes frangit.

Grauedo & Sternutatio.

CAP. IX.

Κορύζας ἢ καὶ πτερύγας ἐπὶ πᾶσι τοῖσι πρὸς τὸν πνεύμονα νοσήμασι, πρὸς γενέσθαι ἢ ἐπιρροέσθαι, καὶ ἄλλοι ἐν τοῖσιν ἄλλοι νοσήμασι τοῖς θανατωδεστέροις οἱ πτερύγαι λυσιτελεῖσιν.

Αἵματι ἢ συμμεμιγμένον μὴ πολλὰ πτύελα ξανθὸν ἐν τοῖσι πρὸς πνεύμονι καὶ ἄλλοις, ἐν δὲ ἄλλοις μὴ πτύελα πτύελα πρὸς πνεύμονι καὶ ἄλλοις ὡφελές. Ἐδοματὶ ἢ ἐν πτύελοις καὶ πάλαιότερον, ἥσπον ἀσφαλές.

Παύται ἢ πτύελα πονηρὰ εἰσιν, ὅσπερ αὐτὰ πτύελα μὴ παύται καὶ ἄλλοις ἢ τὰ μέλαινα, ὡς δὲ γέγραπται. ἢ παύται ὁδὸν πτύελα, πάντων αἰμάτων ἀναπνέοντα.

Grauedines & sternutationes in omnibus circa pulmonem morbis & antecedere & succedere, malum. At in aliis morbis lethalius sternutationes profunt. Sputum autem flavum sanguine permixtū non multo,

si in pulmonis inflammatione in principio morbi reſiciatur, ſalutare eſt & valde prodeſt. Si verò ſeptimo die, aut poſterius, minus ſecurum eſt. Omnia ſputa mala ſunt quæ dolorem non ſedant. Peſſima verò ſunt nigra, ſicut ſcriptum eſt. Quæ dolorem ſedant omnium optima exiſtunt.

Grauedines ac defluſiones in morbis qui affligunt in pulmone, non eſſe bona indicia ſemper exiſtimare oportet. Nam antecedentes, pulmonem malis humoribus implent, procedente verò morbo apparentes grauem affectum pulmonis indicant, & caput ab eo laſum ſignificant. Porro ſternutationes ut plurimum grauedinibus comites ſunt, & vehementer utique totum thoracem commouentes, pulmonem aliquo modo ledunt. At verò in aliis morbis ſi poſterius appareant, oſtendunt ſalutem, licet lethalis morbus quantum ad alia ſigna attinet, habeatur: indicant enim concoctionem ac robur excretoria in cerebro facultatis, à qua in nares flatuoſo ſpiritu excreto pariter cum alio humore ſternutatio fit. Sputum in pulmonum morbo ſi commixtis humoribus coctionis ſigna quedam habeat, ſalubre eſt: ſed ſi id non accidat, periculum exolutionis virium imminet, antequam concoquatur, & ob eam rem minus ſecurum pluribus diebus permanere ſputa & ſyncera & ſemicotta. Quæ verò ſedant dolorem, ea ſputa maximè

*maximè laudabilia sunt, quous excreta tempo-
re: nam quæ è corpore excernuntur, ea potissimùm
facilitate tolerantia commendantur.*

Suppuratio.

CAP. X.

Οχόσαι ἢ τῆς ἀλγυμῆς ἐκ τεσσάρων τῆς χειρῶν
μὴ πῶνται, μήτε πρὸς τὰς τῆς πύελων κατάρ-
σιος, μήτε πρὸς τὴν τῆς κοιλίης ἐκκυστῶσιν,
μήτε πρὸς τὰς φλεβοτομίας τε καὶ φαρμακείας, καὶ
διαίτας, εἰδέναι δὲ ἐκπυήσονται.

Τῶν ἢ ἐκπυμῆς οχόσαι μὲν ἐπεχρώδεσθαι ἔον-
τος ἢ πύελος, ἐκπύσσεται, ὁ λέγειται κάρται, ὡς
τε ἐν μέρει τὸ χρώδες τῶ πύω ἀναπτύσσεται, ὡς τε
ὁμοῦ. μάλιστα ἢ ὡς ὁρίζεται χωρεῖν ἢ ἐμπύημα,
ἀπὸ τεσσάρων ἢ πύελος, ἐκδομῆς ἔοντος ἢ νοσήμα-
τος. ἐλπίς ἢ τὸν θιγαῖται πύονται, ἀπὸ θανείας τεσ-
σαρεσκαυδενκατῶν, ὡς μήτε αὐτῶ ἐπιγίνεται αἰ-
ματόν.

Εἰ δὲ, τὰ μὲν ἀγαθὰ τὰδε· ὁ πετέως φέρειν ἢ
νόσημα, ὁ πύου ἐῖς, τὸ ὁδυνῆς ἀπηλλάχθαι, τὸ τε
πύελον ῥηϊδίως ἀναθήσκειν, τὸ τε σῶμα ὁμαλῶς
φαίνεσθαι, θερμὸν τε εἶς καὶ μαλθακόν, ἢ δὲ ψυχρὸν μὴ
ἔχον, ἔρῳ τε καὶ ἀσχωρήματα, ἢ ὕπνος, καὶ ἰσχυρῶς
ὡς ἀσχετῶς, ἔκστα εἰδέναι ἀγαθὰ ἔοντα
ἐπιγίνεσθαι· ἔτι μὲν γὰρ αἰπάντων τεσσάρων ἐπιγίνο-
μένων, ὅτε αὐτὸ θάνοι ὁ ἄνθρωπος.

Ἦν δὲ τὰ μὲν τοι αὐτῶν ἐπιγίνοιντο, τὰ δὲ μὴ, ἢ

παλείονα χρόνον ζήσας ἢ πεσαρσεαίδεκα ἡμέ-
ρας, δ' ὅλοιτ' αὖ ὁ αὐτῶν πρως.

Κατὰ δὲ τὰ ἐναντία τετέων· δυσπετέως φέρειν
πλὴν ἔσπον, πυρρὰ μέλας ἐ πυκνὸν ἔϊ), πλὴν ὁδὸν ἰω
μὴ παύεσθαι, ἐ πλὴν ἐλὸν μέλεις ἀναθήσειν, διψῶ
κέρτα, ἐ, τε σῶμα ὑπὲ πυρρὸς ἀνωμαλῶς ἔχει, ἐ
πλὴν μὲν κριλίω καὶ ἐπὶ πλὴν ὁδὸς, θερμὸς ἔϊ) ἰαχυ-
ρῶς. ἐ δὲ μέτωπον καὶ ἐπὶ χεῖρας ἐ τὰς πόδας ψυ-
χευῖς· ἔρα δὲ καὶ ἀφαιρέματα, καὶ ὑπὸς, ἐ ἰδρῶ-
ται, ὡς ἀφαιρέματα, ἐκαστα εἰδέναι καὶ ἐόντα
ἔτως γὰρ εἰ ἐπιγλῶσσι τὴ πλὴν ἐλὸς τετέων, ἀπὸ λ-
λοιτοῦ αὐτὸ αὐτῶν, πρὶν ἢ ἐς ἐπὶ πρὸς αἰσθησιν αἰδῶ
καὶ ἡμέρας ἀφαιρέσθαι, ἢ ἐννατῶ, ἢ ἐνδέκατῶ.
ἔτως οὐκ ἐμὲ ἀλλὰ καὶ γρη, ὡς ἐ πλὴν ἐλὸς τετέων
θανατῶδε ἐόντος μέλας, καὶ ἐ πρὸς αἰσθησιν αἰδῶ
ἐπὶ πρὸς αἰσθησιν αἰδῶ ἡμέρας.

Τὰ δ' ἐπιθυμῶντά τε καὶ ἐν ἀρχῇ ξυλλογι-
ζῶντων ἐν τέτειν χρόναις περιρρήσιαι περιλέγειν
ἔγω γὰρ αὐτὸς ἀληθεύοι μάλικα. Αἱ δὲ ἄλλαι
ἐκπυήσιαι ρήγνυνται, αἱ πλεῖσαι, αἱ μὲν εἰρησάται,
αἱ δ' ἐπελησάται, αἱ δ' πεσαρακνησθήμεναι, αἱ δ'
πρὸς τοὺς ἐξήκοντα ἡμέρας ἀφικνέονται).

Επισκέπτεσθαι ἡμετέραν ἐκκλησίαν ἡμεῖς ἐμψυχήμε-
τος ἔσμεν λογισόμενοι, ἀπὸ τῆς ἡμέρης ἣ τὸ παρῶ-
ν ὁ αὐτῶν πύρεξεν· ἡ εἴποτε αὐτὸν παρῶν
ῥήγας ἔλαβε· καὶ εἰ φαίη αὐτὴ τῆς οὐκ ὀνείδος αὐτῶν
βάρος γεννηθεῖσιν ἐν τῷ τόπῳ ἐν ᾧ ἡλγει. Ἰωτα γὰρ
ἐν ἐκκλησίᾳ γίνεται τῇ ἐμψυχή.

Εξ ουὶν τουτέων τῶν χρόνων πῶς ῥῆξιν χρὴ ποιεῖν
δέχεσθαι τῶν ἐμπυημάτων ἑστέον εἰς τὰς χρόνους τὰς
ποσειδημόνους.

Εἰ δ' εἴη τὸ ἐμπύημα ἐπὶ θάτερον μενόνον, σπέν-
φειν τε καὶ καθαίρειν χρὴ ἐπὶ τατέροισι, μή τι
ἕκην ἀλγυμὸν ἐν τῷ ἑτέρῳ πλούρῳ, καὶ ἢ θερμώ-
τερον ἢ τὸ ἑτερον ἢ ἑτέρου, καὶ κλινόμενος ἐπὶ τῷ
ὕψιστον πλούρῳ, ἐρωτᾷν εἴ τι αὐτῷ δοκέει βα-
ρύνειν ἐκ τῶν χρόνων εἰ δ' εἴη τὸ ἑτερον, ἐπὶ
θάτερον εἴ τι ἐμπύημα, ἐπὶ ὀρθίον αὖ πλούρῳ
τὸ βάρος γίνηται.

Quicunque dolores ex his locis non se-
dantur, neque ad sputorum purgationes,
neque ad stercoreum alui subductionem, ne-
que ad venæ sectiones, & victus rationem,
& medicamenta, eos ad suppurationem ver-
i sciendum est. Ex suppurationibus quæ-
cunque dum sputum adhuc biliosum est,
suppurantur, perniciosæ valde sunt, siue bi-
liosum illud in parte, siue simul cum pure
expuatur: & hoc potissimum si morbo ad
septimam diem progressio, suppuratio ad
hoc sputo procedere incipiat. Timor au-
tem est cum qui talia expuit, moriturum
esse decimaquarta die, si non aliquod bo-
num signum ipsi acciderit: sunt autem bo-
na hæc, facile ferre morbum, bene spirare,
dolore liberatum esse, sputum tussiendo

facile recidere, corpus æqualiter calidum ac molle apparere, sitim non habere, urinas, & alui egestionem, & somnos, & sudores, velut descriptum est, hæc singula nosse convenit accidere: Nam omnibus his ita contingentibus homo non morietur. Si verò aliqua ex his accesserint, aliqua non, non ampliore tempore vitæ producta, decima quarta die homo peribit. Porro mala signa his contraria sunt, ægrè ferre morbum, spiritum magnum & densum esse, dolorem non sedari, sputum vix tussiendo reici, siti infestari, corpus inæqualiter à febre teneri, ventrem quidem ac costas fortiter cal fieri, frontem verò & manus & pedes frige fieri. Urinas autem & alui excrementa & somnos & sudores, velut descriptum est. Hæc singula nosse oportet mala esse. Quicquid enim horum iam dicto sputo supervenerit, hominem moriturum significat, priusquam ad decimum quartum diem pervenerit, aut nono die, aut undecimo. Sic igitur coniecturam facere oportet, quòd hoc sputum lethale sit valde, & non perducatur ad decimū quartum diem. Proinde & bona & mala signa expendentem ex his prædictiones facere oportet: ita enim potissimum veritatem cōsequi quis poterit. At verò aliæ suppurationes rūpūntur;

tur, plurimæ quidem vicesimo die, aliæ trigesimo, aliæ quadragesimo, aliqua verò ad sexaginta dies perueniunt. Considerare oportet suppurationis futuræ principium, suppuratione facta ab ea die qua primum homo febricitauit, aut si fortè ipsum primum rigor apprehendit, et si pro dolore grauitatem sibi factam esse dixerit, in eo loco in quo dolebat: hæc enim in principijs suppurationum fiunt. Ex his igitur temporibus eruptionem suppurationum fore ad prædicta tempora expectandum est. Si verò suppuratio fuerit in altero latere solum, vertere & considerare oportet in his num aliquem habeat dolorem in altero latere, & an alterum altero sit calidius, & reclinato ægro in latus sanum, interrogare ipsum an videatur ipsi graue quid ex superno latere incumbere: Si enim hoc fuerit, in altero est suppuratio, in quo grauitas affuerit.

Affectus qui in thorace ac pulmone non desinunt, adhibitis omnibus remedijs, eos suppurationes expectabis (Suppurationem autem intellige puris inter thoracem & pulmonem effusionem.) Porro qui purulenta septima die expuerit, non tamen sola, neque toto die, sed, aut cum ex biliosum aliquid, aut sine materia purulenta biliosum solum expuerit, hic ne decimo quarto die intereat

periculum est: Quod si bona signa accedant, præscriptus mortis terminus in maius temporis spatium proferetur: Si verò mala, ante decimum-quartum diem morietur. Caterùm bona malâve signa, persequitur ipse postea. Si cui enim conualescendum est, omnia bona indicia adsint necesse est: Si moriendum, vel unum adesse malum sufficiet. Aliæ suppurationes sunt, quæ nec in thorace sunt, nec bilem immixtam habent, nec septimorumpuntur, sed diutius immorantur. Quarum differentia sumuntur à loco patiente, & ab humore morbum committente: Caliditas enim & loci & humoris celeritatem motus, frigiditas tarditatem operatur. Sumuntur etiam indicationes ab ætate, natura, tempore, regione, constitutione & viribus agri. In omnibus his calidus humor citius, frigidus tardius suppuratur.

Quibus signis cognoscuntur purulenti.

CAP. XI.

Τὸς δὲ ἑξ ὅλων τῶν ἐμπύων γινώσκειν χρὴ τοῖσι δὴ τοῖσι σημείοισι. πρῶτον μὲν, εἰ ὁ πυρετός ἐστιν ἀφίησιν, ἀλλὰ τὴν μὲν ἡμέραν λεπτός ἐστιν, τὴν δὲ νύκτα πλείων.

Καὶ ἰδρώτες πολλοὶ ἐπιγίνονται, βῆχες τε καὶ θυμὸς ἐγγίνεται αὐτέοις, καὶ δόκω πύον ἐξ ἑνός ἀξίου λόγου.

Καὶ οἱ μὲν ὀφθαλμοὶ, ἐγκυκλοὶ γίνονται αἱ δὲ γνάθαι,

γνάθοι, ἐρυθήματα ἴχθυσιν.

Καὶ αἱ μὲν ὄνυχες τῶν χερῶν ζευποῦνται· οἱ δὲ δάκτυλοι θερμαίνονται, καὶ μέγιστα ἄκροι. καὶ ἐν τοῖσι ποσὶν οἰδήματα γίνονται.

Καὶ σιτίων ὅσα ἐπιθυμῶσι, καὶ φλύκταινάς γίνονται αὐτὰ τὸ σῶμα. Οὐδὲν μὲν οὐκ ἐλκερνίζει τῶν ἐμπυημάτων, ἔχον τὰ σημεῖα. Ἰαῦται, καὶ πιδύειν αὐτοῖσι χρὴ κάρπαι.

Οὐδὲν δὲ ὀλιγοχρόνιά ἐστι, σημερινῶς τετέων, ὡς ἐπιφαίνῃ, οἷα καὶ τοῖσιν ἐν δόχῃσι γινόμενοισιν. ἅμα δὲ ἐὼς πιδυανέστερος ἢ ὁ αὐθροπος.

Τὰ δὲ παχύτερον αὐτέων καὶ βραδύτερον ῥηγνύμενα, τοῖς δὲ γινώσκουσιν χρὴ. ὡς μὲν ὁ πόντος ἐν δόχῃσι γίνηται, καὶ ἡ δύσπνοια, καὶ ἡ βήξις, ἐὼς πιδυανέστερος ἀφαιρῇ, ἐς τοὺς εἰκοσιν ἡμέρας ἔχων, πρὸς δὲ χεῖρας τὴν ῥῆξιν, ἢ καὶ ἐπὶ πρὸς αὐτὴν. ὡς δὲ ἡ συχαιότερος ὁ πόντος ἢ, καὶ τὰλλα πάντα, τῶν τοῖσι καὶ λόγον τετέων πρὸς δὲ χεῖρας τὴν ῥῆξιν ἐς ὕστερον.

Γίνεσθαι δὲ αὐθροπία καὶ πόνον, καὶ δύσπνοια, καὶ πιδυανέστερον πρὸς τῆς ἐπὶ πύξιν.

Περὶ γίνονται δὲ τετέων μέγιστα μὲν ἐς αὐτὴν ἀφῇ ὁ πυρετός αὐθροπία μὲν τὴν ῥῆξιν, καὶ σιτίων ἰαχέως ἐπιθυμῶσι, καὶ διψῆς ἀπηλαγμένοι ἔωσι, καὶ ἡ γαστήρ σμικρὰτε καὶ ξυνοσηκῶτα ὑποχωρεῖ, καὶ τὸ πῦον λαβὼν τε καὶ λεῖον ἐὼς ὁμέχρον ἢ, καὶ φλέγματος ἀπηλαγμένον, καὶ ἄτερ πόνου τε ἐβηχὸς ἰσχυρῆς αὐθροπία γίνηται.

Αεὶσα μὲν ἔτι καὶ τοῖς τε ἀπακμάσσουσιν· ὡς
 ὅ μὴ οἷσιν αὖ ἐξυπαίτω τῶν γένηται.

Απόλλυται ὅ ἐς αὖ ὅ, τε πυρετὸς μετὰ ἀφείη, ἢ
 δεκέων αὐτέες ἀφείηται, αὐτὸς φαίνεται αὐτὰ θερ-
 μανόμην· καὶ διψᾷ αὐτὸς ἐχέει, σιπῶν ὅ μὴ ἐπι-
 θυμείωσι· καὶ ἡ καρδίη ὑγρὴ ἢ, καὶ τὸ πύον χλωρὸν
 καὶ πέλιον πύον, ἢ φλεγμῶδες καὶ ἀφράδες. ὡς
 ταῦτα πάντα γίνονται, ἀπόλλυται.

Οκρότοισι δὲ αὖ τῶν, ὡς μὲν ἐπιγίνονται, τὰ ὅ
 μὴ οἷ μὲν αὐτέων ἀπόλλυται, οἱ ὅ ἐν ποικίλῃ χρο-
 ῖ καὶ αἰσθάνονται. ἀλλ' ἐκ πάντων τῶν τεκμηρίων
 τῶν ἐόντων ἐν τῶν, σημαίνει καὶ τοῖσιν ἄλ-
 λουσι πᾶσιν.

Οκρότοισι ὅ ἀποστάσεις γίνονται ἐκ τῶν αἰ-
 σθητικῶν νοσητέων, ὡς πύον, καὶ ἐμπύ-
 σιν ἐς τὰ κατὰ χεῖρα, καὶ συριγμῶτα, ὅτοι ὅ
 αἰσθάνονται.

Επισκέπτειται ὅ καὶ τὰ τοιαῦτα, ὡς· ὡς ὅ, τε
 πυρετὸς ἐχέει, καὶ ἡ ὁδὸς μετὰ πύον, ἐν τῷ πύον
 λον ἐκχωρήει καὶ λόγον, μετὰ χολώδες αἱ τῆς καρ-
 δίας ἀφωρήσεις, μετὰ δὲ λυτοί τε καὶ ἀκρητοί
 γίνονται, καὶ μετὰ τὸ ἔργον πάλυ τε καὶ ἄρτα ἐ πολ-
 λὰ ὑπόστασιν ἔχον· ὑπερτίεται ὅ αἰσθάνεται
 ὑπὸ τῶν λοιπῶν πάντων τῶν αἰσθητικῶν σημείων,
 τῶν οἷ καὶ τῶν τοιαύτων ὑποστάσεως ἐλπίζειν ἐ-
 σεοῖ. γίνονται ὅ αἱ μὲν ἐς τὰ κατὰ χεῖρα, οἷσιν αὖ
 αἰσθάνεται τὰ ὑποχόνδρια ὅ φλέγματός τε ἐγίνονται
 αἱ ὅ αὖ, οἷσιν ὅ ὑποχόνδριον λαμπρόν τε καὶ αὐ-
 δυνόει

διανοι ἀγατελήν· δύσπνευσ δὲ ἵνα χρόνον ῥυό-
μασθαι, παύσεται ἄτερ φανερῆς περὶ φάσι· ὁ ἄλ-
λης.

Cæterum omnes suppuratos ex his signis cognoscere oportet: Primum quidem si febris non dimittit, sed per diem quidem tenuis est, noctu verò vehemētior, & sudores multi oboriuntur, tussisque ac tussiendi promptitudo ipsis adest, & nihil memorabile expuunt, & oculi cavi fiunt, & maxillæ ruborem contrahunt, & ungues quidem manuum curvantur, digiti verò calescunt, & potissimum summi, & in pedibus tumores fiunt, & cibos non appetunt, & pustulæ per corpus enascuntur. Quæcunque igitur suppuraciones diuturnæ sunt, hæc signa habent, & fidem ipsis valde habere oportet: Quæ verò breues sunt, ex his signis cognoscere oportet, si quid apparuerit ex iis qualia in principiis fiunt: Simul autem & si aliquanto difficilior spirauerit homo. At verò quæ ex ipsis citius & tardius rumpuntur, his signis cognoscere oportet: Siquidem enim dolor in principiis fiat, & spirandi difficultas, & tussis, & sputio perseverans ad vigesimum diem pertingat, eruptionem tunc expectare oportet, aut etiam prius. Si verò quietior fuerit dolor, & alia omnia pro huius ratione,

eruptio posterius expectanda est. Necessè
verò est accedere & dolorem, & spirandi
difficultatem, & spuitionem ante puris eru-
ptionem. Ex his autem maximè superstites
manent hi, quos febris eodem post eruptio-
nem die dimiserit, & qui cibos statim appe-
tiuerint, & à siti liberati fuerint, & si venter
parua & compacta egerit, & pus album,
& læue, & eiusdem coloris fuerit, & à pitui-
ta liberum, & citra dolorem ac tussim for-
tem, repurgetur. Ac optimè quidem sic ac
ac celerrimè liberantur: Sin minus, hi qui-
bus proxima his contigerint. At verò inter-
eunt ij quos febris non dimiserit, aut vbi
ipso dimisisse putata fuit, rursus recalescens
apparuerit, & qui sitim quidem habuerint,
cibos autem non appetiuerint, & si venter
liquidus fuerit, & pus pallidum siue viride
& liuidum expuerint, aut pituitosum & spu-
mosum: Si hæc omnia contigerint, inter-
eunt. Quibus verò ex his quædam accesser-
int, quædam non, horum aliqui intereunt,
aliqui in multo tempore superstites eua-
dunt. Verum ex omnibus signis quæ ad-
sunt, tum in his tum in aliis omnibus, con-
iecturam facere oportet. Quibuscunque
ex inflammati pulmonis morbis abscessus
sunt circa aures, & suppurantur, aut ad in-
feras

feras sedes ac fistulas contrahunt, hi superstitites euadunt. Verum id ita considerare oportet, si & febris detinuerit, & dolor non sedatus fuerit, & sputum pro ratione non prodierit, neque biliosæ, neque solutu faciles & meracæ alui egestiones fuerint, neque vrina valdè multa, multam subsidentiam habens. Iudicatur autem superstes futurus ab omnibus reliquis salutaribus signis: tunc abscessus huiusmodi fore sperandum est. Fiunt autem partim ad infernas partes, quibus videlicet inflammatio aliqua circa præcordia affuerit, partim insupernis, quibus præcordium molle & doloris exors permanserit, & ubi spirandi difficultas, quæ per tempus aliquod affuit, deserit citra aliam manifestam causam.

Suppurati ex eo potissimum cognoscuntur, quod cum pus, quod inter thoracem pulmonemque coaceruatum habent, citò non expuant, antequam pulmonis substantia exulceretur, tabidi fiunt, leniter quidem diu febricitantes, sed calore noctu crescente, quod accidit omnibus febricitantibus hectica febre: Item cognoscuntur ex sudoribus, tussi, macie, & cavitare oculorum, & aliis qua longioris suppurationis indicia sunt manifesta. Breuiorem autem suppurationem docet cognoscendam esse ex indiciis antea dictis: ea verò

sunt, rigor febris, g. auitas, & si ager difficiliter
quàm antè spiret. Id verò accidat necesse est pro-
pter angustiam pulmonis, quoties pus inanes tho-
racis sedes comprehenderit. Si igitur continenter
& vehementer infestent, dolor, difficultas spiran-
di, tussis, & screatio, celerem fore significant ru-
ptionem: Si verò non continenter affligant, non
vehementer, diuturniorem. Porro morbus qui per
abscessum soluendus est medius est inter mites &
exitiosos: Nam mitis per excretionem soluitur, ut
acutus non letalis: Exitiosus cum nullum coctio-
nis signum præbeat, totus in hoc est ut natura co-
natum renitentem celeriter opprimat: longi verò
cū sint ex crudis crassisq; humoribus, non tamen
lethalibus, diutius immorantur, & abscessus cō-
mittunt, nisi per concoctionem finiantur. Absces-
sus autē iursum vel deorsum erumpunt pro variis
motu humorum, quem dolor comitans ostendit.

Abscessus.

CAP. XII.

Αἱ δὲ ἀποστάσεις αἱ εἰς τὰ σκέλεα ἐν τῇσι πύ-
λαισι, καὶ ἐν τῇσι τῇσιν ἰσχυρῆσι τε καὶ ἐπικινδυνώ-
σι, λυσιτελεῖς μὲν πᾶσαι, ἀριστὴν δὲ αἱ ἐν πύλαις
ἐν μετὰ βολῇ ὄντος γενέσθαι· εἰ γὰρ τὸ οἶδημα καὶ
ὁ δυνή γίγνοιτο, ἔτι πύλαι αὐτῆς ἔτι καὶ πῶδε
ἡρομάρτυς καὶ ἐκχωρέοντος ἔξω, ἔτι καὶ ἀσφαλ-
ταται ὅ, τε αὐτῶν πᾶσι πᾶσι γίγνοιτο. καὶ ἡ ἀπόστασις
ἐν αἰσίνων. ὅ, τὰ ἄλλα πᾶσι πᾶσι.

Εἰ

Εἰ δὲ τὸ πτύελον μὴ ἐκχωρεῖται καλῶς, μηδὲ τὸ
 ἔργον ὑπόσταςιν ἀγαθὰ ἔχον φαίνοιτο, κίνδυνος
 χαλὸν γινέσθαι τὸ δῶδε ἔργον, ἢ πολλὰ πείγματα πα-
 ραχεῖν.

Ὡς δὲ ἀφανίζονται καὶ παλινδρομέωσιν αἱ
 ἀποστάσεις, ὅς πτύελος μὴ ἐκχωρεόντος, καὶ ὅς πυ-
 ρετοῦ ἔχοντος, δεινόν· κίνδυνος γὰρ μὴ ἀπὸ φρε-
 νήσεως καὶ ἀποθνήσκει ὁ αὐτῶν ἄνθρωπος.

Τῶν δ' ἐμπύων, τῶν ἀπὸ τῆς πύρεως πυρετικῶν,
 οἱ νεώτεροι μᾶλλον ἀποθνήσκουσι. ἐκ δὲ τῆς ἀλ-
 λων ἐμπυημάτων, οἱ νεώτεροι μᾶλλον ἀποθνή-
 σκουσιν.

Ceterum abscessus ad crura in pulmonis
 inflammationibus fortibus ac periculosis o-
 mnes quidem utiles sunt: optimi vero sunt,
 qui dum sputum iam in mutatione est, fiunt:
 Si enim tumor & dolor fiat, sputo pro fluo
 purulento fiente & foras procedente, ita se-
 curissime homo superstes evaserit, & absces-
 sus celerrime sedabitur. Si vero sputum non
 bene processerit, neque urina subsidentiam
 bonam habens apparuerit, periculum est fo-
 re claudum articulum, aut multum mole-
 stiarum exhibiturum. At si evanescant &
 recurrant abscessus, sputo non prodeunte,
 febreque permanente, horrendum est. Pe-
 riculum enim est ne deliret homo & mori-
 riatur.

Ex suppuratis à pulmonis inflammatione, seniores magis intereunt: Ex aliis autem suppurationibus iuniores magis moriuntur.

Sententia est Hippocratis de bonis abscessibus, quòd optimi sunt si deorsum & quàm longissimè à morbo absistant, sed potissimùm si cum concoctione fiant: concoctio enim celerem iudicationem ac securam sanitatem significat. Porro concoctionem indicat screationis mutatio, & item vacuatio inanocua atque multa. Sed si citra morbi concoctionem abscessus sit in cruribus, vindicabit quidem & hunc in modum hominem à periculo in peripneumonia imminente, sed articulus ipse in quem decumbet, difficilius sanitati restituetur, ac forsitan aliquando ager claudicabit. Si verò abscessus aboletur, sputo non exeunte, ac febre detinente, difficilis morbus est: Constat enim quòd humores in profundum refluxerint ad partes precipuas. Nam si discussi essent, non amplius febricitarent, & facile spuerent. Itaque verisimile est in pulmonem omnem secessisse fluxionem, & ob eam rem delirare eos par est. Inter purulentos autem ex peripneumonia, seniores potius intereunt, quia propter spuitionem sanatio viribus eget validioribus. Per alias verò suppurationes, sub ipso suppurationis tempore iuniores ex magnitudine febrium ac doloris, sæpius moriuntur.

Dola-

Dolores circa lumbos. CAP. XIII.

Αἱ δὲ ξυὺ πυρετῶ γενόμεναι ὁδυῖαι αὖτε πλὴν
ὁσφύ τε καὶ τῆς κατὰ χεῖρας, καὶ τῶν φρενῶν ἀπὸ τῶν
ταῦτα κατὰ ἐκλείπουσαι, ὁλέθρια καί εἰσι.

Προσέχον οὖν δεῖ τὸν νόον τοῖσιν ἄλλοις ση-
μείοισιν, ὡς καὶ πρὸς τῶν ἄλλων σημείων ἐπιφάνη-
ται ἡ πονηρὰ, ἀνέλπιστος ὁ αὐτῶν πόνος.

Οἱ γὰρ δὲ ἐμπύων καίονται, οἷσιν αὖ καὶ τοῖς
ἐν τῇ πύον ἢ καὶ λευκῇ, καὶ μὴ δυσώδεσ, σφύρον-
ται. οἷσι δὲ ὑφαίμεν τε καὶ βορβορώδεσ, ἀπόκλιται.

Εἰ δὲ ἀναιόσαντες τὸ νοσήματα ὡς πρὸς τὰς φρε-
νας, τὰλλα σημεῖα μὴ πονηρὰ ἐπιγίνηται, ἐμπύον
ἔσεσθαι τὸν πολλὰν ἐλπίδες.

Dolores cum febre fientes circa lumbos
& infernas partes, si septum transversum at-
tigerint, infernas partes relinquentes, per-
niciosi valde sunt. Proinde aliis quoque si-
gnis animū advertere oportet. Nam si quod
etiam ex aliis signis malum apparuerit, de-
speratus est homo. Si verò affiliente ad se-
ptum transversum morbo, alia signa nō ma-
la accesserint, hunc suppuratum fore multa
spes est. Quicunque verò suppurati viun-
tur, quibus quidem purum pus fuerit & al-
bum, & non foetidum, hi servantur; Qui-
bus autem subcruentum & coenosum, hi
pereunt.

Si verò affiliente ad septum transversum morbo, alia signa nō mala accesserint, hunc suppuratum fore multa spes est.

Vult recurrense in thoracem morbo, è duobus alterum, aut de repente mori agrotum, aut si ille melius habet, prorsus fore purulentum.

Dolor à vesica.

CAP. XIV.

Κύστις ἢ σκληρά τε καὶ ἰσχυροὶ δεινὰ καὶ πᾶν τελευτᾷ καὶ ὀλέθρου· ὀλεθρῶταται ἢ ὀκνησὶ καὶ πυρετῶ συνεχεῖ γίνονται· καὶ γὰρ οἱ αἱματέων τῶν κύστεων πόνοι. ἰσχυροὶ δὲ πικτεῖναι· καὶ αἱ κυστίαι εἰς ἀσχερέσσιν ἐν τετέω τῶ χύσιν, εἰ μὴ σκληρὴν πικρὴν ἀνὰ κέντρον.

Λύει ἢ ἔρρι πυλῶδες ἐρηθρὴν, λευκὴν καὶ λεῖω ἔχον τιὸν ὑπὸ στήθιν.

Ὡς ἢ μήτε τῶ ἔρρι μὴδὲν ἐνδοδὴν ἢ πᾶν, μήτε ἢ κύστις μελαίνουται, ὅτε πυρετὸς συνεχὴς ἢ, ἐν τῇσι πρὸς τῇσι πρὸς τῇσι νοσήματος, ἐλπίς τὸν ἀλγέοντα δὲ πλεονάζει.

Ὁ ἢ σφόδρα ἔπει ἀπτεται τῶ πυρετῶν μάλιστα τῶ ἐπιπλεονάζοντι, ὥς αὖ ἐς τὴν πεντεκατήδεκα ἔτασιν ὀνύσσονται.

Porro vesicæ duræ & dolentes, penitus quidem horrendæ ac perniciosæ sunt: perniciosissimæ verò quæ cum febre continua fiunt. Etenim dolores ab ipsis vesicis ad occiden-

cidendum sufficiunt, & alui non egerunt hoc tempore nisi durum quiddam, & hoc coactè. Si vrina mingitur purulenta, candidum ac læue obtinens sedimentum, solutio morbi: Si verò neque ab vrina quicquàm remiserit dolor, neque vesica molliatur, & febris continua fuerit, in primis circuitibus morbi ægrum moriturum esse timor est. Atque hic medus potissimùm pueros corripit septennes, donec ad quintumdecimum annum peruenerint.

Durities & dolor vesica cum febre hoc malum habet, quòd & deiectionem & vrina suppressionem inducit. Hac vesica inflammatio si concoquatur, eò decumbent concocti humores, ac pariter cum vrina excernentur, indicia bona concoctionis in sedimento habentes: Si verò crudus permaneat affectus, nec dolor leniatur, ex eo vix conualescit ager.

Ceterùm ob intempestiuos cibos, copia humoris crudi in corporibus puerorum colligitur: Is igitur per renes expurgatus quotidie, atque etiam per urinarios meatus in vesicam collectus, interdum calculos in ea gignit, saepe etiam inflammationem, cum ab assiduo eorum humorum transitu vesica magnum malum acceperit.

HIPPOCRATIS

PRÆNOTIONVM

LIBER TERTIVS.

De febribus.

CAP. I.

ΟΙ δὲ πυρετοὶ κελύονται ἐν τῇσιν αὐτέῃσιν
 ἡμέρησι τὸν ἀριθμὸν, ἐξ ὧν τε παριγίνονται
 οἱ αἰθρωποὶ, καὶ ἐξ ὧν ἀπόλλυνται. οἵ τε γὰρ ὡς ἡμέ-
 ρα τοὶ πυρετοὶ, καὶ ἐπὶ σημεῖων ἀσφαλεστάτων
 βεβηότες τεταρταῖοι παύονται ἢ παρόθεν. οἱ, τε ὅ
 κακῶς ἡμέρᾳ καὶ ἐπὶ σημεῖων δεινότητων γινόμε-
 νοι, τεταρταῖοι κτείνουσιν ἢ παρόθεν. ἢ μὲν οὖν
 παρόθεν ἐφοδὸς αὐτέων ἔτω τελευτᾷ· ἢ δὲ δού-
 πτερη, ἐς τὴν ἐξόδον παριγίνεται· ἢ δὲ τρίτη, ἐς
 τὴν ἐνδεκάτην· ἢ δὲ τετάρτη, ἐς τὴν πενταεκα-
 δεκάτην· ἢ ὅτι πέμπτη, ἐς τὴν ἐπιδεκάτην· ἢ ὅτι
 ἑκτὴ, ἐς τὴν εἰκοσὶν. αὐτὰ μὲν οὖν ἐν τῇ ὁξυτά-
 τῃ νοσημῇ. ἀπὸ τεσσάρων ἐς ἑξῆς εἰκόςιν, ἐν
 παρόδεσι τελευτῶσιν.

Febres iudicantur in iisdem numero die-
 bus, ex quibus & superstites euadunt homi-
 nes & ex quibus pereunt. Etenim placidissi-
 mæ febres, & signis securissimis nitentes,
 quarto die definunt, aut prius. Malignissimæ
 verò & signis horrendissimis affligentes,
 quarto die aut prius accidunt. Primus igitur

tur ipsarum insultus sic definit. Secundus autem ad septimum producitur: Tertius ad undecimum: quartus ad decimum quartum: quintus ad decimum septimum: sextus ad vigesimum. Hi igitur impetus ex acutissimis morbis per quatuor ad viginti ex additione definunt.

Nomen iudicationis aut crisis in morbis usurpatum, à foro translatum est, significans subitam in morbo mutationem, qua quatuor modis fit: aut enim statim vindicantur à morbo, aut magnam habent in melius mutationem, aut statim moriuntur, aut multo peius habent, Primas duas simpliciter nominat iudicationes: sequentes duas cum additione, malam verbo iudicationis adijcientes. Porro diu idem sunt decretorij, in quibus he iudicationes fiunt ad salutem, & in quibus fiunt ad mortem. Quod significauit cum ait eosdem dies esse ex quibus supersunt homines, & ex quibus intereunt. Placidissima febres igitur & simplicissima, qua securitatis indicia habuerint, non ultra primum quaternarium procedent, sed aut quarto die aut citius desinent. Pari modo maligna, qua cum signis exitiosis inuadunt, quarto die aut citius interimunt. Itaque per tres septenarios & sex quaternarios ad vigesimum diem peruenitur, qui & ipse multas & certas crises facit.

Dierum decretorium observatio.

CAP. II.

Οὐ δύναται ὅλησιν ἡμέρησιν εἶδέν τετέων
 αἰθμεῖας ἀπεκείας, εἰδὲ γὰρ ὁ ἐνιαυτός τε καὶ οἱ
 μῶνες ὅλησιν ἡμέρησιν πεφύκασιν ἀριθμεῖσθαι. καὶ
 ἡ ζωὴ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ καὶ τὴν αὐτὴν πρὸς
 θεοῖν ἢ πρὸς τὴν ἀείροδο πεσάρων καὶ τελήων ἢ
 μερέων ἢ δὲ δούτερη, τεσσεράκοντα ἡμερέων ἢ ὅ
 τρίτη, ἐξήκοντα ἡμερέων. τετέων δὲ ἐν ἀρχῇσιν
 ἐστὶ χαλεπώτατον ἀσθενέειν καὶ μέλλοντα ἐν
 πλείω χρόνῳ κείναισθαι. ὁμοίωται γὰρ αἱ ἀρχαὶ
 εἰς αὐτέων. ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρης ἐν-
 θυμείας, καὶ κατ' ἐκείνην τετέμεται πρὸς τὴν μετὰ
 σκέπτεσθαι καὶ εἰρήσεται ὅσην τρέψεται τὸ νοσημα.
 γίνεται ὅ ἢ τὴν τεταρτάων κατὰ τὰς ἐν τῷ ποιεῖται
 νόσους. Ταῦτα ὅ ἐν ἐλαχίστῳ χρόνῳ μέλλοντα κείνε-
 σθαι, οὐ πετέσθαι γινώσκουσιν. μέγιστα γὰρ τὰ ἀσθενέ-
 ροντα ἀπὸ ἀρχῆς αὐτῶν εἰσιν. οἱ μὲν γὰρ ἀεισύνει-
 νοι, οὐ πρὸς τε καὶ ἀνὰ δυνάμει εἰσι, καὶ κατὰ τὴν ζωὴν
 νύκτας, ἡμέρας ἀλλὰ σημεῖα ἔχουσιν ἀσθενέσθαι. οἱ
 ὅ ἀπολλύμενοι, οὐ πρὸς γίνονται, ἀλλ' ἀσθενέσθαι, οἱ
 ἀσθενέοντες, ἡμέρας ἀλλὰ σημεῖα κατὰ τὴν ἔχοντες.
 οἱ οὐ τετέων ἔτω γινώσκουσιν, ἐν μετὰ ἀλλεῖσθαι καὶ
 κατὰ τὴν χρόνον, κατὰ τὴν πρὸς ἀσθενέσθαι ἐκεί-
 νῳ ἐπὶ τὴν κείσιν ἰόντων τῷ νοσηματι.

Non potest autem quicquam horum in-
 tegris diebus exacte numerari, neque enim
 annus

annus & menses integris diebus numerati possunt. Postea vero eodem modo iuxta eandem additionem Primus circuitus quatuor & triginta dierum est: secundus quadraginta dierum: tertius sexaginta dierum: at in horum principiis difficillimum est cognoscere eos qui in plurimo tempore iudicabuntur, simillima enim sunt ipsorum principia. Verum à primo die animadversionem facere oportet, & prout singuli quaternarij adduntur, considerare, & non latebit te quod vertetur morbus. Fit autem & quartanarum constitutio ex huiusmodi ordine. Qui porrò morbi in brevissimo tempore iudicabuntur, faciliores cogniti sunt. Maximæ enim differentiæ ab initio ipsius sunt. Qui enim superstites ab ipsis evasuri sunt, facile spirantes, & doloris exortes sunt, & noctu dormiunt, aliaque signa securissima habent: qui verò morituri, agere spirantes sunt, delirantes, vigilantes, aliaque signa pessima habentes. Ut igitur his ita contingentibus coniectare oportet, & iuxta hoc tempus, & iuxta unamquamque additionem, tendentibus ad iudicationem morbis.

Cum vigesima dies ab Hippocrate constituitur inter decretorios, cumque tres septenarij viginti diebus circumscribantur, constat quod quaternarius

sexies repetitus ante vigesimum non sit integrorum dierum, sed pars quadam deest, nisi finis vixius quaternarij principium sit alterius, ac utriusque dies unus sit communis. Sic trium septenariorum ad vigesimum usque diem inter se numeratorum non eadem fuit composuitio: secundus enim à primo seiunctus est, proinde quarto decimo die finitur: tertius verò secundo copulatus est, & ob eam rem finitus est vigesimo die: atque septenarij eadem ratio est post vigesimum usque ad quadragessimum, sexagesimū, ac ita deinceps, adeo ut trigessimus quartus sit primus post vigesimū, qui sit antecedenti septenario communis & sequenti, à quo ad quadragessimū sit progressus. Quòd etiam annus non numeretur integris diebus ex eo planū est, quòd non trecentis & sexaginta quinque diebus tantummodò constet, sed etiam quarta parte diei, exceptis duodecim minutis, 38 secund. & 37. tertijs. Similiter unusquisque mensis minor est triginta diebus, maior verò nouem & viginti. Porro cum sit iudicatio ad bonum aut ad malum mutatio (constat enim quòd semper fit iudicatio vel natura superante morbum, vel ab eo victa) si morbus & natura quasi pares in conflictu hostes pugnent, plus temporis ad alterius victoriam desideratur, si verò magnus sit excessus alterutrius, in promptu victoria est ei qui superior est. Itaque natura minimos morbos & qui sunt cum signis haudqua-

quaquam malis, citissime vincit: à maximis autem celerissime vincitur. Victoria vero per singulos quaternarios considerata, utrum in salutem a gri vincente scilicet natura, an victa ad mortem mutatio fieri debeat: Ex signis quæ subijcit id animaduertendum. Verum ut in continuis febribus numeramus dies in prædictionem futura indicationis, ita in intermittētibus, accessiones, ut quod in continuis febribus dies septimus efficit, id in intermittētibz septima circuitio efficiat. Ob id igitur exquisita tertiana septem periodis non diebus septem iudicari solet. Atque ut quartus dies septimi est index, ita quata circuitio septima est index. Quocirca nunc unum id intellexisse sufficiet quod quartana febris indicationes ex numero circuitionum fiant non dierum.

Iudicationes in mulieribus à partu.

CAP. III.

Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον, καὶ τῇσι γυναιξὶν αἱ κρίσεις ἐκ τῶν ἡμερῶν γίνονται.

Iuxta eandem rationem mulieribus quoque iudicationes fiunt ex partu.

Principium numerationis erit non quo die cœperint febricitare, sed quo pepererint.

Dolor capitis & faucium cum febre.

CAP. IV.

Κεφαλῆς δὲ ὀδυνοὶ ἰχυραὶ τε καὶ ξανχαὶ καὶ πυρετοί, ὧν μὲν πρὸς θάνατον δέων σημεῖων

πρεσβύνουσιν, ὁ δὲ θάνατον κέρειται.

Εἰ δὲ ἄτερ τῆς τοῦ σώματος σημείων ἡ ὁδὸς ἢ ὑπὸ
βάλλοι εἴησιν ἡμέρας, ὅ, τε πυρετὸς ἐχοι, ὑποσκε-
πτεῖται χρεὶν αἵματος ῥῆξιν διὰ ῥινῶν, ἢ ἄλλω ἱ-
να δότωσιν ἐς τὴν κατὰ χεῖρα.

Εἰς αὐτὴν δὲ καὶ ἡ ὁδὸς ἢ νεαρὰ πρεσβύτατος χρεὶν
ὡσπύτως, αἵματος ῥῆξιν διὰ ῥινῶν, ἢ ἐκπύησιν.
ἄλλως τε καὶ ἡ ὁδὸς ἢ πρὸς τὰς κροτάφους καὶ τὸ
μέτωπον ἢ.

Μᾶλλον δὲ χρεὶν πρεσβύτατος ἢ μὲν αἵματος
τὴν ῥῆξιν τοῖσι νεώτεροις πέντε καὶ τελέωνται
ἐτέων τοῖσι ὅ γεραιτέροις, τὴν ἐκπύησιν.

Ὡς δὲ ὁξείη ὁδὸς ἢ ξυμὸς πυρετὸς ξυμειχθεὶς καὶ
ἐχυρὰ, δεινόν· κίνδυνος γὰρ πρὸς φρεσὶν καὶ τὸν
αὐθράπων, καὶ δὲ πλεονάζει. ὡς οὖν τέτταρες ἢ πέντε
σφαλεροὺς ἔόντος, τοῦδε δὲ πρὸς τὴν νόσον
τοῖσι σημείοις πᾶσιν, ἀπὸ πρῶτης ἡμέρης.

Απόλλυνται δὲ, οἱ μὲν νεώτεροι τῆς αὐθράπων,
ἐβδόμηται ἐπὶ θάσσει, ὑπὸ τέτταρες ἢ νοσήματος· οἱ
ὅ γεροντες, πολλὰ βραδύτερον. οἷον γὰρ πυρετὸς καὶ
αὐθράπων αἵματος ἢ ὅσον αὐτοῖς ἐπιγίνονται, καὶ
τὰ ὅσα διὰ τῶν φθάνει ἐκπύησιν. ἀλλὰ
τοῖσι μὲν τῆσιν ἡλικίᾳ ὑποσφορὰ ἢ νοσή-
ματος ἐπιγινώσκουσι, ἀπὸ κτείνεσι τὰς πλείους· οἱ
ὅ γεροντες, πρὶν ἐκπύησιν ἢ ὑπὸ ἀπόλλυνται.

Επιπύει ῥηὶ πύον λευκὸν ἐκ τῶν ὡς, ἐλπίς τῆς
νεωτέρᾳ πρὸς χεῖρα. καὶ γὰρ καὶ ἄλλοι αὐτῶν ἐπι-
γίνονται χρεὶν σημείον.

Φάρμακ.

Φάρυγξ δὲ ἐλκευμένη, συν πυρετῷ, δεινόν·
ἀλλ' οὐ πρὶν ἄλλο σημεῖον γίνεσθαι τῆς περικεκε-
μένης πονηρῶς ἐξ, πρὸς λέγειν ὡς ἐν κινδυνῷ εἶναι-
το δ' αὖ πρώτῃ.

Capitis dolores fortes & continui cum febre, siquidem lethaliū signorum quid accesserit, perniciosi valde sunt: si verò absque talib. signis dolor viginti dies transmiserit, & febris tenuerit, sanguinis ē naribus eruptionem, aut abscessum quendam ad infernas partes expectare oportet: Sed & quando dolor recens fuerit, similiter sanguinis ē naribus aut puris eruptionem sperare conuenit, cum alias, tum si dolor circa tempora & frontem fuerit. Verum sanguinis eruptio magis expectanda est iunioribus triginta quinque annis, senioribus autem puris eruptio. Aurium dolor acutus cum febre continua ac forti, horrendus est: periculum enim est deliraturum hominem ac periturum. Proinde cū hic modus minimē tutus sit, citò mentem aduertere oportet etiam aliis signis, a primo stat in die. Pereunt autem iuniores homines septimo die, & adhuc citius, ex hoc morbo: senes verò longē tardius. Nam & febres & deliria minus ipsis accidunt: & hac de causa aures antea suppurantur. Verum his quidem ætatibus

recidivæ morbi contingentes plurimos occidunt. At verò iuniores priusquam suppuratur auris, pereunt: nam si pus album effluerit ex aure, spes est iuvenem superstitem evasurum esse, si sanæ & aliud quoddam bonum signum accedat, fauces exulceratæ cum febre horrendæ sunt. Verum si quod aliud signum accedat ex his quæ antea mala iudicata sunt, in periculo hominem versari prædicendum est.

Capitis dolor continuus cum febre, maximi est ad præcognitionem momenti: nam inde vel sanguinis eruptio futura est in iuuenibus, præsertim quibus multus est sanguis calidus & biliosus, vel suppuratio expectanda, præsertim in senibus quibus non ita sanguis abundat. Aurium etiam dolor acutus, quo afficitur auditorius nervus, cerebro non ex longo intervallo copulatus, difficilis est. Siquidem nonnulli delirant cerebro in consensum adducto, aliqui repente moriuntur, quoties fluxio committens dolorem in cerebrum irruerit: Cui periculo sunt magis obnoxij iuvenes, ob calidum & biliosum temperamentum. Reliquum dictionis satis perspicuum est.

Angina.

CAP. V.

*Αἱ δὲ κυανᾶλαι, δεινότεται μὲν εἰς ἡλικίαν
αἰσχροδύν, ὅσῳ μῆτε ἐν τῇ φάρυγγι μὴ δὲν
ἐκδηλον παύσσει, μῆτε ἐν τῇ αὐχένι· πλείστον ὁ
πόνογ*

πάνον παρέχουσι καὶ ὀρθόπνοιαν αὐταὶ γὰρ καὶ αὐθι-
μερην ἀποπνίγουσι, ἔδ' ὀυτεράϊα, καὶ τριταῖα, ἔ-
τεταρταῖα. ὅσα δὲ τὰ μὲν ἄλλα τῶν ἀποπνέουσιν πό-
νον παρέχουσιν, ἐπαύρουνται δὲ καὶ ἐρύθηματι ἐν τῇ
φαρυγί ποιεῖσιν, ὁλέθρια μὲν καὶ ἄρτα, χρονιώτε-
ρα δὲ μᾶλλον τῶν πρὸς τὸ ἐρύθημα μέγα γί-
νηται.

Οἱ ὅσοι δὲ ξυμμερίζονται τὴν φαρυγί καὶ ὁ αὐ-
χλὺς, αὐταὶ δὲ χρονιώτερα· καὶ μάλιστα ἐξ αὐ-
τέων λινὲς ἀποφύγουσιν, ὡς ὅτε αὐχλὺς καὶ τὸ σῆ-
θος ἐρύθημα ἔχη, καὶ μὴ παλινδρομεῖν τὸ ἐρυσίπε-
λος εἶπω.

Ἦν δὲ μήτε ἐν ἡμέρησι κλεισίμῃσιν ἀφανίζηται
τὸ ἐρυσίπελος, μήτε φύματος ἔκταφέντος ἐν τῷ
ἔξω χρωρίῳ, μήτε πῦον ἀποθήσῃ, ῥηιδίως τε καὶ
ἀπόνως ἔχῃ δοκέη. θάνατον σημαίνει, ἢ ὑποσφ-
φὼν τὸ ἐρύθημα.

Ἀσφαλέστερον δὲ τὸ οἶδημα καὶ τὸ ἐρύθημα ὡς
μάλιστα ἐξ ἀπείρου· ὡς δὲ ἐς τὸν πυθόμενον πε-
πείη, ἀφάνοι αὐτὸ ποιεῖ καὶ ἐμπυοὶ ἐξ αὐτέων λινὲς
ὡς ὅτι πολλὰ γίνονται.

Anginae horrendissimæ sunt, & citissimè
occidunt, quæ neque in faucibus quicquam
conspicuum faciunt, neque in ceruice, ve-
rùm plurimum dolorem exhibent, & ere-
cta ceruice spirationem inducunt: hæ enim
eodem die suffocant, secundo item ac tertio
& quarto. Quæ verò alioqui similiter dolo-

rem exhibent, attolluntur autem, & in faucibus rubores faciunt, perniciosæ quidem valde sunt, verum prioribus diuturniores, si robur fuerit magnus. Quibuscunque verò fauces & ceruix simul rubuerint, hæc angina magis diuturnæ, & ex his maximè euadunt, si & ceruix & pectus ruborem habuerit, & erysipelas ignis sacri non intrò recurrerit. Si verò neque in diebus iudicatoriis dissipetur erysipelas, neque tuberculum ad externam partem conuertatur, neque pus tussiendo reiiciat, facileque ac sine dolore degere videatur, mortem significat, aut ruboris reciduiam. Securius est autem tumorem & ruborem quàm maximè foras verti: Si verò ad pulmonem vertatur, delirium inducit, & quidam ex ipsis ita affecti suppurantur.

Qui angina laborant, si vehementer strangulantur, ut cogantur erecta ceruice spirare, magno cum dolore vitam exigunt, nullum aut in ceruice aut in faucibus symptoma habentes. Post hos verò sunt ij qui non spirant quidem difficulter, sed dolore admodum vexantur, & pariter tumescit ceruix, & fauces rubicundiores euadunt. Tertio sunt ij de quibus Hippocrates presenti sermone dicit, qui nec vehementer affliguntur dolore, nec spirant difficulter, & guttur nequaquam afficitur, sed aut in fauces fluxio, aut in ceruicem, aut in

aut in hac utraq; conuersa est. At verò fluxio talis magna ex parte biliosior est, ita ut perspicue erysipelas aut phlegmonem erysipelas odè committat. Huius materia si diebus decretorijs transmeet in pulmonem, recurret q; in id erysipelas nequaquam digestum in exteriori superficie, non solum non bonum id est sed malum maximum: propterea quòd ex diei sive firmitatem assumat prauitatem. At si pariter tuberculo foras tendente, ac facile exire ante agere, deletur erysipelas aut rubor, tum non moriturum agrum expectare oportet.

Gurgulio inflammatione laborans.

CAP. VI.

Οἱ δὲ γαργαρέωνες, ἐπικίνδυνοι καὶ ἀποτέμνεσθαι, ὡς ἀποχρίσεις, ἔς' αὐτὸν ἐρυθρόν τε αἶμα καὶ μελάλοι· καὶ γὰρ φλεγμοναὶ ἐπιγίνονται τῷ τέρεισι καὶ αἰμορροαίαι. ἀλλὰ καὶ τὰ βλαύται εἴσιν ἄλλοις μηχανήμασι περὶ αὐτὸν καὶ χυνοῖν ἐν τέρει τὰ χεῖρα.

Οἷον δὲ ἀπὸ τοῦ ἡδὴ πᾶν, ὃ δὲ σφυγμῶ καλέσται, καὶ χυνοῖν μὲν ἀκρὸν τὸ γαργαρέωνος, μείζον τε καὶ πλείονος· τὸ δὲ αἰσώτερον λεπτότερον ἐν τέρει τὰ χεῖρα, ὡς φαλὰς ἀφαιεῖν. ἐμεινον δὲ καὶ τὴν χειρὶν ἐποκένωσαν τὰ χεῖρα καὶ χεῖρας, ὡς τε χεῖρα τὸ ξυλχωρὴ καὶ μὴ δὲ πινύται ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος.

Gurguliones periculosi sunt ut rescedantur & scarificentur, quandiu rubicundi fuerint

Ec

& magnam inflammationes ad hos succedunt & sanguinis eruptiones. Quare tales aliis machinamentis attenuare conari oportet hoc tempore. Quum verò totum iam fuerit secretum id quod vuam appellant, & fiat extrema gurgulionis pars maior & rotunda, superior autem tenuior, in hoc tempore tutum est chirurgia rem aggredi. Præstat tamen & aluo subducta, chirurgia hac uti, si liceat per tempus, & æger non stranguletur.

Prognostico theoremati iunctum est præceptum therapeutices, sine quo fieri non potest ut integrè cognoscatur præsagium. Gurgulionem si inflammatione laborantem præcidas aut scarifices, sanguinis fluxor & inflammatio comitabitur: sed quoties excretum fuerit id quod vuam appellant, fueritque pars summa gurgulionis maior & orbiculata, superior verò tenuior, tum adhibere manus tutum est, potissimum aluo antea abudè subducta siue sponte, siue etiam providentia medicorum.

Signa febrium non determinato loco affecto. CAP. VII.

Οὐδὲν δὲ αὐτῶν οἱ πυρετοὶ παύονται, μήτε σημείων ἀνορθῶν λυπηρίων, μήτε ἐν ἡμέρησι κλισίῃσιν, ὑποστροφῶν πρὸς δέχασιν χερὶ τέτοιαισιν. Οὕτως δὲ αὐτῶν πυρετὸν μηκύνει ἀδυναμία Διὰ κούφον ἢ αὐτῶν πρὸς μελέν ὁδῶν ἐκείνης Διὰ φλεγμα-

φλεγμονή πύλα, μήτε δ' αὖ πρὸς φασιν ἄλλω με-
 δεμίῳ ἐμφανείᾳ, τέτρω πρὸς δέχασιν ἀπόστασιν
 μετ' οἰδήματός τε καὶ ὁδὸν εἰς ἡτῆς δ' ὅρων, καὶ
 ἔχῃ ἥσον ἐκ τῆς ἡμέρας.

Μᾶλλον δ' γίνονται καὶ ἐλάσσονι χρόνῳ αἱ τοιαῦ-
 ται ἀποστάσεις, τοῖσι νεωτέροις τριήκοντα ἔτεων.

Υποσκέπτει δ' καὶ ἡ δὴ θείας αἰσθῆς ἀποστά-
 σις, ὡς εἴησιν ἡμέρας ὁ πυρετός ἔχων, ὡς δ' ἀλ-
 λη· τοῖσι δ' γεραιτέροις ἥσον γίνεται πολυχρο-
 νιότερον ἔοντος ὁ πυρετός.

Χρὴ δὲ τὴν μὲν τοιαύτην ἀπόστασιν πρὸς δέχασιν
 σωζέσθαι ἔοντος ὁ πυρετός· εἰς δ' ἡ τεταρτάῃον κα-
 τασῆσεσθαι, ὡς δ' αὖ λείπη τε καὶ καταλαμβανή πε-
 πλανημένον τὸ πᾶν, καὶ ταῦτα ποιεῖν τὰ φθινο-
 πύρῳ πρὸς ἀελάση.

Ὡσπερ δὲ τοῖσι νεωτέροις τῆς τριήκοντα ἔτεων
 αἱ ἀποστάσεις γίνονται, ἔτις οἱ τεταρτάῃοι μᾶλ-
 λον τοῖσι τριήκοντα ἔτεων, καὶ γεραιτέροις.

Τὰς δὲ ἀποστάσεις εἰδέναι χρὴ, ὅτι χιμαίνονται
 μᾶλλον γυναικῶν, χρονιώτερον τε παλαιότητος,
 ἥσον δὲ παλινδρομύσας.

Quibus febres cessant, neque signis solu-
 toriis apparentibus, neque in diebus iudica-
 toriis, his reuersuras esse expectandum est.
 Quaecunque febris longiorem moram tra-
 xerit, homine alioqui ad salutem disposito,
 ita vt neque dolor teneat ob inflammatio-
 nem, aut ob aliquam aliam manifestam cau-

sam, huic abscessum expectare oportet cum tumore ac dolore ad aliquem articulum, maximeque inferiorem. Fiunt autem huiusmodi abscessus magis, & in breviori tempore, his qui iuniores sunt triginta annis. Expectare verò statim oportet abscessum, si febris detinens viginti dies transmiserit: Senioribus autem minus fiunt, diuturniore etiam existente febre. At verò huiusmodi abscessum expectare oportet, febre continua existente. Verum ad quartanam deducetur si intermiserit, & erroneo modo apprehenderit, & si hæc faciens ad Autumnum appropinquarit. Quemadmodum autem iunioribus triginta annis abscessus fiunt, ita quartanæ magis his qui triginta sunt annorum, & senioribus. Cæterum hæc nosse expedit, abscessus magis Hyeme fieri, tardiusque cessare & minus recurrere.

Relicti post indicationem imperfectam humores mali, putrescunt & recidivam generant. Cum verò triplex sit causa prorogationis febrium, aut enim prorogantur propter aliquam partem affectam curatu difficilem, aut propter humores crudos crassos, aut propter aliquod erratum: si nec affecta fuerit pars, nec admissus sit error aliquis, restat, ut propter humores crudos ac concoctu difficiles prorogetur. Hos igitur affolet natura in partem quam

tem quandam ignobiliorem expellere, quoties per excretionem educere nō potuerit extra corpus. Sæpe enim dictū est quod humores calidiores tenuioresq; paratissimi sunt ad excretionem. Crassis vero & crudis aut per abscessum natura medetur, aut per concoctionem, nisi ita frigidi sint, ut nec excretionem nec abscessu desistentes, agrum interimant, aut perquam longo temporis spacio vix concoquantur: faculcate enim valida opus est ad hoc, ut humores frigidi ad abscessum conuertantur: unde fit ut in iunioribus affectus frigidi sapius citius, quæ per abscessum terminentur, quia virtus eorum est quàm senum validior, longiore siquidem tempore opus est, ut per atatem senilem corpus humore frigido repurgetur. Caterum Hyeme frequentius accidunt abscessus ob humorum frigidorum abundantiam. Quod vero tardius desinant, in causa est humoris natura, atque etiam ambientis aeris frigiditas. Minus autem repetunt Hyeme: repetentibus enim motum quendam inesse necesse est, at frigida pigra sunt ad motum.

Vomitio spontina.

CAP. VIII.

Ὅτις ὁ αὐτὸ ἐν πυρετῷ μὴ θανάτῳ δὲ φη' τὸ κεφαλῶν ἀλγέειν, ἢ καὶ ὀφθαλμοὺς καὶ πρὸς τὸ ὀφθαλμῶν φαίνεσθαι, ἢ καρδίαν καὶ τοῦ πύθω πρὸς τὴν χολῆς ἐμετος πάρεσι. Ἡν δὲ καὶ ῥῆγος πρὸς τὴν χολῆς καὶ κατὰ μέσην καὶ ὑποχονδρίαν ψυχρὰ ἔχη, καὶ θάλασσαν ἐπὶ ὃ ἐμετος ποιεῖται.

Ἦν δὲ πῖν ἢ φαγεῖν ὑπὸ τοῦτον χρόνον, καὶ ῥῆ-
 θῆναι ἰσχυρῶς ἐμείψεται.

Τετρων δὲ οἷσιν αὐτῶν δόξεται ὁ πόνος τῇ παρόν-
 τῃ ἡμέρῃ γίνεσθαι, τετρατάριοι πνέουσιν, μάλιστα καὶ
 πεμπτάριοι, ἐς δὲ πέντε ἐξ ὁδοῦ ἀπαλλάσσονται.

Οἱ μὲν τοὶ πλείονες αὐτῶν, δόχον δὲ μὴ πνέουσιν,
 τετρατάριοι χαμῶδονται δὲ μάλιστα, πεμπτάριοι ἀ-
 παλλάσσονται δὲ ἐν αὐτοῖς, ἢ ἐν δεκάταροις.

Οἱ δὲ αὐτῶν δόξονται πεμπτάριοι πνέουσιν, ἐπὶ λ-
 λα καὶ λόγον αὐτέοις, τῇ παρόντῃ γίνονται, ἐς πέντε
 πνεύσας καὶ δεκάτην κλίνειται ἡ νόσος. γίνονται δὲ
 ἑξήκοντα ἔτη μὴ αὐτοῖς, καὶ τῇσι γυναιξί, ἐν ἑξή-
 κοντα ἔτη μάλιστα, ἑξήκοντα δὲ νεώτεροις, γίνονται
 μὴ καὶ ἐν τεταρτάριον, μάλιστα δὲ ἐν τοῖς ξυνεχέ-
 ροις, πυρετοῖς, καὶ ἐν ἑξήκοντα γυναιξί, τεταρτάριοις.

Οἷσι δὲ αὐτοῖς τοῖς ὁπῶ πυρετῶ κεφαλῇ ἀλ-
 γέσκειν, αὐτῶν μὴ δὲ ὁρφνῶδες ἢ παρὰ τῇ ὀφθαλ-
 μάδιν φαίνεσθαι, ἀμβλυωδὲς γίνονται, ἢ μαρμαρυ-
 γαὶ παρὰ φαίνονται. αὐτῶν δὲ δὲ καρδιώσκειν, ἐν τῇ
 ὑποχονδρίῳ ἐπὶ δεξιᾷ ἢ ἐπὶ ἀριστερᾷ, ξυμτείνεται
 ἢ, μήτε ξυμὸς ὁδυνῇ, μήτε ξυμὸς φλεγμονῇ, αἷμα
 ἀπὸ τῇ ρινῇ τεταρτάριοις, ῥυτύνει παρὰ δεξιᾷ αὐτῶν
 δὲ ἐμέτερον, μάλιστα δὲ καὶ ἐν ταῦτα τοῖς νέοις, δὲ
 αἷματος πέντε ῥῆξιν παρὰ δεξιᾷ. ἑξήκοντα δὲ τεταρτά-
 ροις ἐπεσι καὶ νεώτεροις, ἡσόν, ἀλλὰ τὰς ἐμέ-
 τας τεταρτάριον παρὰ δεξιᾷ.

Quicunque verò in febre non lethali di-
 xerit sibi caput dolere, aut etiam præ oculis
 obscu-

obscurum quiddā apparere, si & osculi ventris morsus huic accesserit, ei biliosus vomitus aderit. At si quid biberit aut ederit sub hoc tempus, valde citò vomet. Porro quibus horum dolor fieri incœperit primo die, hi quarto magis quàm quinto premuntur, septimo verò liberantur. Plerique tamen ipsorum tertio die dolere incipiunt, vexantur autem maximè quinto, liberantur nono aut vndecimo. Qui verò incœperint quinto die dolere, aliaque iuxta rationem priorum ipsis fiant, his ad decimumquartum morbus iudicatur. Fiunt autem hæc & viris & mulieribus, maximè in tertianis. iunioribus accidunt etiam in illis, verum magis in continuis febribus, & in synceris tertianis. Quibuscunque verò in huiusmodi febre caput dolentibus, pro eo quod obscurum quiddam præ oculis appareat, visus habetudo contingit, aut splendores ob oculos obuersantur, & pro osculi ventris morsu, in præcordiorum dextra aut sinistra parte aliquid tenditur, neq; cum dolore, neq; cū inflammatione: sanguinem de naribus his fluxurū esse pro vomitu expectandū est. Magis tamen & hîc in iuuenibus sanguinis eruptionē expectare oportet. His autē qui trīginta sunt annorū, & seniores adhuc, mitius: Verū vomitus in his expectari debent.

Ee 4

Vomitionis critica signa, febris minimè exitiosa, dolor capitis, atrum aliquid ob oculos obuersans quod à flaua bile exhalatur, hæc enim multum assata nigrum vaporem seu fuliginem quædam mittit ad caput, ei dolorem inferens. Hanc igitur exhalationem à cerebro permeantem ad oculos visorius spiritus sentiens (quemadmodum si in suffusionibus) imagines quasdam tenebricosa concepit. His si accedat etiam morsus oris vètri illi cum tremore labri inferioris, biliosus vomitus expectandus est. Quod si tum algor prehendat hominem, magis etiam vomitio non solum celerius sed etiam copiosior bilis sequetur, cum rigor magna ex parte bilis vomitionem efficiat. Quinetiam si quid bibat aut hæsitet per illud tempus homo adhuc citius euomet, quia una cum bile ingestibilia in ventriculo vitiantur. Porro à die quando dolor capitis coepit, præfinis diem in quo criticè liberari debeat citius vel tardius, secundum tempus quo incepit dolor, & secundum rationem dierum decretoriorum, qui morbos acutos non eodem modo cum sint dissimiles iudicant. Atque ut illa sunt vomitionis biliosa signa, sic dolor capitis tali febre, hebetudines oculorum & splendor, tensio in hypochondrio sine dolore & inflammatione, adhuc oculi sponte illacrymantes fluorem sanguinis è naribus, in adolescentibus maximè quibus sanguis exuperat, ostendunt.

Col

Convulsio puerilis.

CAP. IX.

Τοῖσι ὅ παῖδοισι σπασμοὶ γίνονται καὶ ὁ πυρε-
τὸς ἐξ ὧν ἢ καὶ ἡρπῆς καὶ ἀσχαρή, καὶ ἀγρυπνέουσι
τε, καὶ ἐκπληγέωσι, καὶ κλαυθμυρίζωσι, καὶ τὸ χρο-
μα μεταβάλλωσι, καὶ χλωρὸν, ἢ πάλιον ἢ ἐρυθρὸν
ἴχουσι.

Γίνεται ὁ σπασμὸς ἐξ ἐτοιμοτάτης καὶ τοῖσι πα-
δοῖσι τοῖσι νεωτάτοισιν, ἐς τὴν ἐπὶ ἑταῶν τὸν ὅ
πρὸς οὐτέρω τῶν παίδων καὶ οἱ αὐτοὶ οὐκ ἐπὶ ἐν
τοῖσι πυρετοῖσιν ἀπὸ τῶν σπασμῶν ἀλίσκονται, καὶ
μήτερ σημεῖον προσγίγνεται τὸ ἰσχυροτάτων τε καὶ
κακίστων, οἷα παρὰ ἐν τῇσι φρενίτι γίνονται.

Τῶν δὲ πολλοῦ χρόνου τε καὶ ἀσθενέστερας τῶν πα-
ιδων τε καὶ τῶν ἄλλων τεκμήρια τῶν ζύμπτωσι
σημεῖα, ὡς ἐφ' ἐκείτοις ἐκείνη ἀγνέμεται.

At verò pueris convulsiones fiunt, si febris
fuerit acuta, & venter non egerit, & vigi-
larint, & terrantur, & eiularint, & colorem
mutarint, & viridem siue pallidū, aut liuidū,
aut rubrum contraxerint. Fiunt autem hæc
promptissime quidem pueris nuperrime e-
ditis, vsque ad septimum annum. Seniores
autem pueri & viri non amplius in febribus
corripiuntur convulsionibus, nisi quid ex si-
gnis fortissimis ac pessimis accesserit, qualia
sane in phrenitide fieri solēt. Perituros por-
rò & superstites futuros, tum pueros tum a-
lios ex omnibus signis coniectare oportet,
prout singula de singulis perscripta sunt.

Conuulsio pueris promptissimè euanit, potissimum lactentibus plurimo & intempestiuo alimento utentibus. Cum enim tres sint facultates quibus gubernatur corpus, duabus quidem pueri quam a ijs fortiores sunt, una verò debiliores, quæ in nervis est, & ob eam rem promptissimè conuulsiuntur, sed ab hac conuulsione rursus ad habitum naturæ facillimè redeunt. perfectis autem neq; sic neq; desinit facile conuulsio, propter robur facultatis in nervis: itaq; accidit etiam sine febre conuulsio in forti admodum frigore, & copia humoris crudi crassique, & in inflammatione in nervis ac tendonibus, quoties originem ad consensum agunt. Sed hoc loco de conuulsione docet quæ sit per febrem, quemadmodum initio admonuit se tractare prædictiones in morbis acutis & in aliis quæ ex his decidunt. In pueris ergo conuulsiones indicabunt quæ recensuit signa, vigilia, terrores, eiulatus, colorum mutationes &c. In adultis autem ea quæ maximè in periculosioribus phrenitidibus apparent indicia, & potissimum si partes in vultu peruertuntur, aut dentes strident, aut oculi sunt instabiles, aut distorquentur.

Conualituros autem moriturosque pueros & alios ex omnibus signis coniciemus, in memoria habentes (ne nos augurium nostrum fallat) quòd interdum à multis bonis indiciis unum malum vehemens vincatur, & econtrario unum bonum maxi-

maximum vincatur à multis malis.

Quòd hæ prædictiones sint ex signis quæ apparent in acutis morbis, & Quòd signa omnia expendenda sint, ne ex vngue leonem æstimemus.

CAP. X.

Ταῦτα ἡ λέγω, δείτε τὸ ὄξέων νοσημάτων, καὶ ὅσα ἐν τέτρω γίνεται.

Χρὴ ἡ τὸν μέλλοντα ὁρῶς περιγνώσκειν τοὺς περικομίδες καὶ τὰς ἀποθανεμίδες, ὅσοι σίτε αὐτὸν μέλλει πλεονάζειν ἡμέρας περικομίδειν τὸ νόσημα, καὶ ὅσοι σίτε αὐτὸν ἐλάσσεται, τοὺς σημεῖα ἐμφανίζονται πάντα δυνάμει κερταίνε λογισμὸν τοῦ διατάμει αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους ὥσπερ ἀφ' ἑαυτοῦ πᾶσι δείτε τὸ ἀλλαν, καὶ τῆς ἔρω, καὶ τῆς πύελαν, ὅταν ὁρῶ πύοντε ἀναθήσει καὶ χολῆ.

Χρὴ ἡ καὶ τοῖς φορὰς τῆς νοσημάτων αἰεὶ ἐπιδημιώτων, τοῖς ἑαυτοῦ, πᾶσι τῆς ὥρης καὶ πᾶσι.

Atque hæc & de acutis morbis, & de iis qui ex ipsis fiunt, dico. Qui verò rectè prænoscere volet & superstites futuros & morituros, & quibus per plures dies, & quibus ad pauciores morbus duraturus est, eum signa omnia ediscere & expendere convenit, ita ut vires ipsorum inter se conferendo æstimet, quemadmodum perscriptum est, & de aliis, & de vrinis, & de sputis, ubi simul & pus & bilem agrotus tussiendo reiecerit.

Quin & imperus morborum semper populariter grassantium, citò animaduertere oportet, & temporis constitutionem non ignorare.

Quamvis in his prædictionibus, quadragesimi diei, atque etiam sexagesimi, suppurationumque & aqua intercutem, necnon febris quartana meminere, propositum tamen eius est de acutis dicere tantum, & de iis qui ex acutis decidunt: in quibus omnia (ne uni confidendum esse putes) considerata sunt indicia, non singulorum modò vires aestimanda sunt, sed conferrì naturam eorum inter se oportet, non tantum similitum, verbi gratia, bonorum cum bonis, ac malorum cum malis, sed etiam bonorum cum malis, ac ediuersò: ut sufficienter expensis omnibus, verè de eo quod futurum est pronunciemus. Ceterum indicij morborum ipsorum proprijs censet adijcienda esse ea quæ ex aëris constitutione ducuntur, quæ in Aphorismis breuiter perstrinxit, singulis temporibus superuenientes morbos peculiare, ac cœli dispositionem sequentes, enumerant.

De signis dictum in genere.

CAP. XI.

Εὖ μὲν τεχρὴ εἰδέναι, ὡς τῶν τε κρυφαίων, καὶ τῶν ἄλλων σημείων, καὶ μὴ μανθάνειν, ὅτι ἐν παντὶ ἐπὶ ἑκάστη ὥρῃ, τί τε καὶ κακὸν σημαίνει, καὶ τί χρηστὸν ἀγαθόν· ἐπεὶ καὶ ἐν Λιβύῃ, καὶ ἐν Δήλῳ, καὶ ἐν Σκυδίῃ φαίνεται τὸ πρὸς γεγραμμένα ἀληθύνοντα σημεῖα.

Probè id nosse expedit de cōiecturis certis
& aliis signis, & non ignorare quòd in omni
anno & omni tempore, mala malū, bona bo-
num significant. Nam & in Libya, & Delo, ac
Scythia, præscripta signa vera cōperiuntur.

*Accidentia ex pravis in bona, atq; etiā ex bonis
in mala mutantur. Signa verò nequaquam verti
in contrarium solent, sed magis ac minus aut ma-
lum significare aut bonum: non tamen nunc bo-
num rursus verò malum: aut malum nūc, rursus
verò bonum. Nullum enim bonum ad genus deci-
dit malorū, nec ullum ex his ad genus bonorum,
quoties scilicet cum distinctionibus propriis consi-
derantur. Itaq; quacumq; in urina docuit esse ma-
la signa, hæc haud unquam bona evadent: Et ut
concoctio celerem iudicationem, securam sanita-
tem significat, ita cruditas malum abscessum, aut
non fore iudicationē, aut temporis longitudinem,
aut dolorem, aut mortem, aut horum ipsorum re-
cidivas semper ostendit. Quare signa tū bona tum
etiam mala idem denunciant omni temporis con-
stitutione, si calida, si frigida, si temperata sit: Li-
byam enim tanquam calidā, Scythiam tanquam
frigidam, Delum tanquam temperatā mediamq;
inter utranq; pro exemplo commemoravit.*

Quòd sciens & memoria valens rarò fal-
litur in præfagiis.

CAP. XII.

Εξ ὧν καὶ εἰδέναι, ὅτι ἐν τῇ φύσει αὐτῶν οὐκ ἔστι τι καὶ ἄλλο

εἰ δὲν δυνόν, τὸ πολλὰ πλάσια, αὐτὸ ἐπιτυχάνειν,
 ὡς ἐκμαθὼν ἡς αὐτὸ κείνῃ τε καὶ λογίζεσθαι ὁρῶς
 ἐπίσηται.

Sciendū est minimè difficile esse, in his ipsis
 regionib. posse aliquē pleraq; ex ipsis assequi,
 si memoria tenēs ipsa rectè expendere sciat.

*Alter altero peritior est in cuiuslibet rei præsenti-
 sione: Nunquam enim hallucinari supra captum
 hominis est, sed quàm maximè aberrare solius est
 est artificis. Quare eius qui vires indiciorum ex-
 actè edidicerit, prædictiones erunt irrita valde pau-
 ca, rata verò quàm plurima.*

Quòd in omnibus morbis acutis fiant ex
 his signis prædictiones. CAP. XIII.

Ποτέν γ' ἔτι εἰ δυνὸς νοσήματι ὄνομα ὅ, ἡ μὴ
 πυγχαίη ἐν ταῖς γεγραμμένον πάντα γ' ὁρῶσι ἐν
 τοῖσι χρόνοις τοῖσι περὶ γεγραμμένοις κείνεται,
 γνώση τοῖσιν αὐτοῖσι σημείοισιν.

Cæterum nullius morbi nomen deside-
 rare oportet quòd hîc non est ascriptum: Om-
 nes enim qui in prædictis temporibus iu-
 dicantur, ex iisdem signis cognosces.

*In hac disputatione quæ instituta est de morbis
 acutis, & aliis qui ex illis fiunt, omnes complexus
 est, hos quidem nominatim qui præceptis egebant
 propriis, alios autem sub signis communibus in-
 telligi voluit.*

Prænot. Hippocratis finis.

INSL

INSIGNIORES ALIQVOT
sententiæ selectæ ex libris Aurelij Cor-
nelij Celsi medici inter Lati-
nos eloquentissimi.

EX PRIMO.

1 *Vt alimenta sanis corporibus Agricultura,
sic sanitatem agris Medicina promittit.*

2 *Desidia atq; luxuria, hæc duo prius in Græcia
corpora vitiarunt, deinde apud nos affligerunt.*

3 *Sanus homo, qui & benè valet, & sua spon-
tis est, nullis obligare se legibus debet, ac neq; me-
dico, neque alijs egere. Hunc oportet varium ha-
bere vitæ genus, modo ruri esse, modo in urbe, sa-
piusq; in agro, nauigare, venari, quiescere inter-
dum, sed frequentius se exercere. Siquidem igna-
uia corpus hebetat, labor firmat, illa maturam
senectutem, hic longam adolescentiam reddit.*

4 *Eum rectè curaturum esse dicunt, quem pri-
ma origo causa non fefellerit.*

5 *Alij putant interesse non quid morbum faci-
at, sed quid tollat.*

6 *Morbos non eloquentia sed remedijs curari.*

7 *Nam ne agricolam quidem, aut gubernato-
rem disputatione, sed usu fieri.*

8 *Cuius rei non est certa cognitio, eius opinio
certum remedium habere non potest: Verum est
quod ipsam curandi rationem nihil plus consert
quàm experientia.*

9 Neque ignorare medicum oportet quæ sit agri natura: humidum magis, an magis siccum corpus eius sit, validi nervi an infirmi, frequens valetudo an rara, eaque cum est, vehemens esse soleat an lenis, brevis an longa.

10 Interest enim an fatigatio morbum, an sitis, an frigus, an calor an vigilia, an fames fecerit, an cibi viniq; abundantia, an intemperantia libidinis.

11 Cum par scientia sit, tamen utiliore medicum esse scias amicum, quam extraneum.

12 Bæ in die cibum capere, potius quam semel, potest homo, & semper quam plurimum, dummodo hunc concoquat.

13 Concubitus neq; nimis concupiscendus, neq; nimis pertimescendus est: rarus, corpus excitat, frequens soluit. Cum autem frequens non numero sit, sed natura, ratione ætatis & corporis, scire licet eum non inutilem esse, quem corporis neque languor neque dolor sequitur.

14 Cauendum, ne in secunda valetudine aduersa præsidia consumantur.

15 Imbecillis stomacho, quo in numero magna pars urbanorum, omnesq; penè cupidi literarum sunt, obsecratio necessaria est, ut quod corporis vel loci vel studij ratio detrahit, cura restituat. Ex his igitur qui benè concoxit, manè tutò surget: qui parùm, quiescere debet: & si manè surgendi necessitas fuerit, redormire: Qui non concoxit ex toto
conquiescit.

conquiescere, ac neque labori se, neque exercitatio-
ni, neque negotio credere.

16 Scire licet integrum corpus esse, cum quotidie
manè urina alba, dein ruffa est: illud concoquer-
e, hoc concoxisse significat.

17 Si lucubrandum est, non post cibum facere,
sed post concoctionem.

18 Post satietatem nihil agendum.

19 Quem interdum vel domestica vel ciuilia offi-
cia tenuerunt, huic tempus aliquod seruandum cu-
rationi corporis est. Prima autem eius curatio ex-
ercitatio est, quæ semper antecedere cibum debet: E-
xercitationis autem modus & finis esse debet sudor,
aut certe lassitudo quæ citra fatigationem sit.

20 Nunquam utilis est nimia satietas. Sæpe in-
utilis nimia abstinentia. Sæpe si qua intemperantia
subest, durior est in potu quàm in esca.

21 Secunda mensa bono stomacho nihil nocet,
in imbecillo coacescit.

22 Vbi expleus est aliquis, facilius concoquit: si
quicquid assumpsit, portione aqua frigida includit,
tum paulisper inuigilat, deinde benè dormit.

23 Cum quis mutare aliquid volet, paulatim
debebit assuefcere.

24 Neque ex salubri loco in grauem, neq; ex gra-
ui in salubrem transitus satis tuus est.

25 Neque uerò ex multa fame nimia satietas,
neque ex nimia satietate famis: donec est.

26 Neque ex nimio labore, subitum otium, neq;

ff

ex nimio ocio subitus labor sine noxa est.

27 Periclitatur & qui semel & qui bis die cibum incontinenter contra consuetudinem assumit.

28 Quod contra consuetudinem est, nocet, seu molle seu durum est.

29 Nimis ociosa vita utilis non est, quia potest incidere laboris necessitas.

30 Illud nosse oportet, quod ex labore sudanti frigida potio perniciosissima est, atque etiam cum sudor se remisit, itinere fatigatis inutilis.

31 Vomitus inutilis est gracilibus & imbecillum stomachum habentibus: Utilis est plenis & biliosis omnibus, si vel nimium se replerunt, vel parum concoxerunt. Nam siue plus est quam quod concoqui possit, periclitari ne corrumpatur non oportet: Si vero corruptum est, nihil commodius est quam id, quod via primum expelli potest, eijcere.

32 Deiectio autem medicamento petenda est, ubi venter suppressus parum reddit, ex eoque inflammationes, caligines, acutis dolores, aliaque superioris partis mala crescunt.

33 Sed purgationes quoque, ut interdum necessariae sunt, sic ubi frequentes sunt, periculum afferunt. Assuescit enim non aliud corpus & ob hoc infirmum erit, cum omnibus morbis obnoxia maxime infirmitas sit.

34 Vinum dilutius pueris, meracius senibus conuenit.

35 Hyeme plus esse conuenit, minus, sed meracius, bibere. At Vere paulum cibo demendum, adiciendumque

dumque potioni, sed dilutius tamen bibendum est. *Æstate* ut sapius utendum cibo, sic exiguo est. Per *Autumnum* propter celi varietatem periculū maximum est, itaque neque sine veste neque sine calciamentis prodire oportet: Cibo verò iam pleniore uti licet, minus, sed meracius bibere.

36 *Venus Hyemen* non perniciofa, *Vere* tutissima: neque *Æstate* verò neque *Autumno* utilis est, tolerabilior tamen per *Autumnum* est. *Æstate* in totum, si fieri potest, abstinendum.

EX SECVNDO.

1 *Saluberrimum Ver* est, proximò deinde ab hoc *Hyems* periculosior *Æstas*, *Autumnus* longè periculosissimus. Ex tempestatibus optima æquales sunt siue frigida siue calida: Pessima qua variant maxime: Quo sit ut *Autumnus* plurimos opprimat.

2 *Saluberrimi* sunt sereni dies: meliores pluvij, quàm tantum nebulosi, optimi q̃ *Hyeme* qui omni vento vacant: *Æstate*, quibus fauonij perflant. Si genus aliud ventorum est salubriores septentrionales quàm subsolani vel austrini sunt.

3 *Ventus* ubique ferè à mediterraneis regionibus veniens salubris, à mari gravis.

4 *Ætas* media tutissima est, qua neque iuventa calore, neque senectutis frigore infestatur.

5 Longis morbis senectus, acutis adolescentia magis patet.

6 *Corpus* autem habilissimum, quadratum est, neque gracile neque obesum: Nam longa statura, ut in

iuuenta decora est, sic matura senectute conficitur:
Corpus gracile, infirmum: sic obesum, hebes est.

7 Facile securus est aliquis in iis quae saepe sine
periculo euasit.

8 Si speciosior & plenior aliquis & coloratior fa-
ctus est, suspecta habere bona sua debet: quia quia
neque in eodem habitu subsistere, neque ultra progredi
possunt. ferè retrò quasi ruina quadam reuoluuntur.
Peius tamen signum est ubi aliquis contra consue-
tudinem emarcuit, & decorè coloremque amisit, quo-
niam in his quae superant, est quod morbus demat: in
his quae desunt, non est quod ipsum morbum ferat.

9 Mali morbi testimonium est vehementer &
crebro spirare.

10 Vomitus syncera pituita vel bilis periculo-
sus, peiorque si viridis aut niger est. At mala urina
est in qua sive sident subrubra aut liuida, deterior
in qua quasi si qua quadam tenuia atque alba, pessima
ex his si tanquam ex furfuribus factas nubeculas
repraesentat: diluta quoque alba vitiosa est, sed in
phreneticis maximè. Alius autem mala ex toto
suppressa. Periculosa etiam quae inter febres fluens,
conquiescere hominem in cubili non patitur, utique
si quod descendit, est perliquidum, aut albidum, aut
pallidum, aut spumans. Item quod excernitur ma-
lum est, exiguum, glutinosum, liuidum, biliosum,
cruetum: aut peioris odoris quam ex consuetudine,
malum est & syncerum. Urina verò rubra & tenuis
in magna ciuitate esse conuenit: Pessima tamen
prae-

puerq; mortifera, nigra, crassa, mali odoris. Alius quoque varia & discreta reddens, pestifera est: Sed agrum in precipiti iam esse denunciat, quæ liquida, eademque vel nigra vel pallida, vel pinguis est, utique si magna fœditas odoris accessit.

11 Omne auxilium corporis aut demit aliquam materiam aut adiicit, aut euocat aut reprimat, aut refrigerat aut calfacit, aut durat aut mollit.

12 Sanguinem incisa vena mitti nouum non est: sed nullum penè morbum esse in quo non mittatur, nouum est.

13 In mittendo sanguine non tam annos medicus numerare, quàm vires agrotantis estimare debet.

14 Tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat.

15 Satius est anceps experiri auxilium, quàm nullum.

16 Si morbi ratio patitur, sanguinis detractioni tempus aptissimum est dies aduersa valetudinis secundus aut tertius. Sed ut aliquando etiam primo die sanguinem mittere necesse est, sic nunquam utile post diem quartum est, cum iam spacio ipso materia & exhausta est & corpus corrumpit, ut detra-ctio imbecillum id facere possit, non possit integrum.

17 Quod si vehemens febris urget, in ipso impetu sanguinem mittere, hominem iugulare est. Expectanda ergo remissio, & ista medicina ferè in bi-duum diuidenda: Satius enim est primò lenare agn, deinde perpurgare, quàm simul omni vi effusa fortasse precipitare.

18 Cùm sit crudo minimè mittendus sanguis, tamen ne id quidem perpetuum est, neque enim semper concoctionem res expectat: Nam si ex altiore loco decidit aliquis, si confusus est, si ex aliquo subito casu sanguinem vomit, quamvis paulò antè sumpsit cibum, tamen protinus ei materia demenda est: idemq; etiam in aliis repentinis casibus dictū sit.

19 Mittere autem sanguinem cùm sit expeditissimum, usum habenti, cum ignaro difficillimum est, iuncta est enim vena arteriis, his nervi: Ita si nervum si alpellus attigit, sequitur nervorum distentio ea qua crudeliter hominem consumit: At arteria incisa neque coit, neque sanescit, interdum etiam ut sanguis vehementer erumpat efficit.

20 Incidenda ad medium vena est, ex qua cùm sanguis erumpit, colorem habitumq; eius oportet attendere: Nam si is crassus & niger est, vitiosus est, ideoque utiliter effunditur: Si rubet & pellucet, integer est, eaq; missio sanguinis adeò non prodest, ut etiam noceat, protinusq; is supprimendus est.

21 Semper antè finis faciendus est quàm animà deficiat.

22 Vehementi malo nisi aequè vehemens auxilium succurrere non potest.

23 Medicamentum non semper agris prodest, nocet semper sanis.

24 Initia morborum primum famē sitimq; desiderant: ipsi deinde morbi, moderationem, ut neq; aliud quàm expedit, neq; eius ipsius nimium sumatur.

Neque

Neq; enim conuenit iuxta mediam protinus satietatem esse. Quod si sanis corporibus etiam inutile est, ubi aliqua necessitas famem fecit, quanto inutilius est in corpore agro? Neque ulla res magis adiuvat laborantem, quàm tempestiua abstinentia.

25 Plus alimenti est in carne quàm in ullo alio cibo.

26 Brassica subcruda aluum mouet, bis cocta stringit.

EX TERTIO.

1 Natura repugnante nihil medicina proficit. Magis tamen ignoscendum medico est parum proficienti in acutis morbis quàm in longis. hinc enim breue spaciū est, intra quod, si quod non profuit auxilium, ager extinguitur: ibi & mutationi remedium & deliberationi tempus patet, ad id ut raro, si inter initia medicus accessit, obsequens ager senne illius vitio pereat.

2 Illud ignorari non oportet, quod non omnibus agris eadem auxilia conueniunt.

3 Oportet itaq; ubi aliquid non respondit, non tanti putare auctorem quanti agrum, & experiri aliud atque aliud.

4 In acutis morbis serius ager alendus est, ut primo dempta materia impetum frangat. In longis maturius, ut sustinere spaciū affecturi mali possit.

5 Multum interest ab initio quis recte curatus sit, an perperam: quia curatio minus his prodest in quibus assidue frustra fuit.

6 Omnium optima sunt quies & abstinencia: solâque abstinencia sine ullo periculo medetur.

7 Nsn dubium est quin vix quisquam, qui non dissimulavit, sed per hac maturè morbo occurrit, agrotet.

8 Asclepiades officium esse medici dicit, ut tuiò, ut celeriter, ut incunde curet, id votum est, sed ferè periculosa esse nimium & festinatio, & voluptas solet. Qua verò moderatione utendum sit ut quantum fieri potest omnia ista contingât, quaritur qua ratione primis diebus ager continendus sit. Antiqui medicamentis quibusdam datis concoctionem moliebantur, eò quòd cruditatem maximè horrebant. Deinde eam materiã qua ledere videbatur, ducendo sæpius aluum subtraherent. Asclepiades medicamenta sustulit: aluum non toties, sed ferè tamen in omni morbo subduxit. Febre verò ipsa infestante se remedio hoc uti professus est: conuellendas enim vires agri putavit, hunc, vigilia, siti ingenti, sic ut ne os quidè primis diebus elui sineret. Quo magis falluntur qui per omnia incundam eius disciplinam esse contendunt. Is enim ulterioribus quidem diebus cubantis etiam luxuria subscripsit, primis virò tortoris vicem exhibuit. Ego autem medicamentorum dari potiones & aluum duci non nisi rarò debere concedo. Et id non ideo tamen agendum, ut agri vires conuellantur existimo: quoniam ex imbecillitate summum periculum est. Minui ergo ratiõem exuperantem materiam oportet, qua naturaliter digeritur.

digeritur ubi nihil novi accedit. Itaq; abstinendum à cibo primis diebus, in luce habendus ager, nisi infirmus interdum est, isq; cubare quam maximo con- clavi debet. Quod ad sitim vero somnūq; pertinet, moderandum id est, ut interdum vigilet, noctu, si fie- ri potest, conquiescat: ac neq; poterit, neq; nimirū siti crucietur. Os etiam eius elui potest, ubi & siccu est & ipsi faetet, quamvis id tempus aptū porioni non est: Comodeq; Erasistratus dixit, saepe inferiore par- te humorem non requirente, os & fauces requirere.

9 Optimum medicamentum est opportunè cibum datus, qui quando primum dari debeat ambigitur, alijs quintum diem, alijs sextum expectantibus. Asclepiades ubi agrum triduo per omnia fatigarat, quarto die cibum indulgebat. At Themison non quando coepisset febris, sed quando desisset aut cer- tē leuata esset, & ab illo tempore expectato die ter- tio cibum dabat. Nihil autem horum utiq; perpe- tuum est: nam potest primo die dari, potest secundo, potest tertio, potest non nisi quarto aut quinto, po- test post unam accessionem, potest post duas, potest post plures. Refert enim qualis morbus sit, quale corpus, quale cœlum, quæ ætas, quod tempus anni: minimeq; in rebus multum inter se differentibus perpetuum esse præceptum temporis potest.

10 Illud est unum semper & ubiq; seruandum, ut agri vires subinde assidens medimur inspicat, & quandiu supererunt, abstinencia pugnet: Si imbe- cillitatem vereri coeperit, cibo subueniat. Id enim

eius officium est, ut agrum neque superuacua materia oneret, neque imbecillitatem fame perdat.

11 Antiquos admodum celebres Pythagorici numeri fefellerunt, cum hic medicus non numerare dies debeat, sed ipsas accessiones intueri, & ex his coniectare quando cibus dandus sit.

12 Ab uno medico plures sanari non possunt.

13 Scire oportet optimū cibo tēpus esse febre finita.

14 Cum agros semper securos agere conveniat, ut corpore tantum non etiam animo laborent, tum precipue ubi cibum sumpserunt: itaq; si qua sunt quæ exasperatura sunt eorum animos, optimum est ea dum agrotant eorum notitia subtrahere.

15 Periti medici est non protinus, ut venit, apprehendere manus brachium, sed primum residere hilari vultu, percontariq; quemadmodum se habeat: & si quis eius metus est, eum probabili sermone lenire: tum deinde eius corpori manum admoovere.

16 Medicus neq; in tenebris neq; à capite agri residere debet, sed illustri loco aduersus eum, ut omnes notas ex vultu quoque cubantis perspiciat.

17 Ponendi sunt agro varij cibi, sicut Asclepiades precepit, tum demum ubi fastidio urgetur, neq; satius vires sufficiunt, ut paulum ex singulis degustando famem vitet. At si neq; vis neq; cupiditas deest, nulla varietate sollicitandus ager est, ne plus assumat quam concoquat. Neq; verum est quod ab eo dicitur, facilius cōcoqui varios cibos: eduntur enim facilius, ad concoctionem autem materia genus & modus pertinent.

18 Ne-

18 Neque inter magnos dolores, neque incremente morbo tutum est egrum impleri cibo, sed ubi inclinata iam in melius valetudo est.

19 Id quoque videndum est quod quidam solum precipiunt, an astrictum corpus sit, an profluat. Nam si astrictum est, ducenda alvus est, movenda urina, eliciendus sudor: contra si profluat, sudor coercendus, quies adhibenda erit, tenebris somnoque quodcumque volet utendum, non nisi levi gestatione corpus agitandum, & pro genere mali subveniendum.

20 In febre pestilente minimè utile est aut fame aut medicamenti uti, aut ducere alvum. Si vires sinunt, sanguinem mittere optimum est, precipueque si cum dolore febris est.

21 Non facile sanguinem mittere, non facile ducere alvum, non cruciari vigilia fameve, aut nimia siti, non vino curare sat convenit.

22 Cum verò in summo incremento morbus est, utique non ante diem quartum magna siti antecedente, frigida aqua copiosè prestanda est, ut bibat etiam ultra satietatem: & cum iam venter & praecordia ultra modum repleta sunt satisque refrigerata, vomere debet. Quidam ne vomitum quidem exigunt, sed ipsa aqua frigida tantum ad satietatem data pro medicamento utuntur. Vbi utrumlibet factum est, multa veste operiendus est & collocandus ut dormiat, fereque post longam suam & vigiliam, post multam satietatem, post infractum calorem, plenus somnus venit, per quem ingens sudor effunditur: idque

praesentissimum auxilium est: sed in his tamen in quibus praeter ardorem nulli dolores, nullus precordiorum tumor nihil prohibens vel in thorace, vel in pulmone, vel in faucibus, non ulcus, non defectio, non deiectio, non profluvium alui fuit.

23 Est etiam observatio necessaria qua quis in pestilentia utatur adhuc integer: cum tamen securus esse non possit: Tum igitur oportet peregrinari, navigare, gestari, ambulare sub diuo ante aestum leviter, vitare fatigationem, cruditatem, frigus, calorem, libidinem: multoq; magis se continere si qua gravitas in corpore est, tum neq; mane surgendum, neq; pedibus nudis ambulandum est, non vomendum, neq; movere da alius, neque etiam si mota est per se comprimenda: abstinendum potius, itemq; vitandum balneum, sudor, meridianus somnus, vique si cibus antecessit, qui tamen semel die commodius assumitur, insuper etiam modicus, ne cruditatem moveat. Alternis diebus invicem modò aqua, modò vinum bibendum est. Quibus servatis, ex reliqua victus consuetudine quàm minimum mutari debet.

24 Sed cum eadem omnibus convenire non possunt, ferè quos ratio nõ restituit, temeritas adjuvat.

25 Sepe etiam pertinacias iuvantis, malum corporis vincit.

26 Quartana febris neminem iugulat, vetus quartana raro nisi Vere soluitur.

27 Si quartana quævit diu, meminisse eius dici convenit, eoque vitare frigus, calorem, cruditatem, lassitudinem.

lassitudinem, facile enim reuertitur nisi à sano quoque aliquandiu timeretur.

28 Est qui fugiens horrorem febrilem ante accessionem utiliter edat allium, aut bibat aquam calidam cum pipere, siquidem ea quoque assumpta calorem mouent qui horrorem non admittit.

29 Ex phreneticis alij hilares, alij tristes sunt, alij facilius continentur & intra verba desipiunt, alij consurgunt & violenter quedam manu faciunt, atq; ex his ipsis alij nihil nisi impetu peccant, alij etiam artes adhibent, summam q; speciem sanitatis in captandis maiorum operum occasionibus prebent, sed exitu deprehenduntur. Ex his autem eos qui intra verba desipiunt, aut leuiter etiam manu peccant, onerare asperioribus coërcitionibus superuacuum est: eos verò qui violentius se gerunt, vincire conuenit, ne vel alteri vel sibi noceant. Neq; credendum est si vincetus aliquis dum leuari vinculis cupit, sanum iam se fingat, quamuis prudenter & miserabiliter loquatur, quoniam is dolus insanientis est. Aduersus omnium sic insanientium animos gerere se pro cuiusque natura necessarium est.

30 Asclepiades perinde esse dixit his sanguinem mitteri, ac si trucidentur, rationem hanc sequutus, quòd neque insania esset nisi febre intentata, neque sanguis nisi in remissione eius rectè mittere ur.

31 Omnis sic affectus somnus & difficilis & precipue necessarius est sub hoc enim plerumq; su nescunt.

Somnus illi medicamentis accerendus, quæ so-

porifera sunt, habita scilicet eadem moderatione qua hic necessaria est, ne quem obdormire volumus, excitare postea non possimus.

32 Neque ignorare oportet leniorem esse morbum cum risu quam serio insanientium.

33 Aqua inter cutem tres species sunt: his communis est humoris nimia abundantia, ob quam ne ulcera quidem in his agris facile sanescunt.

34 Facilius in seruis quam in liberis tollitur hydropisis, qui cum desideret famem, sitim, mille alia tadia, longamque patientiam, promptius his succurritur qui facile coguntur, quam quibus inutilis libertas est. Sed ne hi quidem qui sub alio sunt, si ex toto sibi temperare non possunt, ad salutem perduntur. Ideoque non ignobilis medicus Chrysippi discipulus apud Antigonum regem amicum quandam eius nota intemperantia, mediocriter eo morbo implicitum, negavit posse sanari. Cumque alter medicus Epirotes Philippus se sanaturum polliceretur, respondit illum ad morbum agri respicere, se ad animum. Neque eum res fefellit. Ille enim cum summa diligentia non medici tantummodo sed regis custodiretur, tamen malagmata sua deuorando, bibendoque suam urinam, se precipitauit.

35 Inter initia non difficillima curatio est, si im-perata sunt quies, siccus, inedia. At si malum inueterauit, non sine magna molestia discutitur.

36 Multum ambulandum, currendum aliquando est, superiores maxime partes sic perfricanda ut
spiri-

spiritū ipse continet, euocandus est sudor non exercitatione tantummodo, sed etiam in arena calida, vel laconico, vel libano, similibusq; alijs, maximeq; utiles naturales & sicca sudationes sunt, quales super Baras habemus in myrtetis. Balneum atque omnis humor alienus est.

37 Potio non ultra danda est quàm ut vitam sustineat, optimaq; est quæ urinam mouet.

38 Non alienum erit metiri portionē hydropici & urinam: nam si plus humoris excernitur quàm assumitur, ita demum secunda valetudinis spes est.

39 Qui de phthisi dubitant an sit, hac nota vtuntur: Quod excreatum est si in ignem impositum mali odoris est.

40 Lac quod in capitis doloribus & in acutis febribus pro veneno est, in phthisi tamen sicut in omnibus longis difficilibusq; febriculis rectè dari potest.

EX QVARTO.

1 Vno die fluere aluū saepe pro valetudine est, atq; etiā pluribus, dum febris absit, & intra septimum diem cōquiescat: Purgatur enim corpus, & quod intus laesurū erat, utiliter effunditur. Verū spatium periculosum est: interdū enim tormina & febriculas excitat, viresq; consumit: interdū autem euenit ut id neglectum pluribus diebus curari difficillimum sit.

2 Medicamentis uti nisi in vehementibus malis superuacuum est.

3 Podagricis equitare alienum est.

4 Quibus arthriticorum dolor certis temporibus re-

uertitur, hos à curioso victu cauere oportet, ne inutilis materia corpori supersit.

EX QVINTO.

I Medicamentorum vsum magna ex parte Asclepiades non sine causa sustulit, cum omnia ferè stomachum ledant, maliq; succi sint: ad ipsius victus rationē potius omnem suam curā transtulit. Verūm ut illud in plerisq; morbis utilius est, sic multa admodū corporibus nostris incidere consueuerunt, quae sine medicamentis ad sanitatem peruenire non possunt. Illud ante omnia scire conuenit, quod omnes medicinae partes ita innexae sunt, ut ex toto separari non possint, sed ab eo nomen trahāt à quo plurimū petūt. Ergo ut illa quae victu curat, aliquādo medicamentū adhibet sic illa quae precipuè medicamentis pugnat, adhibere etiam rationem victus debet, quae mutū admodū in omnibus malis corporis proficit.

2 Vti somniferis nisi nimia necessitas urget, alienum est: sunt enim ex vehementibus medicamentis & stomacho alienis.

3 Est prudentis hominis primum eum qui seruari non potest, non attingere, ne videatur occidisse quem sors ipsius peremit. Deinde ubi grauis metus est, sine certa tamen desperatione, indicare necessarijs periclitantis in difficili rem esse, ut si victa ars malo fuerit, vel ignorasse vel fefellisse nō videatur. Sed ut haec prudenti viro cōueniunt, sic rursus hystriionis est paruam rem attollere, quod plus praestitisse videatur.

4 Dubia spes certa desperatione est potior.

FINIS.



INDEX

RERVM ET VOCVM HOC

volumine memorabilium, cuius prior numerus sectionem, posterior aphorismum indicat: p verò praefixum, praenotiones significat, tum prior litterarum, posterior caput denotat.

- A** Bdominis vis in confert somnus 2. r
iuuanda conco- Accessiones si eandem
ct. one sect. 2. 35
Abortus periculum à semper horam serua-
missione sang. item ab uerint, febrem lon-
alui fluore 3. 30 gam fore portendunt
Abortus periculum à 4. 30
gracilitate mamma-
rum 5. 37
Abortioni quo tempo- Accessionibus singulis
re obnoxia mulier 5. febres solutæ cur sub-
44. 45 inde reuertantur 4. 61
Abscessus in febribus 4. Acetabula seu Cotyle-
31 dones 5. 45
Abscessus à lassitudine Acidus ructus 6. 33
ibid. Acuti morbi 2. 19
Abscessu finiuntur mor- Acutis quando medi-
bi longi 4. 74 candum 4. 10
Abscessus boni vel mali Aegrorum de salute
cognitio p. 2. 12 quando benè fieran-
Abstinentum in acces- dum 2. 32. 33
sionibus 1. 11
Accessionum initio non Aetri decubitus conue-
niens p. 15
Aetati aliquid condo-
nandum 1. 17
Aetatum morbi 2. 34. 39
G g

INDEX.

Alimentum	trifariam	Austrinz constitutionis
dicitur	5.39	noxę
Alopecia	6.34	Autumnus
in Alui profluuijs mu-		infalubris
tationes excremen-	3.9	
torum iuuant	2.14	B
Alui profluuium superue-		Albi alui profluuium
niens vomitus utilis		cur obnoxij
6.15		6.32
Angina	3.16. & p. 3.5	Balneum quibus febr-
Animi defectio mensu-		bus conuenit
ra euacuationis	1.23	7.44
Aphoristica doctrina		Biliosum acutos mor-
quę	1.1	bos operatur
Apoplexia	6.57	7.32
Aqua optima quę	5.26	C
Aqua inter cutem	6.35.	Calor innatus, & ca-
p. 2.1		lor febrilis
Ascites	4.11	1.14
Aquilonia constitutio		Calor natiuus omnium
3.5		operationum autor
Articulorum tumores		1.15
5.25		Calidi vsus immodicus
Ars imitatur naturam		5.16
1.2		Calidi officium
Afflueta etsi deteriora		5.22
sint, insuetis minus		Calculi causa
molestant	2.50	3.26
Atre bilis ab humore		Calculi nota vrina are-
melancholico discrim-		nosa
men	4.23. 6.53	4.79
Asthma	4.26	Calui
Auerſio quid	5.69	6.34
		Cancro occulti
		6.38
		Capitis dolor
		5.69. & 6.
		10.51
		Capitis dolor & fau-
		cium cum febre p. 3.4
		2.1
		Caros
		Cardia, Cardialgia, Car-
		diognos
		4.65
		Cardaca syncope
		2.41
		Cata-

INDEX.

- Catalepsis, Catoche 2.3
 Causæ morborum per contraria curantur 2. 22.45
 Cerebri concussio 7.60
 Cerebro vulnerato quid contingit 6.50
 Coma 2.3
 Comitialis morbus 2. 45.& 5.7
 Conceptus impedimenta 5.46
 Conceptus signa 5.41. 42.60
 Concocta medicari 1.22
 Constitutionem morbi considerare, quid 1.12
 Consuetudinis vis 1.17. & 2.49.50
 Convalescētium & moriturorum signa p.3.2
 Convulsio quid 5.1
 ex Convulsione signa 2. 26.& 4.57.& 5.1.2
 Cordis motus velox & morfus 4.65
 Cor proprio affectu laborans 2.41
 Corpus repente mutare, periculosum. vide errata.
 Corpus molle æqualiter & calidū, bonum p.2.1
 Coxendicium dolor 6.59
 Crassi citius intereunt 2. 44
 Crisis 1.20
 Crisis & Criticorum dierum ratio 2.13.25. 24.& p.3.1
 Crudus humor medicamento non obedit 1. 22.& 2.29.30
 Cubare in ventrem quid significet p.1.6
 Cutis densa vel laxa in morituris 5.72
 Cyananche minus periculosa 4.44
 D
 Declinantis ætatis morbi 3.31
 Deficientes animo 2.41
 Defectio animi 5.57
 Decretiorum dierum ratio p.3.2
 Deiectiones nigræ, & deiectio hominis sani 4. 21
 Deiectiones synceræ 7. 24
 Deiectionum bonarum & malarum genera p. 2.4
 Dentium stridor quid significet p.1.7
 Gg 2

INDEX.

Desipientia	6.53	Erysipelas in ossis denu-	
Difficultas intestinorū		datione	7.19
seu dysenteria	6.3	Eschara	7.13
Desperari non sunt at-		Euacuatio cuius humo-	
tingendi	2.29 30	ris facienda	1.2
* Distillationes senibus	3.	Euacuatio omnium hu-	
31		morum aequaliter fit	
Distillationes, unde	5.24	per venæ sectionem	
Dies intercidentes, iu-		2.17.8.& 6.47	
dices & indices	2.24	Euacuandum vsque ad	
Difficultas spirandi	4.50	animi deliquiū quan-	
Difficultas urinae	6.36	do	1.23
Difficultas intestinorum		Euacuatio immodica	
in lienosis	6.43	periculosa	1.3
Distentio seu Tetanus		Euacuatio quā ducenda	
4.57		1.21	
Diuinū in morbis quid		Eunuchi	6.28
p.1.1		Excretiones corporis	7.
Doloris species	6.5	84	
Dolor dolorem obscu-		Excretiones in febris	
rat	2.46	4.47	
Dolor quid	2.6	Eruptio sanguinis à do-	
Dysenteria unde	4.24	lore capitis	p.3.4
E		Experimentum cui pe-	
Elleboro purgādi	4.13	riculosum	1.8
Emmotum quid, &		F	
eius vsus	5.47	Fames canina	2.21
Epilepsia	5.7	in Fame laborandum	
Error in victu	1.5	non est	2.16
Erysipelas in muliere		Fames siccit	7.61
grauida	5.43	Fastidium cibi in mor-	
Erysipelas	5.33	bis	7.6
Erysipel. verti foras	6.25	Fauces inflammatione	
		labo-	

INDEX.

- laborantes p.3.5
 Febris 1.16
 Febrem conuulsioni su-
 peruenire melius 2.26
 Febres diariæ 4.55
 de Febribus 2.25.26.28.
 & 4.30.31.34.35.36.37.
 43.44.45.46.47.48.
 49.50.51.52.53.54.55.
 56.58.59.60.61.62.63.
 64.65.66.67.68.69.70.
 & 5.71. & p.3.1
 Febris quibus morbis
 confert 6.44
 Fœcundæ quæ sunt, &
 quæ non 5.63
 Frigidi incommoda 5.
 17.18.20.24
 Frigidæ aquæ perfusio
 conuulsioni remedio
 est 5.21
 Frigiditas partium ex-
 tremarum 4.42. & 7.1
 Furores cur Vere 3.20
 G
 Gibbositas 6.46
 Graciles quomodo
 purgandi 4.6
 Grauidarum affectus 4.1
 Grauitas debilitatis est
 indicium p.2.1
 Grauedines & rauedi-
 nes senes comitantur
 ad mortem 2.40
 Gurgulionem secare est
 periculum 3.6
 H
 Habitus Athletarum 1.3
 Hamorrhoides 6.11
 Hepatis dolori febris
 superueniens 7.54
 Hepar aqua plenū 7.57
 Hydropis causa p.2.1
 Hydrops 6.8
 Hydropisim præceden-
 tia signa 4.11
 Hyemales morbi 3.23
 Hyeme ventres calidio-
 res 1.15
 Hyemales medicationes
 4.4
 Hypochondria inflata &
 murmurantia quid
 portendant 4.73
 Hypochondrijs inflatis
 lac noxium 5.65
 Hypochondria quæ sa-
 lubria & quæ non p.
 1.12. & 13
 Humidum citius nutrit
 2.11
 Humor in corpore a-
 bundantis signa 1.2
 I
 Icterus ab hepatis ob-
 structione 6.42
 Gg 3

INDEX.

Icterus febri superue- niens	4.62	Indicatorij dies	p.3.1
Iecoris dolores	7.54	Indicationes in mulie- ribus à partu	p.3.3
Ileos, vel Iliaca passio 6. †4		iudicium	1.1
Ieiunium qui facile fe- runt	1.13	Iuuenum morbi	3.29
Immodicum omne pe- riculosum	1.3	L	
Infantium morbi	3.24	Lac mulieris quæ nec grauida est nec pe- perit	5.39
Indicationes à morbo & viribus	1.17	Lac quibus prodest & quibus nocet	5.65
Indices dies qui, item intercidentes	2.24	Lacrymæ non volunta- riæ in morbis quid si- gnificent	4.52. & p.14
Indicia singula confide- randa, nec vni confi- dendum	4.52	Lassitudo	2.5
Inflamatio vesicæ p.2.14		Lassitudinis remedium quies	2.48
Inflammationis ad pus transmutatio	p.1.13	Laternum dolores	3.23. & 3.5
Innatus calor omnium operationū autor	1.15	Lentor dentium in fe- bre	4.53
Infantia soluitur varici- bus aut hæmorrhoi- dibus	6.21	Lepræ quando fiât	3.20
Intestinatorum vulnus	6. 13.24	Letargica passio	2.3. & 3. 30.23
Intestinatorum difficul- tas ab atra bile lethali	4.24	Leuitas intestinorū seu lienteria	4.12. & 6.1
Indicationis perfectæ si- gna	1.10	Leucophlegmatix solu- tio	7.30
Iudicatio	p.3.1	Lienes magni	3.21
		Lienosi qui	6.43
		Linamentum	5.47
		Lippitudines	quando 3.11.12
		fiant	Lippi-

INDEX.

Lippitudo alui proflu-
uio tollitur 6.17

Loca conferentia eua-
cuationibus 1.21

Longi morbi signa 4.40

Lumbrici 3.26

Lucem refugientes o-
culi p.1.4

M

Magnitudo corporis
quibus utilis. *vide*
errata.

Manuum gesticulatio
quid significet p.1.9

Medicamenta sanis 2.36

Medicationes sub Cane
difficiles 4.5

Medicationis modus le-
ge naturæ examinan-
dus 1.2. & 4.2

Medicari in valde acutis
eadem die 4.10

Medicus minister natu-
ræ 1.2

Medicus quod futurum
est prædicens lauda-
tur, & à suspitione in-
terempti agri libera-
tur p.1.2

Melancholia 6.25

Melancholicus humor
7.41.42

Mensis minor triginta

diebus, maior viginti
nouem p.3.2

Morbi ex repletione 2.
22

Morbi ad alia tempora
benè malè se ha-
bent 3.3

Morbus peracutus 1.7

Morbi acuti & lōgi 2.19

Morbi similes minus
periculosi 2.34

Morientium signa p.1.4

Mouendum in princi-
pio morbi 2.29.30

Motum naturæ oportet
animaduertere 1.21

Mulierum affectus &
morbi 4.1

Mutationes repentinæ
periculosæ. *vide errata.*

Mutationes tēporum 3.1

Muti ex dolore capitis
6.51

Mutatio per quaterna-
rios considerāda p.3.2

Mutationes variæ lon-
gitudinem morbi de-
monstrant 4.40

N

Nares humidiores 6.2

Nasus compressus &
acutis in morbis quid
significet p.1.3

INDEX.

Naturæ alia ad alia tem- pora melius aut peius habent 3.3	dicat calor aut frigus 4 39
Naturæ officium 1.3	Pedes intumescere com- mune est omni aquæ inter cutem p.2.1
Nimum omne naturæ cōtrarium. <i>vide errata.</i>	Perineum 4 80
Nephritidi succedentes hæmorrhoides 6.11	Peripneumonia pleuri- tidi succedens 7 11
Nubecula in vrinis 4. 71. & p.2.6	Phlebotomia tempus 6. 47
Nutrientia velociter ve- loces habent excre- tiones 2.18	Phrenitis à pulmonis inflammatione 7.12
O	Phthisis 7 16
Ocçasio 1.1	Pica 5 62
Oculorū dolor. 6.31	Pituita inter ventricu- lum & septum trans- uersum 7 56
ex Oculis signa p.1.4	Pletora 2.17
Omenti procidētia 6.60	Podagici morbi 6.55
Omnium naturalium operationum causa calor 1.15	Pleuritis 5.15
Omnia facienti secun- dum rationem si non succeedat, quid facien- dum. <i>vide errata.</i>	Potu facilius implemur quàm cibo 2.11
Ophthalmis 6 34	Prædictionis utilitas p. 1.1
Os ruptum non glutina- tur 6.19	Prædientia ibid.
Oscitatio 7.58	Prædictiones in acutis non tuæ 2.19
Ossis capitis præcisio 7. 25 P	Prognostica de vrinis 4. 69.70. & 7.32.33.34.35. 36. & p.2.6
Pandiculatio 7 58	Profluuium alui in pleu- ritide 6.16
Partem affectam in-	Puerorum morbi 3.28
	Pul-

INDEX.

- Pulmonis vitia** 5.10
Purgandum initio cum 6.6
 turgent humores 1.24
Purgatio 2.22. & 6.47
Purgationes quæ, &
 quando conferunt 1.2
Pus dum conficitur, do-
 lores ac febres vigent
 2.47
Purulenti quibus signis
 cognoscantur p.2.2
Puris boni signa p.1.14
Pustulæ latæ 6.9
- Q**
Qualitas victus 1.16
Qualitas euacuatio-
 nis 1.2
Quartana æstiva breues
 2.25
Quartus dies septeno-
 rum est index 2.24
Quarta circuitio septi-
 mæ index erit p.3.2
Quaternarij sex, vigesi-
 mum constant p.3.2
Quies lassitudini con-
 fert 2.48
- R**
Reliquia morborum
 2.12
Remissio aut intentio
 symptomatum sine ra-
 tione non est cura 2.27
- Renum & vesicæ vitia**
 6.6
Repletio immoderata 1.
Repletio curatur eua-
 cuatione, & contra
 2.22
Refrigerationes seu ri-
 gores à parte poste-
 riore magis fiunt 5.70
Refrigerata quæ excal-
 facienda 3.19
Regius morbus 5.73. &
 4.62
Remedia non temerè
 mutanda. vide errata.
Rigor ex potatione 7.7
Rigores quotidiani in
 febribus 4.63
Rigor succedens ardenti
 febri 4.58
Rigor febris non inter-
 mittentis 4.46
Rigores sexto die con-
 tingentes 4.29
Ructus acidus in liente-
 ria 6.1
Ructus acidus 6.33
Ruptiones 6.22
- S**
Sanguinis mictio 4.80
Sanguinis vomitus 7.38
Sanguinis in aluum ef-
 fusio 6.20

INDEX.

Sanguis in mammis pro lacte 5.40	modica 2.3
Sanguinem supra ferris, malum 4.25	ex Somno signa p.2.2
Sanguinis fluor è nari- bus quando expectan- dus p.3.4	Somnus hianti ore exi- tiosus p.1.5
Sanitas 2.4. & 7.84	Somni per hyemen lon- gissimi 1.15
Screeationis promptæ fi- gna p.2.8	Spinæ dolores 7.37
Senes minus ægrotant 2.39	ex Spiratione signa p.1. 10
Senum morbi 3.31	Spiratio offendens in febris 4.68
Siccitates imbris fa- lubriores 3.15	Spuma patientis pul- monis signum 2.43
Septenariorum diductio p.3.2	Sputum sanguinis & spu- tum purulentum 7.15
Signorum consideratio in genere 4.46. & seq.	ex Sputo signa p.2.8
Singultus ex nimia pur- gatione 5.4	Sternutationes malæ p. 2.9
Singultus 7.3	Sternutamenti causæ 7.53
Singultus quo differt à convulsione 6.39	Stillicidium urinx vel stranguria 6.44
Singultus sternutamen- to soluitur 6.13	Stillicidium urinx solui- tur venæ sectione 7.50
Singultus in hepatis in- flammatione 7.19	Strangulatio 4.34
Sitis nocturna 5.27	Stridor dentium in fe- bris quid porten- dar p.1.7
Sitis in purgatione 4.19	Stupor linguæ 5.5. & 7.41
Somnus delirium fe- dans 2.2	Suauitas cibi salubris 2. 38
Somnus & vigilia im- modica 4.41	Sudor multus ex somno factus quid significet 4.41

Sudor

INDEX.


- Sudor multus calidus vel frigidus 7.65. & 4. 42
- Sudores frigidi quid significant 4.37
- Sudores in febricitantibus qui boni 4.36
- ex Sudorib. signa p. 1. 11
- Suffocatio ab utero lezata Rerutinatione 5.35
- Suffitus aromatum 5.28. & 60
- Supinum iacere p. 1. 5
- Suppuratio p. 1. 13. & 2. 10. 11
- Suppurationis terminus 7.39. & p. 2. 10
- Suppuratio à ventris dolore 7.23
- Suppuratio ex pleuritide 5.8
- Suppurati qui vruntur & secantur 7.46
- Suppurati vñi vel secti qui euadunt 7.47
- Suppurati quibus pus vniuersum effluerit, moriuntur 6.27
- Suppuration. ruptio 7.8
- Surditatis solutio 4.60
- Surditas sistit biliosas deiectiones, & contra 4.28
- Suspiria lucuosa in acutis mala 6.54
- T
- Tabidi purgandi per inferiora 4.8
- Tabida aras 5.39
- Tabis lethalis signa 5.12
- Tabidis lac cõuenit 5.65
- Tabidis Autumnus malus 3.10
- Tenuis, tenuissimus, maximèque tenuis victus 1.5
- Tempora legitima & constantia 3.8
- Tenesmus 7.28
- Tertiana exquisita 4.59
- Tetanus 4.57
- Tormina 4.11
- Tonillæ 3.26
- Tumor in hypochondrijs qua parte periculosior p. 1. 13
- Tumores in vlceribus quibus apparent, vel non 5.66. 67
- Tumores molles boni 5.68
- Turgētes humores 1.22
- Tussis aquæ inter cutem superueniens mala 6. 35
- Tussis sicca 4.54


INDEX


V


- V**acuatio 2.22
 Varix. *vide errata.*
 Vena secanda Vere 6.47
 Ventris dolores 6.7.& 7. 23.27
 Venæ communes sunt utero & mammis 5.37
 Veneris usus affert podagram 6.30
 Venter in quouis morbo mollis p.2.3
 Ventri Auster, Aquilo 3.5
 Ventosi seu flatuosi 5.73
 Ver saluberrimum 3.9
 Verrucæ 3.26
 Vertigo 4.17.& 3.17
 Vesica 6.18
 Victu tenui ægri læduntur 1.5
 Vigessimus diem complent tres septenarii & sex quaternarii p.3.2
 Vigessimus dies iudicatorius 7.39.& p.3.2
 Vigiliæ unde, & quas læsiones afferant 7.18
 Vigiliæ immodicæ Hippocraticam faciem efficiunt p.1.3
 Vigiliæ sequens convulsio 7.18
- Vinum generosum famem sedat 2.21
 Vires unde cognoscuntur 1.12
 Viri ad generandum qui inhabiles 5.64
 Vita brevis 1.1
 Vlceribus frigida mordax 5.20
 Vlcera annua & maligna 6.45
 Vlcera in hydropicis non facile sanantur 6.8
 ex Ulcere signa p.1.8
 Vomentes facile & difficulter quomodo purgandi 4.6
 Vomitionum differentia & signa 4.6.7
 Vomitionis necessaria signa 4.17. critic. 7.38
 Vomitus in ilio 7.10
 Vomitus excitat mortio 4.14
 Vomitus sanguinis 7.38
 Urinarum differentia & Prognostica 7.33. & seq. & 4.69. 70. 72. Item p.2.6
 Vulnera circumglabra 6.4
 Vultus Hippocraticus p.1.3


F I N I S.























C - G -

J. C. CDE. J. V. D.